



ІІІ. НЕПРАВИЛЬНЫЯ ОТДЪЛЕНИЯ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

о болѣзненныхъ отдѣленіяхъ вообще.

§ 144.

Болѣзненнымъ отдѣленіемъ (*secretio morbosa*) называется вообще тотъ неправильный процессъ, посредствомъ коего отдѣляемыя въ организмѣ вещества приготовляются либо въ чрезмѣрно обильномъ, либо въ очень скучномъ количествѣ, либо имѣютъ порочное качество.

§ 145.

Явленија сего болѣзеннаго состоянія бывають очень различны, смотря по разности отдѣлительныхъ органовъ и означенныхъ трехъ уклонностей отъ нормального состоянія.

а) *Умноженное отдѣленіе* зависитъ всегда отъ увеличенного раздраженія и скопленія крови въ отдѣлительномъ органѣ и потому предвѣщается иногда возвышеніемъ чувствительности страждущей части. Съ наступившимъ отдѣленіемъ и испражненіемъ отдѣленаго, припадки отъ раздраженія умѣряются и самое отдѣленіе либо само собою проходитъ, если онимъ уничтожается болѣзненный продуктъ, либо причиняетъ различныя послѣдствія страданія и легко дѣлается упорнымъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ отъ долговременнаго продолженія болѣзни, самой отдѣлительный органъ болѣе или менѣе измѣняется въ своемъ строеніи, содѣлываясь гораздо смягченнѣе и чувствительнѣе. Когда же при существующемъ скопленіи отдѣленіе воспіящается, то рождается новое раздраженіе, опухоль и даже воспаленіе. Такимъ же образомъ, если отдѣленныя вещества не испражняются, а остаются въ соѣдѣнныхъ частяхъ, то дѣйствуютъ на оныя, какъ болѣзненное раздраженіе. Сверхъ сего отъ умноженнаго отдѣленія можетъ мало по малу произойти порочное смыщеніе крови и даже плотныхъ частей, а отъ чрезмѣрнаго отдѣленія и испражненія веществъ весьма часто произрождается ослабленіе силь, сухотка и изнурительная огневица.

б.) *Измѣненное въ качествѣ отдѣленіе.* Хотя

всякое умноженное отдаленіе сопряжено всегда съ большимъ или меньшимъ измѣненіемъ самаго качества отдѣляемыхъ веществъ, однакожъ не рѣдко, и при нормальномъ количествѣ, качество ихъ измѣняется такъ, что они либо не могутъ служить для определенной цѣли въ организмѣ, либо содѣлываясь острыми, раздражаютъ части приходящія съ ними въ соприкосновеніе, даже причиняютъ воспаленіе, или изъязвленіе въ оныхъ, либо вместо питания, для коего предназначены, содѣлываются вредными, либо наконецъ заключаютъ въ себѣ заразительное вещество, разстроивающее органъ специфическимъ образомъ и способное произвести тоже самое разстройство въ другомъ здоровомъ тѣлѣ. Измѣненное качество отдѣляемыхъ веществъ часто узнается по виду или посредствомъ химического изслѣдованія, а часто по одному вредному дѣйствію, оказываемому имъ на тѣло больного, или другой особы.

с.) Умаленное и восплющенное отдаленіе сопровождается либо припадками раздраженного и возбужденного состоянія въ органѣ, а иногда во всемъ тѣлѣ, либо признаками ослабленной жизнедѣятельности и даже паралича. Въ слѣдствіе оного происходитъ застой соковъ въ отдѣлительномъ органѣ и самое воспаленіе, нарушаются отправленія, поддерживаемыя отдѣляемыми веществами, задерживаются въ крови вещества, кои должны быть испражняемы изъ тѣла, а чрезъ то страждеть смѣщеніе крови, рождается худосочіе, или огневица. Сверхъ сего отъ восплющенного отдаленія легко возбуждается антагонистически какая либо болѣзненная дѣятельность и нерѣдко въ отдаленныхъ частяхъ обнаружи-

вается отдѣлениe, имѣющее свойства прекращеннаго отdѣления, либо появляется боль, судорожное скроченіе, воспаленіе и пр.

§ 146.

Расположение къ болѣзненнымъ отdѣлениямъ имѣютъ преимущественно особы, одаренные эретическимъ сложеніемъ тѣла и страждущіе худосочіемъ.

Къ случайнymъ причинамъ относятся всѣ раздраженія, дѣйствующія непосредственно или чрезъ сочувствіе и антагонизмъ на отdѣлительный органъ. Въ семь отношеніи наиболѣе отличаются психическія раздраженія, или страсти, изъ коихъ каждая почти возбуждаетъ всегда извѣстное какое либо отdѣлениe. Такимъ образомъ гнѣвъ умножаетъ отdѣлениe желчи, а отчасти слюны, которая у животныхъ воспринимаетъ иногда ядовитое свойство, печаль отdѣлениe слезъ, испугъ отdѣлениe мочи, продолжительный страхъ отdѣлениe кишечка и пр. Сюда относится также употребленіе нѣкоторыхъ веществъ, дѣйствующихъ какъ раздраженія для извѣстныхъ отdѣлений; антагонистическое возбужденіе другаго отdѣления чрезъ воспашеніе одного; и наконецъ измѣненіе соковъ, при коемъ страждеть самый матеріалъ, служащий къ отdѣлению, напр. при ртутномъ худосочіи.

§ 147.

Сущность. Отдѣлениe есть жизненный процессъ, коимъ совершаются приготовленіе различныхъ собственнаго

рода жидкостей изъ крови. Онъ основывается, по всему вѣроятію, не на одномъ механическомъ устроеніи органовъ, служащихъ отдѣленію, но на особенномъ динамическомъ дѣйствіи, состоящемъ въ полярномъ притяженіи отдѣляемаго сока, собственномъ каждому отдѣлительному органу. Въ болѣзненномъ состояніи количество и качество отдѣляемыхъ жидкостей зависить отъ раздраженій, дѣйствующихъ на отдѣлительные органы, въ которыхъ они, возвышая чрезмѣрно жизненный процессъ и умножая притеченіе крови, разстраиваютъ ихъ жизнедѣятельность и измѣняютъ смѣшеніе отдѣляемыхъ ими жидкостей. Раздраженія сіи происходятъ либо отъ чисто мѣстного, иногда отъ сочувственного и антагонистического пораженія первовъ, либо отъ качественного и количественного измѣненія крови, либо отъ того и другаго вмѣстѣ.

Ближайшія патологическія условія основываются и здѣсь а) на *дѣятельномъ*, или б) на *страдательномъ* состояніи. Первое обнаруживается всегда при явленіяхъ дѣятельного скопленія (§ 11.) и зависитъ отъ возвышенной жизнедѣятельности; а послѣднее при упадкѣ энергіи съ умноженною раздражительностью, или съ совершиенною недѣятельностью (*atonia*).—Умноженное отдѣленіе есть почти всегда слѣдствіе возвышенной жизнедѣятельности, а уменьшенное можетъ происходить какъ отъ упадка жизнедѣятельности, такъ и отъ чрезмѣрно усилившагося возбужденія въ отдѣлительному органѣ напр. при воспаленіи и въ горячкахъ.

§ 148.

Предсказание. Если неправильные отдалиения обнаруживаются въ сопровождении другихъ болѣзней, то бываютъ весьма часто благотворны; однакожъ и въ семъ случаѣ, они составляютъ иногда дурной припадокъ и, ослабляя силы, умножаютъ нерѣдко страданіе. Самостоятельныя, чиная отдалиения болѣшею частію бываютъ очень упорны къ излѣченію, а если и уступаютъ дѣйствію лѣкарствъ, то уничтожаясь въ одномъ органѣ, легко переносятся на другой и тѣмъ могутъ угрожать болѣшею опасностію.

§ 149.

Лечение. а) *По пригнаннымъ показаніямъ* мы должны существующее, можетъ быть, въ тѣлѣ раздраженіе, отъ коего зависитъ порочное отдалиение, отыскать и удалить, а вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожить и продукты болѣзнистой дѣятельности, могущіе также оказывать раздражающее вліяніе, какъ напр. кислота и острая желчь. Кроме сего нужно обращать вниманіе на прочія отдалиения въ тѣлѣ и стараться уравнивать ихъ такъ, чтобы они не оказывали вреднаго дѣйствія на болѣй отдаильный органъ и назначать такую діету для больнаго, чтобы въ употребляемой пищѣ и напиткахъ не содержалось ничего дѣйствующаго вредно на отдалиенія.

б) *По существеннымъ показаніямъ* должно дѣйствовать на отдалиенія чрезъ измѣненіе нервной дѣятельности и кровяной массы.

1. *При умноженному отදленіи* нужно стараться успокоить первы чрезъ содѣйствіе на нихъ мѣстными средствами: укротительными примочеками, втираніями, впрыскиваниями и пр. также внутренними слизистыми, а еще лучше наркотическими, въ особенности опіятными лѣкарствами, — умножать прочія отදленія, напр. въ поносѣ возбуждать потъ, а въ слюнотеченіи отදление кишекъ и пр. — отводить первную дѣятельность отъ страждущаго органа на другія части, либо возбуждать контрактивную дѣятельность въ страждущей части, или во всемъ тѣлѣ посредствомъ мѣстнаго, а иногда и внутренняго употребленія холода, крѣпительныхъ, стягивающихъ лѣкарствъ и пр.

Измѣненіе кровяной массы, для ограниченія умноженныхъ отදленій, основывается на доставленіи оной меѣ раздражающаго свойства чрезъ употребленіе нѣжной пищи и оболакивающихъ напитковъ, чрезъ умноженіе испражненій, служащихъ для тѣла очищеніемъ напр. мочи, пота, желчи и пр. также чрезъ уменьшеніе количества соковъ, служащихъ къ отදленію. Рѣдко, при особыхъ только обстоятельствахъ, напр. при застоѣ крови въ отදлительномъ органѣ, употребляются кровоисправленія, такъ какъ они легко утончаютъ массу крови. Для уменьшения серозныхъ составныхъ частей крови весьма полезно уменьшеніе питья и возбужденіе серозныхъ испражненій. Къ сему могутъ служить также крѣпительные средства, к. и. пр. коломба, хина, желѣзо и пр. умножающія плотность крови и тѣмъ противудѣйствующія разрѣшающей силѣ первнаго вліянія.

2.) При измѣненномъ въ качестве отදленіи

надлежитъ исправить оное либо чрезъ содѣйствіе на отдѣлительный органъ специфическими средствами, измѣняющими собственнымъ образомъ его жизнедѣятельность, либо чрезъ доставленіе массы соковъ такихъ веществъ, кои болѣе или менѣе измѣняютъ оную, паипаче уточчаютъ. Для первого намѣренія, смотря по разности органовъ, избираются различныя вещества к. т. для кожи сѣрныя, для кишечнаго канала чисто горькія, для печени растительныя кислоты, для слизистыхъ оболочекъ сюрянныя, для всасывающей системы ртутныя и юдиновыя и т. д. Иногда также дѣятельность отдѣлительного органа измѣняется въ качественномъ отношеніи чрезъ содѣйствіе на другой органъ, состоящій съ нимъ въ антагонизмѣ (поларномъ содержаніи). Такимъ образомъ болѣзниенная дѣятельность кожи въ желтухѣ измѣняется и приводится въ нормальное состояніе чрезъ содѣйствіе на печень. Для измѣненія и уточченія массы соковъ лучше всего можетъ служить обильное питье, способствующее процессу разжиженія и тѣмъ исправляющее слишкомъ вязкое отдѣленіе.

5.) Для умноженія умаленнаго отдѣленія, которое зависитъ либо отъ слишкомъ усилившагося напряженія и возбужденія, либо отъ упавшей жизнедѣятельности въ отдѣлительному органѣ, предпринимается обыкновенно соответствующій симъ болѣзниеннымъ измѣніямъ способъ лѣченія. Въ первомъ случаѣ приличны смягчающія, успокаивающія, а иногда и противовоспалительные средства, особенно способствующія процессу разжиженія, какъ рвотный камень, прохладительныя соли, услажненная хлористая ртуть и пр.

При чрезмѣрномъ напряженіи, простирающемся до степени воспаленія, показуется и самое кровопусканіе. Во второмъ случаѣ, или при уменьшной жизнедѣятельности, употребляются съ успѣхомъ такія средства, кои специфически дѣйствуютъ на отдѣлительные органы, возвышая ихъ жизнедѣятельность, какъ при воспаленіи накожномъ испареніи потогонительныя, при остановленномъ отдѣленіи желчи желчеисправнительныя (*cholagogia*) и т. д. Сверхъ сего здѣсь полезны вообще средства, способствующія процессу разжиженія, какъ теплота и обильное питье.

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Важнѣйшій припадокъ, раждающійся въ слѣдствіе очень продолжительныхъ умноженныхъ отдѣленій, есть истощеніе силъ, которое приличною цитательною пищею и крѣпительными лѣкарствами, по возможности, должно быть предотвращаемо. Послѣдствія прекращенныхъ отдѣленій весьма различны, но они наилучше могутъ быть уничтожены скорымъ возстановленіемъ прекращеннаго отдѣленія, если же и послѣ сего остаются, то требуютъ средствъ, сообразныхъ особенному ихъ характеру.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

УМНОЖЕННЫЯ И ВЪ КАЧЕСТВЪ ИЗМѢНЕННЫЯ
ОТДѢЛЕНИЯ.

Болѣзненная потливость.

(*Sudatio morbos, ephidrosis*).

§ 150.

Болѣзненною потливостію называется то потѣніе, при коемъ на кожѣ выступаютъ поты безъ виѣшней побудительной причины, или огневичаго движенія и не состоять, относительно своей силы, ни въ какомъ содѣжаніи съ возбуждающими вліяніями. Вообще здѣсь разумѣются тѣ поты, кои обнаруживаются самостоятельно болѣзнию, зависящему собственно отъ страданія кожи, но не тѣ, кои оказываются въ видѣ припадка въ различныхъ другихъ недугахъ.

§ 151.

Явленія. Особы, страждущіе сею болѣзнию потѣютъ сильно отъ легкихъ движеній тѣла, даже отъ маловажныхъ сердечныхъ и умственныхъ возбужденій, такъ что иногда при спокойномъ хожденіи въ комнатѣ и при обыкновенномъ разговорѣ выступаетъ каплеобразный потъ

на груди и прочихъ частяхъ. Потъ таковыи въ ночное время, особенно къ утру, усиливается до того, что при-
нуждаетъ часто смѣнять бѣлье. Существующая при семъ
чрезвычайная чувствительность кожи подаетъ поводъ къ
безпрестанной простудѣ, — удобно также рождается прѣ-
лость (*intertrigo*) въ разныхъ частяхъ и просообразная
сыпь.

Иногда поты бываютъ только мѣстные и въ такомъ разѣ
они дѣлаются очень упорными, воспринимаютъ нерѣдко,
особливо на ногахъ, очень противный запахъ, содѣли-
ваютъ кожу въ сихъ частяхъ очень иѣжною и чувстви-
тельною и причиняютъ красноту, даже схожденіе верх-
ней кожицы. Если страждущая мѣстными потами часть
подвергается вліянію холода и влажности, то легко прик-
лючается простуда, причиняющая зубную боль, катаръ,
ревматизмъ, вереды и другія трудныя страданія. —

§ 152.

Исходы. Повсемѣстные поты, оказывающіеся очень дол-
го и въ сильной степени, легко ослабляютъ тѣло и при-
чиняютъ изнурительныя болѣзни, ускоряя ихъ пагубное
окончаніе; впрочемъ часто организмъ такъ привыкаетъ
къ онимъ, что, если внутреннее какое либо страданіе
не воспящаетъ возстановленію силъ, то поты сіи про-
должаются иѣсколько лѣтъ безъ особенной опасности
для жизни. Мѣстные поты переходятъ удобно въ изъ-
явленіе, а по отступленіи своемъ въ означенныя первы-
я и другія страданія.

§ 153.

Расположение къ сей болѣзни имѣютъ особы, одаренные нѣжною, мягкою кожею; чаще блондины, нежели брюнеты, вообще представляющіе слабое тѣло и расположеніе къ чахоткѣ. *Къ служащимъ причинамъ* относится привычка пить на ночь много теплыхъ, либо спиртныхъ напитковъ, спать на мягкихъ перинныхъ постѣляхъ, укрываться слишкомъ тепло, носить чрезмѣрно теплое платье, особенно фланель на голой кожѣ, очень часто париться въ баняхъ, тереть кожу разными острыми либо спиртными веществами, или вовсе нерадѣть объ очищеніи кожи и т. д.

§ 154.

Предсказаніе. Ослабленіе кожи и привычный привкусъ соковъ къ опой, отъ коихъ зависитъ чрезмѣрная потливость, весьма трудно отвращаются и потому лѣченіе часто остается здѣсь безъ успѣха, тѣмъ болѣе, что отъ ограниченія накожной дѣятельности въ такомъ случаѣ легко могутъ произойти важные переносы, и слѣдственно въ употребленіи лѣкарствъ должно наблюдать большую осторожность.

§ 155.

Лѣченіе. а) *По причинамъ показаніямъ* больной долженъ избѣгать всѣхъ вліяній, возбуждающихъ уси-

ленное испарение кожи (§ 154.) а при томъ употреблять пищу и напитки болѣе холодными и пріучать себя постепенно къ легкой одеждѣ и легкому покрывалу въ постель. Для умѣренія ножныхъ потовъ потребно, вмѣсто шерстяныхъ чулковъ, носить бумажные или холщовые, либо обвертывать ноги почаше смѣняемыми, тонкими холстинками, а вмѣсто сапоговъ надѣвать башмаки и старайся о частомъ промываніи ногъ умѣренно теплою водою.

b) *По существеннымъ показаніямъ* требуется укрощать чрезмѣрное отдѣленіе пота внутреннимъ употребленіемъ прохладжающихъ и стягивающихъ лѣкарствъ, к. т. очищенаго виннаго камня, или минеральныхъ кислотъ (N 57), принимаемыхъ въ холодной водѣ вмѣсто питья, холодной наливки шалфея (N 78), шалфейного алеосахара (N 79), различныхъ приготовленій изъ хинны, сока катеху (N 65), кампешеваго дерева (N 66), желѣза (N 67), ивовой корки, завязнаго корня, краснаго вина, лиственничнаго трута (*de Haen*) и пр. Вмѣстѣ съ симъ можетъ быть соединяено и осторожное употребленіе наружныхъ средствъ. Большой долженъ дѣлать себѣ сперва тепловатыя, потомъ холодноватыя и наконецъ холодныя ванны, однакожъ такъ, чтобы послѣ всякой холодной ванны производимо было умѣренное движеніе тѣла. Посему весьма хорошо въ такомъ случаѣ купаться въ рекѣ, либо въ морѣ, если позволяетъ время. Для некоторыхъ приличны желѣзныя ванны, а для другихъ приготовляемыя изъ настоя ароматныхъ и крѣпительныхъ средствъ. Сверхъ того съ осторожнѣемъ пріученiemъ кожи къ холоду можно также ежедневно вытираТЬ тѣло

губкою, обмакиваемою въ холодную воду, носить рубашки, погружаляемыя въ отварь хины (*Percival*). Для обмыванія тѣла прославляется болѣе всего камфорное мыло.

с) *По припадочнымъ показаніямъ.* Сюда относится лѣченіе припадковъ, рождающихся отъ пристановленія потовъ. Въ такомъ случаѣ нужно стараться отступившій потъ возстановить накожными раздраженіями, потогонительными лѣкарствами, теплымъ содержаніемъ и пр. и потомъ действовать приличнымъ образомъ противъ существующаго припадочнаго страданія, если оно съ возстановленіемъ пота не прекращается. Скрывшіяся ножной потъ возбуждается ношеніемъ шерстяныхъ чулокъ, окутываніемъ ногъ фланелью, заячимъ или кроликовымъ мѣхомъ, согрѣваніемъ и тренiemъ ихъ, употребленіемъ теплыхъ и раздражающихъ ножныхъ ваннъ.

Слюнотеченіе.
(*Salivatio, ptyalismus*).

§ 156.

Слюнотеченіемъ называется обыкновенно умноженное и въ качествѣ измѣненное отдѣленіе слюнныхъ желѣзъ, соединенное съ частымъ плеваніемъ, либо вытекеніемъ самой слюны изо рта.

§ 157.

Явленія. Иногда слюнотечению предшествуютъ: жаръ и сухость въ полости рта, чувствительность и распухлость слюнныхъ желѣзъ, перѣдко дурной, почти гнилой запахъ изорта съ распуханіемъ десенъ, особенно при ртутномъ слюнотечении. Во время сихъ предвестниковъ, а иногда и безъ оныхъ, замѣчается, что ротъ большаго безпрестанно наполняется слюною, которая при разговорѣ удобно вытекаетъ, а воспѣ. попадая въ горло, причиняетъ кашель и даже припадки удушья. Количество слюны часто бываетъ очень значительно и можетъ даже простираться въ сутки до 12 фунтовъ. Слюна въ качествѣ своемъ не рѣдко измѣняется, имѣетъ дурной запахъ, сладковатый или соленый вкусъ, бываетъ очень вязкая, иногда мутная и сывороточная (*Reil*). Вся полость рта дѣлается очень чувствительною, десны обрыхлѣваются, ворту рождаются большія бѣлыя пятна или пузыри, переходящіе въ бѣловатыя изъявленія; на внутренней поверхности щекъ часто образуются бѣлыя мозольные наращенія, зубы шатаются и червѣютъ, языкъ значительно распухаетъ, заушия и подчелюстныя желѣзы вздуваются и болятъ. Въ сильной степени болѣзни и при долговременному продолженіи оной страждутъ и прочія части, даже весь организмъ, пищевареніе и питаніе разстроиваются, лице дѣлается блѣднымъ, раздутымъ или впалымъ, силы умаляются и наконецъ присоединяется даже изнурительная огневица. Болѣзнь сія продолжается иногда только вѣсколько дній, а иногда очень долгое время и *переходитъ* либо

въ здоровье при постепенномъ умаленіи отдѣленія, либо въ смерть отъ изнуренія силъ или отъ переносовъ.

§ 158.

Причины. Частѣйшее порожденіе очень обильнаго слюнотеченія случается отъ воспріятія въ тѣло ртути, употребляемой для втираний въ формѣ сѣрой ртутной мази, либо внутрь въ формѣ услажненной хлористой ртути, паиначе въ малыхъ учащенныхъ приемахъ, рѣдко сулемы, а еще реже прочихъ ртутныхъ препаратовъ. Сверхъ сего болѣе или менѣе обильное отдѣленіе слюны рождается иногда въ слѣдствіе воспаленія горла, изъязвленій ворту, зубной боли, перелома челюсти, гастрическихъ раздраженій, глистъ, скопленій желчи, слизи, ракообразнаго изъязвленія желудка и поджелудочной желѣзы, отвердѣнія печени, ревматического параличія слюнныхъ желѣзъ, отступленія ножнаго пота, переносовъ ломоты, лишая, чесотки, также въ слѣдствіе прилипчивыхъ огневицъ, особенно осипы, водобоязни и т. д.

§ 159.

Сущность болѣзни состоить въ возвышенной жизнедѣятельности слюнныхъ желѣзъ, зависящей отъ непосредственно извиѣствующихъ на опыта раздраженій, либо отъ сочувственныхъ и антагонистическихъ возбужденій, причиняющихъ умноженное скопление крови и увеличенный процессъ разжиженія съ измѣненіемъ так-

же соковъ, служащихъ къ отдѣленію, особливо при ртутномъ, оспинномъ и водобоязненномъ слюнотеченіи.

§ 160.

Предсказание. Слюнотеченіе оказываетъ иногда благотворное дѣйствіе, служа критическимъ или замѣннымъ отдѣленіемъ. Однакожъ сіе случается рѣдко. Большею частію оно бываетъ припадочное, иногда очень упорное и, если не угрожаетъ явною опасностію, то увлекая съ собою столь важную влагу, какъ слюна, рѣдко остается безъ дурныхъ послѣдствій.

§ 161.

Лечение. а) *По причиннымъ показаніямъ* требуется разыскать и удалить всѣ существующія раздраженія, наипаче обрѣтающіяся въ полости рта и пищеварительныхъ органахъ. Если причиной слюнотеченія употребленіе ртути, то нужно либо пріемъ ея уменьшить, либо перемѣнить препаратъ, либо во все оставить онуу. Противъ ртутного слюнотеченія дѣйствуютъ очень хорошо теплые ванны, приготовляемыя съ сѣрою печенкою (*polysulphureum potassii*); употребленіе же онай внутрь съ очищеннымъ виннымъ камнемъ, по способу Ганнемана, никогда почти не приноситъ пользы.

б) *По существеннымъ показаніямъ* должно ограничивать возвышенную жизнедѣятельность слюнныхъ желѣзъ, отъ коей собственно зависитъ скопленіе крови и усиленный процессъ отдѣленія. Таковому намѣренію

соответствуютъ преимущественно притупляющія раздраженіе и успокаивающія лѣкарства, к. т. полосканы изъ отвара алтейнаго корня и маковыхъ головокъ съ прибавленіемъ меда и настойки опія, смягчающія и болеутолительныя припарки на шеѣ (N 48), окутываніе оной подогрѣваемою фланелью, или ароматными мышечками съ камфорою, втираніе масла белены и другихъ болеутолительныхъ мазей (N 49) и употребленіе внутрь умѣряющихъ возвышенную раздражательность средствъ (N 1, 7, 77); иногда, особенно при ртутномъ слюнотечѣніи, держаніе ворту холодной воды, холодная полосканы рта и пр. также возбужденіе отдѣленія въ другихъ отдѣлitenыхъ органахъ, наипаче въ кожѣ чрезъ накожный раздраженія, теплые ванны, теплое содержаніе тѣла и употребленіе внутрь потогонительныхъ лѣкарствъ (N 82), а въ кишечномъ каналѣ чрезъ произведеніе участинаго испражненія низа средними солями (N 15, 20). По уменію раздраженнаго состоянія слюнныхъ желѣзъ приличны стягивающія и укрѣпляющія средства, полосканы изъ отвара шалфея, дубовой либо ивой корки, завязнаго корня, хины, ратаніи (N 80) съ прибавленіемъ квасцовъ, буры, настойки смирны и пр. Внутрь въ такомъ состояніи даются съ пользою крѣпительныя, наипаче хина, корень коломбы, желѣзо (N 50.) и пр.

с.) *По припадочнымъ показаніямъ* нужно обращать вниманіе на изъявленія во рту и обрыхленіе десенъ, противудѣйствуя онымъ стягивающими (N 80) и очистительными (*detergentia*) полосканіями (N 81). Если окажется воспаленіе въ слюнныхъ желѣзахъ, то требуются противувоспалительные средства, сперва выполн-

сиванія рта холодною водою, а потомъ растворомъ селитры, либо нашатыря въ отварѣ перловыхъ крупъ, иногда пьявки припускаемыя около слюнныхъ желѣзъ и пр. При отступившемъ слюнотечениі, наипаче если оно критического рода, должно стараться возстановить его смягчающими припарками, жеваніемъ во рту острыхъ возбуждающихъ слюнотечение веществъ, либо втираніемъ въ слюнныя желѣзы сѣрой ртутной мази.

Чрезмѣрное отдѣленіе молока.

(*Polygalia.*)

Syn. *Galactoplerosis, galactocratia, galactorrhoea.*

§ 162.

Такъ называется излишнее отдѣленіе молока въ грудяхъ и вытеченіе онаго чрезъ соски у женщинъ, кормящихихъ грудью.

Примѣр. Выхожденіе изъ грудей жидкости, подобной молоку, случающееся у новорожденныхъ дѣтей, у дѣвицъ, приходящихъ въ совершенный возрастъ и у женщинъ, окончившихъ періоды мѣсячного очищенія, даже у мужчинъ,—самостоятельно не принадлежитъ сюда, ибо оно зависитъ отъ совершенню другихъ патологическихъ условій.

§ 163.

Явленія. Въ большей части случаевъ таковому бо-

лѣзенному состоянію предшествуютъ признаки возвышенной жизнедѣятельности грудей к. т. значительное упругое раздутіе онъхъ, умноженная теплота, напряженные, очень выдающіеся соски, не обыкновенная краснота онъхъ и пр. При семъ молоко скопляется въ грудяхъ въ такомъ количествѣ, что по приложеніи къ нимъ ребенка, тотчасъ наполняется онъмъ вся полость его рта и причиняетъ нерѣдко удавку, либо вытекаетъ изъ утловъ рта. Иногда при сосаніи дитяти молоко выходитъ произвольно изъ другой груди; а иногда и безъ сосанія, въ известные промежутки времени, изливается оно само собою по каплямъ и часто въ такомъ количествѣ, что пробивается чрезъ все платье и распространяетъ кисловатый запахъ около кормилицы. Отъ движенія рукъ, во время пищеваренія и послѣ употребленія очень питательной пищи, теченіе таковое усиливается. Смотря по крѣпкому, или слабому сложенію тѣла обнаруживается раньше или позже слабость во всемъ организмѣ. Посему, у однихъ, въ первыя уже недѣли кормленія, появляется головокруженіе, усталость, наклонность къ обильнымъ потамъ, изнуреніе тѣла, блѣдность лица, синіе кружки вокругъ глазъ и пр. между тѣмъ какъ у другихъ проходятъ цѣлые мѣсяцы безъ всякаго поврежденія здоровья. Во всякомъ случаѣ, когда покажутся означенные явленія, то въ скоромъ времени присоединяются къ нимъ новыя. Больные жалуются на растягивающія боли въ членахъ, на давленіе и колотье въ верхней части спины и въ груди, безпрестанно изнуряются и наконецъ получаютъ всѣ признаки сухотки (*tubes lactea, t. nutriticum*).

§ 164.

Причины. Особенное расположение къ чрезмѣрному отдѣленію молока бываетъ иногда наследственное; вообщѣ же слабое и очень раздражительное состояніе тѣла (*erebellismus*) преимущественно располагаетъ къ этой болѣзни. Изъ случаиныхъ причинъ частѣйшія суть: различныя раздраженія, дѣйствующія на грудные желѣзы, слишкомъ частое кормленіе грудью, особенно кормленіе двухъ дѣтей, позволеніе слишкомъ долго сосать грудь, любовно-растрастиное приотрогиваніе къ грудямъ, слишкомъ обильное употребленіе веществъ, способствующихъ отдѣленію молока, жирной масляной пищи, растительныхъ частей изобилующихъ эфирными маслами, к. т. укропа, аниса, душистаго тимона и пр. наконецъ сочувственныя раздраженія и антагонистическая взаимная дѣйствія матки, напаче во время послѣ-родового очищенія.

Сущность сей болѣзни состоить обыкновенно въ воз-
вышенной жизнедѣятельности грудныхъ желѣзъ, которыхъ
съ отправлениемъ маточной системы находятся всегда въ
сочувственномъ и антагонистическомъ взаимномъ содер-
жаніи. Такимъ образомъ, при возвышенной дѣятельности
женскихъ грудей, мы замѣчаемъ часто такую же дѣя-
тельность въ маточныхъ отправленияхъ (*consensus*), а
иогда, при умаленной дѣятельности маточныхъ отправ-
лений, усиленную дѣятельность грудей (*antagonismus*).
Въ слѣдствіе сего, по испражненіи плода изъ матки и во
время послѣ-родового сокращенія ея, жизненность млеч-
ныхъ желѣзъ возвышается до высочайшей степени.

§ 165.

Предсказаниe въ сей болѣзни вообще болѣе благопріятно. Только въ тѣхъ обстоятельствахъ, гдѣ болѣзнь глубоко вкоренилась, болѣзненныя явленія достигли высокой степени, грудныя желѣзы очень привыкли уже къ чрезмѣрному отдѣленію и огневица нарочито усилилась, мы имѣемъ причину предполагать очень не благопріятное предсказаніе. Наибольшая опасность предстоитъ въ семъ случаѣ для слабыхъ женщинъ, расположенныхъ ка чахоткѣ.

§ 166.

Лечениe. а) По пригнаннымъ показаніямъ главное вниманіе должно быть обращено на дѣятельность матери, напаче во время послѣродового очищенія и, если она въ такомъ случаѣ слишкомъ рано или очень скоро ослабѣваетъ, чрезъ что дѣлается воспіяшеніе самаго очищенія, то надлежитъ стараться возстановить онуе. Это совершается наилучше посредствомъ теплыхъ примочекъ или припарокъ, прикладываемыхъ на дѣтородныя части, да же посредствомъ впрыскиваній въ маточный рукавъ изъ настоящаго донскаго можевельника (*sabina*), руты, ромашки и пр. Стараясь о правильности послѣродового очищенія, нужно также уклонять и прочія причины, способствующія слишкомъ обильному отдѣленію молока (§ 165.) въ особенности отъучатъ ребенка мало по малу отъ частаго сосанія груди, давая ему онуе рѣже и рѣже, а въ нач-

ное время и вовсе прекращая кормление; стараться о свободномъ испражненіи низа, соблюдать приличную дѣту, избѣгая пряной, душистой, очень питательной пищи и водянистыхъ напитковъ, поддерживать умѣренное испареніе кожи, а для воспіщенія сильному притечению соковъ къ грудямъ подвязывать оныя къ верху.

б) *По существеннымъ показаніямъ* должно понимать возвышенную дѣятельность грудныхъ желѣзъ, умалля чрезмѣрное возбужденіе первовъ и умноженный приливъ крови къ онымъ. На успокоеніе возбужденныхъ первовъ дѣйствуетъ очень хорошо умѣренная теплота;—следственно окутываніе грудей фланелю или ватою, окуриываемою сахаромъ, помазываніе ихъ свѣжимъ не соленымъ жиромъ или масломъ, иногда прикладываніе къ нимъ кусочка оподельдоку, растертаго на фланели, либо камфорного масла, а иногда и болеутолительныхъ мазей (N 49). Для уменія прилива къ грудямъ наиболѣе дѣйствуютъ отводящія средства, преимущественно слабительныя изъ среднихъ солей (N 15, 20), между коими сѣрикислый поташъ (*sulphas potassae*) заслужилъ особенное одобрение. Сему весьма много способствуетъ умѣренность въ пищѣ и напиткахъ.

с) *По приподнятымъ показаніямъ*. Ограничиваю отѣленіе молока, мы должны стараться предотвращать удобно рождающіеся при семъ молочные застои, отвердѣнія, воспаленія и пр.; а если они произойдутъ, то лѣчить ихъ по правиламъ хирургіи. Молочные застои и отвердѣнія предотвращаются и уничтожаются умѣреннымъ поглаживаніемъ и выдавливаніемъ молока, прикладываніемъ смягчающихъ, а иногда и разрѣшающихъ средствъ,

к. т. unguenti altheæ, emplastri conii, emp. hydrargiri, emp. saponati; втираніемъ olei hyosciami, unguenti digitalis etc. При наступлениі воспаленія (mastitis) должно способствовать созреванію нарыва и вскрытие онаго представлять натурѣ (см. ч. II. о воспаленіи женскихъ грудей).

Чрезмѣрновъ окисленіе желудочнаго сока.
(Acor primarum viarum, acidum spontaneum).

§ 167.

Желудочный сокъ у человѣка по изслѣдованіямъ Тидемана и Гмелина всегда бываетъ кислый; не смотря на это, при такъ называемой кислотѣ въ первыхъ путяхъ, онъ воспринимаетъ столь значительную степень кислоты и остроты, либо отдѣляется въ столь большомъ количествѣ, что отъ того произражаются болѣзни припадки.

§ 168.

Явленія. Больные страждутъ обыкновенно жжою, ощущая оную во входѣ желудка и въ пищепріемномъ горлѣ и чувствуя притомъ какъ бы горячій паръ, поднимающійся въ верхъ изъ желудка. Часто они имѣютъ при семъ болѣзnenный голодъ (bulimia), но никакой жажды; изо рта примѣтенъ кислый запахъ, нерѣдко оказывается у нихъ кислая отрыжка, а иногда рвота ве-

ществами, издающими очень кислый запахъ и производящими оскому на зубахъ, также поносъ, который иногда соединенъ бываетъ съ болями въ брюхѣ и при которомъ испражняются, напаче у дѣтей, зеленоватыя, слизистыя, кислый запахъ издающія вещества. При долговременномъ продолженіи и въ высшей степени болѣзни кислое свойство воспринимаютъ также и другія отдѣленія, особенно потъ и моча; лицо, губы, десны и языкъ дѣлаются блѣдными, у дѣтей рождаются даже корчи. Всѣ сіи припадки умножаются, если больной употребляетъ кислую и къ кислому броженію наклонную пищу.

§ 169.

Болѣзнь сія часто имѣеть кратковременное *продолженіе*, часто же бываетъ очень упорная и продолжительная. Въ здоровье переходитъ она послѣ испражненія кислоты рвотою и поносомъ, также отъ постепенного улучшенія желудочнаго сока. Смерть отъ нея можетъ произойти у дѣтей чрезъ произложеніе корчей, либо чрезъ изнуреніе тѣла, въ слѣдствіе коего образуется сухотка, золотуха и пр.

§ 170.

Расположеніе къ кислотамъ имѣютъ напаче дѣти въ первыхъ моментахъ жизни своей, изъ взрослыхъ преимущественно истерическія женщины и гипохондрики. *Къ случайнymъ причинамъ* принадлежитъ употребленіе кислой и къ кислому броженію наклонной пищи, кислыхъ винъ, пунша, лимонада, одной по себѣ растительной пищи, кислой капусты, картофеля въ большомъ количествѣ, ржанаго очень кислого хлѣба, испорченного молока, жир-

ныхъ веществъ, въ особенности пирожныхъ и пр. Равнымъ образомъ часто дѣйствуютъ на произведение сей болѣзни скрывающіеся внутрь ножные поты, лишай, чесотка, ломота и беспорядки въ мѣсячномъ очищеніи.

§ 171.

Сущность. Болѣзненная форма сія можетъ зависить отъ двухъ существенно различныхъ болѣзненныхъ состояній: 1-е.) отъ обильного отдѣленія кислого желудочного сока, какъ случается при разныхъ идіопатическихъ, сочувственныхъ или антагонистическихъ разстройствахъ желудочныхъ нервовъ. Желудокъ можетъ находиться при семъ въ раздраженномъ и даже въ воспалительномъ состояніи, а качество желудочного сока, по видимому, не очень измѣняется, но только отдѣленіе онаго умножается, самый же сокъ и безъ того уже имѣетъ всегда кислое свойство. 2-е.) отъ ослабленного пищеваренія, чрезъ что пища, не будучи надлежащимъ образомъ перевариваема, переходитъ въ кислое броженіе. Большею частію оба сіи состоянія бываютъ соединены вмѣстѣ. —

Предсказаніе. У взрослыхъ болѣзнь сія никогда не бываетъ опасна, но часто дѣлается очень мучительною. Самую кислоту легко можно уничтожать, но расположение къ образованію кислотъ истребляется съ болѣшимъ трудомъ. У дѣтей она гораздо вредоноснѣе.

§ 172.

Леченіе. 1.) *По причиннымъ показаніямъ.* Взрослые должны всячески избѣгать той пищи, которая, по замѣчанію ихъ, причиняетъ желудочные припадки,

наиначе жжогу. У дѣтей должно смотрѣть преимущественно на то, что бы материнское молоко и прочая пища имѣли хорошее качество. Если мать страждеть кислотами, то ей надлежитъ предписать приличную діету и лѣкарства. Вообще мать не должна кормить ребенка тотчасъ послѣ какой либо досады. Когда она одержима лишаями, опухолью желѣзъ, вонючимъ потомъ на ногахъ, или зловоннымъ дыханіемъ, то должна замѣнить себя кормилицею. Буде же не отыщется такой кормилицы, которой бы роды близко подходили къ рожденію больного ребенка, то лучше кормить его искусственнымъ образомъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ надлежитъ избѣгать слишкомъ обильного количества пищи, даваемой дитятѣ. Молоко и манная крупа, употребляемыя для кашицы, должны быть лучшаго качества, а самую кашицу надлежитъ варить хорошо, но не слишкомъ густо. Къ молоку полезно иногда прибавлять нѣсколько мяснаго бульона, приготовляемаго изъ телятины или циплятъ, временемъ также варить кашицу изъ бѣлыхъ сухарей, супы изъ крупъ; а для слабыхъ дѣтей отваръ саленаго корня съ мяснымъ наваромъ и съ нѣкоторымъ количествомъ яичнаго желтка.

Что касается до существующей въ желудкѣ кислоты, которая составляетъ главную причину всего страданія, то она должна быть либо испражненемъ, либо неутрализуема. Для первой цѣли употребляется рвотное изъ испекакуаника, либо слабительное изъ ревеня; а для послѣдней средства, способствующія всасыванію кислоты к. с. carbonas magnesiæ, carb. potassæ, lapides canticum, conchæ præparatae etc. съ приличными соединеніями (N 83).

2.) *По существеннымъ показаніямъ* надлежитъ противудѣйствовать неправильной жизнедѣятельности желудочныхъ силъ. Посему, когда она возвышается до воспалительного состоянія, то надлежитъ употреблять средства, какія предписываются обыкновенно противъ медленного воспаленія желудка. Если же при семъ замѣчается только артическое состояніе въ опомъ, то назначаются преимущественно нервно-желудочныйя вещества, какъ сѣма укропное, анисовое, тминное; мелисса, перечная мята, ромашка; иногда и осторожное употребленіе опіятныхъ средствъ, а съ наружки спиртныя и ароматическія втирания, желудочные пластыри и пр. Когда существуетъ состояніе нераздражимости и желудочные силы ослаблены, то полезны вина, пряности, ароматно-крѣпительныйя и чисто-крѣпительныйя лѣкарства, какъ ревень въ малыхъ пріемахъ, иръ (*calamus aromaticus*), померанцовая корка, квассія, полынь, корень коломбы, перуанская корка, желѣзо и пр. Иногда весьма хорошо соединять вмѣстѣ противукислотныя, возбуждающія и крѣпительные лѣкарства (N 84, 85.).

3.) *По припадочнымъ показаніямъ*. Если окажется какое либо зависящее отъ кислоты страданіе, напр. сильныйя желудочныйя судорги, или корчи въ тѣлѣ, то въ семъ случаѣ надлежитъ сколько возможно скорѣе удалить, либо неутрализировать кислоту, употребляя противъ того средства, сообразныя свойству и самаго нервнаго страданія, напр. при желудочной судоргѣ гѣсколько опія и т. д.



Многослизіе первыхъ путей.

(*Polyblennia gastrointestinalis.*)

Syn. *Pituta primarum viarum, colluvies pituitosa.*

§ 173.

Многослизіемъ или ослизеніемъ первыхъ путей называется то изменение слизистой оболочки желудка и кишечка, при которомъ образуется и скапливается въ означенныхъ органахъ болѣе или менѣе вязкая, бѣловатая слизь.

§ 174.

Язенія. Языкъ при семъ часто обложенъ бываетъ очень вязкою, густою, перепонко-образною слизью, большой имѣть весьма тупой вкусъ, недостатокъ аппетита и обыкновенно безжаждіе; во рту у него часто скапливается слюна, наипаче по утру, причемъ онъ легко подвергается удавкѣ и рвотѣ, чувствуетъ болѣе или менѣе давлѣніе и напряженіе въ желудочной сторонѣ, страждеть пученіемъ живота отъ вѣтровъ, большую частью также запоромъ, а по временамъ слизистымъ поносомъ. Въ высшей степени болѣзни моча обнаруживаетъ также слизистое свойство и лицо больнаго получаетъ болѣе блѣдный, обрюзглый видъ.

Болѣзнь сія обыкновенно бываетъ продолжительна. Въ здоровье переходитъ она постепенно, иногда при критическихъ слизистыхъ поносахъ; а смерть можетъ при-

ключаться отъ перехода въ слизистую горячку или во всеобщее худосочное состояніе.

§ 175.

Расположение къ сей болѣзни имѣютъ особы, одаренные вялымъ сложеніемъ тѣла, также золотушные, блѣдноличные и другіе худосочные. Изъ *случайныхъ причинъ* частѣйшія суть: продолжительное, или привычное употребленіе въ большомъ количествѣ спиртныхъ напитковъ; очень пряныхъ, раздражающихъ кушаньевъ, либо дурной, вязкой, безвкусной пищи; раздраженіе отъ глистъ, сидячій родъ жизни, распутства всякаго рода, напаче въ физической любви и онаніи, печаль, пребываніе во влажномъ жилищѣ и пр.

Сущность. Образъ происхожденія сей болѣзни можетъ быть различный. Часто таковое порочное отдѣленіе рождается отъ раздраженія, дѣйствующаго на слизистую оболочку, причемъ состояніе возбужденія можетъ простираться до воспалительной степени. Въ другихъ случаяхъ болѣзнь зависитъ, повидимому, отъ порочнаго состоянія соковъ и въ такомъ разѣ, вѣроятно, попричинѣ дурной пищи или слабаго пищеваренія, дѣлается нѣкоторый недостатокъ въ красящемъ и волокнистомъ веществѣ крови, а преизбытокъ въ бѣлковатомъ веществѣ и серозномъ началѣ оной. Иногда здѣсь замѣчается также преимущественная дѣятельность венъ при застояхъ крови въ воротной системѣ. —

Предсказаніе. Ослизеніе первыхъ путей, хотя и не

очень опасно для жизни, однажды часто бывает весьма упорно.

§ 176.

Лечење. 1.) *По пригіннимъ показаніямъ* требуется обрѣтающееся въ первыхъ путяхъ раздраженіе удалить. Нечистоты, наипаче скопленная слизь, испражняются посредствомъ приличнаго рвотнаго или слабительнаго, а глисты посредствомъ противуглистныхъ лѣкарствъ. Больной долженъ измѣнить свой образъ жизни, и оставивъ совершенно употреблениe спиртныхъ напитковъ, перейти къ самой умѣренной, не раздражающей діетѣ. Если же причиною болѣзни была безвкусная, вязкая пища, пребываніе во влажномъ воздухѣ, то надлежитъ приступить къ употреблению мясной, легковаримой пищи и хорошаго вина, также дѣлать почаще движение въ чистомъ свободномъ воздухѣ.

2) *По существеннымъ показаніямъ.* Если кишечный каналъ находится въ раздраженномъ состояніи, то часто оболакивающія и смягчающія средства скорѣе могутъ привести отдѣленіе въ нормальное состояніе и очистить языкъ, нежели собственно испражняющія, сопряженныя почти всегда съ усиленнымъ отдѣленіемъ въ кишечномъ каналѣ. Посему въ такомъ случаѣ гораздо приличнѣе предписывать нѣжныя эмульсіи, напитки приготовляемые изъ пурпурнаго корня и лакричника; сыворотку и даже осторожное употреблениe наркотическихъ средствъ (N 1. 5.). Когда же кишечный каналъ не раздраженъ, а отдѣленіе въ ономъ измѣнено такъ, что приготавляется

вязкая слизь, то въ семъ разѣ доставляютъ пользу разрѣшающія средства: среднія соли въ малыхъ разводящихъ пріемахъ. Сюда принадлежатъ: сѣрнокислый соли, нашатырь, виннокаменнонокислый соединенія, особливо *tartarus tartarisatus*, *tartarus natronatus* и пр., кои можно соединять съ большимъ успѣхомъ съ разрѣшающими экстрактами, какъ *extractum taraxaci*, *marrubii albi*, *fumariae officinalis* etc. (N 38, 39.). Весьма хорошую услугу могутъ доставлять здѣсь легкія соляные минеральные воды, особливо зельтерская, нарзанъ и пр. Въ высшей степени нераздражимости и недѣятельности кишечекъ предписывается съ пользою ревень (N 32), амоніаковая и бакаутная камеде-смола, сабуръ (N 45), ялаппа и услажненная хлористая ртуть. Въ заключеніе даются горькія средства: *extractum millefolii* (N 47), *cardui benedicti*, *centavrei minoris*, *gentinae* (N 53) и наконецъ перуанская корка и желѣзо (N 50), каковыя средства ограничиваются постепенно наклонность къ умноженному отдѣленію и способствуютъ лучшему приготовленію крови.

Mногожелчие.

(*Polycholia, status biliosus*).

§ 177.

Подъ симъ названіемъ разумѣется умноженное отдѣленіе желчи въ печени, сопровождаемое обыкновенно разстройствомъ отправленій въ смежныхъ органахъ.

§ 178.

Явленія. Больной имѣеть горькій вкусъ, языкъ его несколько обложенъ слизью и на ономъ оказываются двѣ желтоватыя, въ верхушкѣ языка сливающіяся полосы. Иногда обложена бываетъ только задняя часть языка желтоватымъ или травяноzemеннымъ цветомъ, иногда же языкъ представляется совершенно чистымъ, лоснищимся и гладкимъ. Большой имѣеть отвращеніе къ употреблению пищи, въ особенности мясной; напротивъ того жаждетъ кисловатыхъ напитковъ, ощущаетъ полноту и напряженіе подъ ложечкою, коей чувствительность не сколько увеличивается отъ прикосновенія (*bilis in præcogdiis*), а иногда возвышается до настоящей желудочной судороги (*cardialgia biliosa*). Присемъ часто оказывается тошнота, скопленіе слюны ворту, отрыжка и рвота, кою испражняется большое количество желтой или зеленої желчи (*vomitus biliosus*), либо обнаруживаются сильные рѣзи въ животѣ (*colica biliosa*), поносъ зелено-ватою матеріею (*diarrhoea biliosa*) и пр. При таковомъ желчномъ состояніи, напаче прежде изверженія желчи къ наружі, больной чувствуетъ себя очень усталымъ, разстроеннымъ, гневливымъ, имѣеть часто головную боль волбу, нерѣдко также довольно значительныя огневичныя движения, даже съ бредомъ, а иногда образуется и совершенная желчная горячка, либо желтуха.

§ 179.

Исходы. Больной рѣшается желчными испражне-

ніями, которыя однакожъ могутъ продолжаться долгое время при беспрестанномъ возбужденіи отдѣленія желчи, безъ явного улучшенія.

Смерть можетъ послѣдовать отъ сего состоянія чрезъ переходъ въ желчную горячку, желтуху и постепенное развитіе органическихъ пороковъ въ печени.

§ 180.

Расположение къ сему страданію имѣютъ преимущественно особы холерического и меланхолического темперамента. *Слугайныя пригіни* суть: гибѣвъ и очень возвышенная температура атмосферы, напаche, если она смѣняется часто холоднымъ состояніемъ воздуха, посему желчные болѣзни столь часты въ тропическихъ странахъ; далѣе продолжительное, обильное употребление спиртныхъ напитковъ, крѣпкаго кофія, портера, а при особенномъ расположениіи и слишкомъ обильное употребленіе мясной и жирной пищи; раздраженіе отъ глистъ, злоупотребленіе драстическихъ лѣкарствъ, также сочувственное раздраженіе при головныхъ поврежденіяхъ.

Сущность. Умноженное отдѣленіе желчи можетъ зависить: 1) отъ приведенія первовъ печени въ раздраженное состояніе, какъ случается при страстиахъ, сердечно-душевныхъ возмущеніяхъ, при поврежденіи мозга и пр; 2) отъ избытка въ печени горючихъ веществъ, которыя отдѣленіемъ желчи должны быть испражнены, какъ сіе случается при чрезмѣрномъ скопленіи венозной крови въ онѣ и вѣроятно также при чрезмѣрно-

возвышенной температурѣ атмосферы, отъ знояного вліянія коей, по причинѣ ограниченнаго въ семъ случаѣ самаго процесса дыханія, кровь воспринимаетъ неправильное смыщеніе.

Предсказаніе. Въ умѣренномъ и холодномъ климатѣ болѣзниные припадки отъ умноженнаго отдѣленія желчи не столько опасны, какъ въ жаркихъ странахъ, особенно окруженныхъ морями, или озерами. Впрочемъ во всякомъ мѣстѣ они могутъ угрожать большою опасностю, если испражненіе желчи изъ желчного пузыря въ кишки воспящается.

§ 181.

Леченіе. а.) *По причиннымъ показаніямъ.* Особы, имѣющіе наклонность къ обильному произроженію желчи отнюдь не должны употреблять слишкомъ много спиртныхъ напитковъ, наипаче лѣтомъ и въ жаркихъ климатахъ; напротивъ питаться болѣе растительною пищею, предохранять себя отъ сильнаго жара пребываніемъ въ прохладномъ мѣстѣ и избѣгать всякаго случая къ досадѣ и гибѣ.

б.) *По существеннымъ показаніямъ.* Если желчь излита въ желудокъ въ значительномъ количествѣ и неѣть никакихъ противупоказаній, то употребляется рвотное, которое не только испражняетъ квиѣ скопившуюся въ желудкѣ желчь, но разрѣшаetъ также застои оной въ двенадцатиперстной кишкѣ, желчномъ пузырѣ и даже въ желчныхъ сосудахъ печени. Таковую же пользу доставляютъ и желчные поносы, и потому, если они появ-

ляются, то не только не должны быть останавливающими, но даже поддерживаемы умъренными слабительными, к. т. тамариндами, очищеннымъ виннымъ камнемъ, маюю (N 12, 13, 14.) и пр. Для ограничения отдѣлений желчи служатъ кисловатые напитки, клюквенный морсъ, лимонадъ, выжатые изъ кисловатыхъ плодовъ соки, лучшая кислая щи, кипучіе порошки, кисловатыя минеральныя воды напр. кисловодскія кавказскія и пр., а при очень раздраженномъ состояніи печени смягчающія припарки на печеночной сторонѣ, втирание смягчающихъ мазей вмѣстѣ съ сѣрою ртутною мазью, пьявки къ правому подреберью, либо къ проходу и внутрь осторожное употребленіе сладкой ртути съ опіемъ. —

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Должно противудѣйствовать здѣсь желудочнымъ судоргамъ и коликѣ, предписывая преимущественно Риверіево питье, двухъ-углекислую соду (N 68), нѣжная успокаивающія средства (N 5), лимонный сокъ съ какимъ либо пѣжнымъ растительнымъ масломъ (N 55) а снаружи болеутолятельные припарки (N 48) и мази (N 49.).

Чрезмѣрное отдѣление и испражненіе сперми.
(*Pollutio, spermorrhœa, gonorrhœa*).

§ 182.

Такъ называется болѣзньенно умноженное отдѣление и бѣгъ малѣйшаго раздраженія, или даже безъ онаго, по-

следующее испражнение съмени и сока предстательной желѣзы.

Болѣзнь сія имѣеть три степени: 1.) *слишкомъ ча-стое изліяніе съмени воснъ* (*pollutio nocturna*), происходящее за однимъ разомъ въ нарочитомъ количествѣ, большою частію въ слѣдствіе обильнаго скопленія съмени въ съманныхъ пузыркахъ и живо представляющихъ чрезъ то любострастныхъ сновидѣній или грѣзей; 2.) обнаруживающееся въ *бодрственномъ состояніи* испражненіе съмени при малѣйшемъ раздраженіи, даже отъ одного возбужденія фантазіи, часто безъ всякаго напряженія уда (*pollutio diurna*); 3.) выхожденіе съмени, следующее *безъ всякаго раздраженія* и любострастнаго ощущенія либо по временамъ только напр. при мочеиспусканіи, испражненіи низа, скромъ хожденіи, либо безпрестанно по каплямъ (*spermorrhoea, gonorrhoea stricte sic dicta*).

§ 183.

Признаки, по коимъ можно заключить чрезмѣрномъ испражненіи съмени у какой либо особы, разумѣется въ юношескомъ возрастѣ, суть: блѣдное лицо съ нѣсколько впалыми глазами, имѣющими синіе кружки, біеніе сердца, легко умножающееся отъ малѣйшаго возбужденія, частыя жалобы на усталость и другія болѣзпенные ощущенія безъ достаточной причины, большая заботливость о своемъ тѣлѣ съ уныніемъ и отчаяніемъ, часто также стыдливость и потупленіе глазъ отъ врача.

Вредныя слѣдствія отъ потери съмени бываютъ раз-

личныя. Большею частію оказывается сперва чувство слабости и сонливости въ тотъ день, въ который проходило испражненіе сѣмени, потомъ мало по малу рождается постоянное безсиліе и худѣніе тѣла, слабость пищеваренія, уныніе сердечно-душевной способности, слабость памяти и чувствъ, въ особенности ослабленіе зрѣнія и наконецъ спинная сухотка.

§ 184.

Послѣдствія сіи развиваются вообще медленно и потому болѣзнь имѣеть продолжительное *теченіе*. Здоровье возстановляется постепенно, по прекращеніи случайной причины, однакожъ, при долгомъ продолженіи оной, часто на всю жизнь остается нервная слабость, оскудѣніе умственныхъ отправленій и неспособность къ совокупленію. Смерть можетъ послѣдовать здесь только отъ спинной сухотки и апоплексического удара.

§ 185.

Расположение къ сей болѣзни основывается на чрезмѣрной раздражительности нервной системы и дѣтородныхъ частей, которая бываетъ либо врожденною, либо приобрѣтается отъ долговременнаго вліянія раздражающихъ моментовъ.

Къ случайнymъ причинамъ относятся: *внѣшнія раздраженія* дѣтородныхъ частей чрезмѣрнымъ сонитѣемъ, онаніемъ, перелойнымъ воспаленіемъ; *внутреннія раздраженія* отъ органическихъ разстройствъ, какъ самихъ

дътородныхъ частей, такъ и смежныхъ органовъ отъ накоплениі мочи въ м. пузыре и твердыхъ экскрементовъ въ нижней части кишечкъ; изнѣженный *роскошный родъ жизни* при употреблениі очень питательной, пряной, раздражающей пищи, производящей скопленіе къ дѣтороднымъ частямъ и таковыхъ же напитковъ, особенно вмѣстѣ съ возбужденіемъ любострастной *фантазіи*; *нѣкоторыя болѣзни*, сопряженныя съ чрезмѣрною раздражительностью нервной системы, какъ колики, первная горячка, водобоязнь и пр.; *строгое воздержаніе* отъ совокупленія съ другимъ поломъ при несоответствующей тому діатѣ и возбужденіи *фантазіи*; *употребленіе острыхъ*, специфически раздражающихъ дѣтородные органы *слабительныхъ и мочегонительныхъ*. особенно возбуждающихъ похотливое вожделѣніе лѣкарствъ (*aphrodisiaca*) и пр.

Сущность сей болѣзни состоитъ въ раздраженномъ состояніи дѣтородныхъ частей, въ особенности органовъ, отдѣляющихъ сѣмянную влагу; въ слѣдствіе чего умпожается отдѣленіе сѣмени и ускоряется испражненіе его къ наружки.

§ 186.

Предсказаніе. Чѣмъ дольше продолжалась болѣзнь, тѣмъ хуже предсказаніе. Въ третьей степени болѣзни (*spermorrhœa*) излѣченіе часто бываетъ не возможно. Вообще успѣхъ излѣченія зависитъ здѣсь преимущественно отъ той силы воли больнаго, съ какою онъ старается побѣждать чрезмѣрно возбужденное похотливое вожделѣніе.

§ 187.

Лъченіе. а) По пригнаннымъ показаніямъ надлежить противудѣйствовать всѣмъ возбуждающимъ моментамъ болѣзни и повозможности уклонять оные. Если моменты сіи состоятъ въ органическихъ разстройствахъ, то они требуютъ либо виѣшнихъ разрѣшающихъ, либо хирургическихъ средствъ. Острыя, драстическая и мочегонительныя вещества притупляются эмульсіями, слизистыми напитками, камъорою, общими теплыми ваннами и пр. Когда же болѣзнь зависитъ отъ возбужденіаго раздраженія дѣтородныхъ частей фантастическими умопредставленіями и онаніемъ, то главное дѣло должно состоять въ преодолѣніи таковой предосудительной привычки. Для сего нужно возбудить твердую волю и геройство духа въ больномъ и открыть ему величайшую опасность сего пагубнаго порока. Больной долженъ ограничить тѣснымъ образомъ кругъ дѣйствія своей фантазіи, избѣгать дурнаго общества и чтенія любострастныхъ книгъ, заниматься постоянно отвлеченными предметами, которые бы возбуждали его вниманіе, предаваться до усталости тѣснымъ трудамъ, въ особенности на ночь передъ сномъ, не ложиться на мягкія постели и вставать по утру сколько можно раньше. Для пробужденія отъ сна при начинающемся напряженіи не худо подвязывать къ низу шулята вмѣстѣ съ дѣтороднымъ удомъ въ особенномъ мѣшечкѣ. Преданныхъ онаніи лучшіе всего укладывать спать въ такой комнатѣ, где бы находилась особа, изъ боязни къ коей они не смѣли бы подвергаться самооскверненію. Для укрощенія

безпрестанного возбуждения любострастной фантазии часто лучшее средство составляет умренное наслаждение физическою любовью, разумеется въ совершившомъ возрастѣ. Всѣ раздраженія, существующія въ кишечномъ каналѣ к. т. глисты, скопленія твердаго кала и пр. должны быть заблаговременно удалены.

b) *По существеннымъ показаніямъ* надлежитъ действовать здѣсь противъ возвышенной раздражительности дѣтородныхъ частей и умноженного отдѣленія сѣмени. Для сего весьма похваляютъ употребленіе успокаивающихъ средствъ, к. т. белены (N 1.), лавровишиневой воды (N 5), кодеина (N 2.), уксусокислого морфія (N 77); иногда минеральныхъ кислотъ, преимущественно сѣрной и фосфорной; а иногда толченаго льда, принимаемаго по блюдечку три или четыре раза въ день (*Bégin*), также камфоры въ эмульсіяхъ, либо въ порошкѣ по нѣсколько гранъ на пріемъ. Изъ наружныхъ средствъ большую пользу доставляютъ купанья въ прохладной водѣ, часто повторяемыя обмыванія холдною водою дѣтородныхъ частей, поясницы, крестца, нижней части брюха, ляшечекъ и пр. а для нѣкоторыхъ втирание камфоры, растворенной въ маслѣ на дѣтородныхъ частяхъ, въ проходной промежности и на спинѣ, либо ношеніе растерпой камфоры въ мѣшечкѣ, привязываемомъ къ мочонкѣ.

c.) *По припадочнымъ показаніямъ* надобно иногда противудѣйствовать, особенно послѣ значительного продолженія болѣзни, постепенно обнаруживающемся ослабленію силъ и упадку репродуктивной длѣтельности, для чего необходимо нужны укрепляющія средства, преимущественно тысячелистникъ (N 47),

квассія, симаруба, хина (N 9), легкія препараты желѣза (N 10) и желѣзистыя воды вмѣстѣ съ приличною питательно-оживляющею, но не горячительною діятою. При чрезмѣрномъ возбужденіи въ нервной системѣ часто доставляетъ весьма хорошую услугу опій, особливо въ соединеніи съ приличными приготовленіями сѣрной кислоты (N 16). Появляющіеся иногда изнурительные поты и поносы укрощаются корнемъ коломбы, шалфеемъ (N 78, 79) и другими крѣпительными лѣкарствами. —

Слизотечениe изъ женскихъ дѣтей.
(Blenorrhœa vaginae et uteri insons).

Син. Бѣли; fluor albus, leucorrhœa, medorrhœa.

§ 188.

Такъ называется теченіе слизистыхъ, или водянисто-слизистыхъ и серозныхъ мокротъ изъ женскихъ дѣтейныхъ частей, безъ предшествовавшаго зараженія, или страданія перелоемъ.

§ 189.

Явленія и теченіе сей болѣзни вообще бываютъ очень различны, смотря по обстоятельствамъ, при которыхъ она оказывается. Большею частію начинается она тихо и непримѣтно, часто оказывается періодически, по видимому, маловажною болѣзнью и постепенно восприни-

маеть серіозную и продолжительную форму. Сперва предъ наступлениемъ или по окончаніи мѣсячнаго очищенія, рождається слабое, не долго продолжающееся теченіе слизи, что происходит почти непримѣтно, но повторяется при всякомъ возвратѣ очищенія, дѣлаясь каждый разъ сильнѣе и продолжительнѣе; потомъ оно смѣшивается съ мѣсячнымъ очищеніемъ или совершенно замѣняетъ его, становится болѣе или менѣе постояннымъ и обнаруживается наконецъ продолжительнымъ слизоточеніемъ. Иногда оно не состоитъ въ связи съ мѣсячнымъ очищеніемъ, но начинается и проходитъ не зависимо отъ онаго; часто также бываетъ сопутникомъ или послѣдственнымъ дѣйствиемъ другаго болѣзеннаго состоянія. Испражняемая жидкость представляется различно, то чисто слизистою, то болѣе серозною, молочною и даже гнообразною, смотря по степени и основной причинѣ болѣзни; цветъ ея обыкновенно бѣлый, а въ неблагопріятныхъ случаяхъ сѣроватый, грязный и зеленый; составъ оной густоватый, вязкій, клейкій или водянистый. Что касается до вліянія, оказываемаго ею на страждущія или овлажаемыя части, то вообще оно бываетъ слабое и только въ нарочитой степени болѣзни, особенно застарѣлой, причиняетъ остротою своею жженіе, разъдѣленіе, а иногда и весьма мучительное изъязвленіе.

Количество истекающей при семъ жидкости въ началѣ болѣзни обыкновенно бываетъ малое; вообще въ легкихъ случаяхъ оно ограничивается только овложеніемъ частей и образованіемъ пятенъ на бѣльѣ, а въ значительныхъ простирается не рѣдко до фуфта и болѣе въ сутки. Днемъ вытеченіе часто бываетъ болѣе нежели

ночью и усиливается всегда отъ напряженій тѣла, употребленія раздражающихъ напитковъ и всѣхъ возбуждающихъ вліяній.

§ 190.

Продолженіе бѣлей не опредѣлительно. При благопріятныхъ обстоятельствахъ оно ограничивается нѣсколькими недѣлями и болѣзнь безъ всякихъ послѣствій переходитъ въ выздоровленіе; между тѣмъ какъ въ неблагопріятныхъ случаяхъ, особенно при продолжающемся вліяніи побудительныхъ причинъ, при обрѣтающейся большой слабости и другихъ разстройствахъ общаго здоровья она можетъ продолжаться мѣсяцы и даже годы. Въ таковомъ состояніи удобно пріобрѣтается расположение къ возвратамъ, при которомъ самый маловажный поводъ легко произраждаетъ болѣзнь снова, наконецъ мало по малу она дѣлается привычною и остается навсегда.

§ 191.

Исходы. Иногда теченіе бѣлей очень долгое время переносится безъ вредныхъ послѣствій, мало по малу однажды, то скорѣе, то мѣдленнѣе, навлекаетъ весьма важные и сумнительные *припадки*. Такимъ образомъ оно произраждаетъ постепенно большую слабость, чрезвычайную блѣдность лица со впалыми глазами; окруженными синимъ краемъ, чувство большой усталости, томпый взглядъ, слабость мышцъ, спаденіе кожи, дрожа-

ніе членовъ, наклонность къ обморокамъ и самые обморо-
ки, дурное пищевареніе, желудочные судороги, исте-
рическіе припадки, боли въ спинѣ и пояснице, къ како-
вымъ страданіямъ присоединяется скрытная изнуритель-
ная лихорадка, оканчивающаяся наконецъ смертію.
Сверхъ сего очень часто съ бѣлями соединено бываетъ
настоящее блѣдноличіе (*chlorosis*), также трудное тече-
ніе мѣсячныхъ кровей, прекращеніе онаго, бесплодіе,
выкидыши и органическія преобразованія к., т. скирръ,
полипы и ракъ.

§ 192.

Причины, производящія бѣли, очень различны и мно-
гочисленны. Болѣзни сей подвергаются женщины вся-
каго возраста, отъ ранняго дѣтства до глубокой старо-
сти. Она у самыхъ даже малолѣтнихъ дѣвочекъ рождается
иногда въ слѣдствіе вкоренившейся золотухи и глис-
тной болѣзни; въ періодѣ развитія дѣтородной системы
она оказывается часто, какъ предвестникъ мѣсячного очи-
щенія, а послѣ развитія не рѣдко сопровождается оное
очищеніе, или даже заступаетъ его мѣсто. У взрослыхъ
женщинъ бѣли составляютъ весьма обыкновенное явле-
ніе, наппаче при излишествѣ удовлетворенія плотскаго
 побужденія и произшедшаго чрезъ то ослабленія дѣто-
родной системы, послѣ частыхъ выкидышей, трудныхъ
или очень частыхъ родовъ и т. п. Въ пожилыхъ лѣтахъ
они оказываются легко въ періодѣ натурального прекра-
щенія мѣсячныхъ кровей и такимъ образомъ сущес-
твуютъ иногда во всю жизньъ до глубокой старости.

Расположение къ бѣлямъ имѣютъ наиболѣе особы, одаренные одутливымъ складомъ тѣла, также страждаущія блѣдноличіемъ, золотухою, ослизеніемъ первыхъ путей, равно какъ и чрезмѣрно раздражительныя съ эротическимъ состояніемъ дѣтородныхъ частей. *Возбуждающія пригіны* суть: частію такія, кои не посредственно дѣйствуютъ на слизистыя оболочки дѣтородныхъ органовъ, частію же такія, кои посредственно поражаютъ оныя. Къ первымъ принадлежать напиache: онанія, слишкомъ раннее и слишкоючастое плотское наслажденіе, а иногда и не удовлетворяемое побужденіе пола, трудные и скоро одни за другими слѣдующіе роды, частые выкидыши, разстроенное отправление мѣсячного очищенія, рано открывающееся кровотеченіе изъ матки, перелои и другія ослабляющія болѣзни дѣтородныхъ частей, неопрятность, очень жаркое содержаніе дѣтородныхъ частей отъ неприличного платья и ночной постѣли, употребленіе горшковъ съ горящими углами, любострастное занятіе воображенія и пр.—Къ посредственно дѣйствующимъ общимъ причинамъ относятся: простуда, особенно ногъ, злоупотребленіе ослабляющихъ теплыхъ напитковъ, сидячій излѣженный родъ жизни, пребываніе въ мокрыхъ нездоровыхъ жилищахъ, дурная, вязкая, мучнистая пища, общія ослабляющія болѣзни, скрывшійся ножной потъ, слишкомъ скоро и неосторожно излѣченныя язвы на ногахъ, продолжительная угнѣтающія страсти и т. п.

§ 193.

Сущность. Бѣли, по всему вѣроятію, могутъ произра-жаться двоякимъ образомъ: а) либо отъ раздраженного и притомъ болѣе или менѣе воспалительного состоянія слизистой оболочки, причиняемаго какъ не посредствен-но дѣйствующимъ на нее раздраженіемъ, такъ и сочув-ственнымъ или антагоническимъ возбужденіемъ, въ ка-комъ случаѣ безъ всякаго первоначального измѣненія въ сокахъ, отдѣленіе слизи можетъ умножаться и измѣняться въ качествѣ; либо б) въ слѣдствіе дурнаго качества крови, можетъ быть, преизбытка водянистыхъ и веноз-ныхъ свойствъ оной, застоя въ сосудахъ воротной системы и пр. отъ чего отдѣлительному органу доставляются порочныя вещества для животно-химическихъ процес-совъ и отдѣленіе измѣняется.—Посему-то слизотече-пакое часто представляетъ токмо мѣстный отпечатокъ общаго несовершенства соковъ, и какъ натура, почти при всѣхъ худосочіяхъ, избираетъ для отдѣленій преимуще-ственно слизистую оболочку, то такимъ же образомъ дѣйствуетъ она и здѣсь посредствомъ слизистыхъ оболо-чекъ дѣтородной системы, при чемъ онѣ дѣлаются какъ бы относительно критическими отдѣлительными орга-нами.

§ 194.

Предсказаніе. Бѣли, хотя сами по себѣ, въ чистой формѣ, не составляютъ очень опасной болѣзни, но за то онѣ очень часто бываютъ упорны, продолжительны и

какъ для больного, такъ и для врача весьма тягостны. Лѣченіе ихъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ большее обрѣтается при оныхъ расположениѣ къ слизотечеіямъ вообще, чѣмъ затруднительнѣе удаленіе возбуждающихъ причинъ, чѣмъ старѣе страждущая особа, чѣмъ долѣе уже продолжалась болѣзнь и чѣмъ болѣе теченіе уклоняется отъ слизистаго свойства и оказывается дурно-гнойнымъ, зловоннымъ и разъѣдающимъ. Сверхъ того предсказаніе дѣлаютъ неблагопріятнымъ многія сопряженія. Сюда относятся напаче судороги, истерические припадки, кровотеченія изъ матки, истощеніе тѣла, водяная болѣзнь, въ особенности же припадки, доказывающіе присудствіе органическихъ пороковъ матки, нарывовъ, полиповъ, скирра и рака. Наконецъ опытомъ дознано также, что женщины, страждущія бѣлями часто бываютъ бесплодны и удобно подвергаются выкидышамъ, и что бѣли иногда сами собою проходятъ при наступлении періода зрѣлости, въ которомъ энергія маточной системы возвышается.

§ 195.

Лѣченіе. Такъ какъ бѣли происходятъ отъ многоразличныхъ причинъ, то одинъ и тотъ же способъ лѣченія во всѣхъ случаяхъ отнюдь не можетъ быть приличенъ. Къ сожалѣнію однакожъ часто случается видѣть, что лѣченіе ихъ предпринимается безъ всякаго различія. Убѣдившись въ томъ, что бѣли бываютъ слѣдствiemъ ослабленія и зависятъ то отъ мѣстной, то отъ общей слабости, ихъ стараются уничтожить мѣстными или общими

крѣпительными средствами и чрезъ то иногда не только не доставляютъ пользы, но причиняютъ даже вредъ. Вообще весьма не простительно при всякомъ родѣ бѣлѣй дѣйствовать тотчасъ на пріостановленіе теченія употребленіемъ наружныхъ средствъ. Отъ сего нерѣдко проираждаются важныя общія и мѣстныя разстройства. Вообще для щастливаго излѣченія сей болѣзни первое условіе должно состоять въ томъ, чтобы пріобрѣсть точное свѣденіе о существенной или основной причинѣ ея и сообразно тому начертывать рациональный планъ лѣченія. Въ такомъ случаѣ излѣченіе часто безъ содѣствія мѣстныхъ средствъ удается даже тамъ, где оно по напрасну испытывалось было въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. И такъ а) по пригнаннымъ показаніямъ должно удалить всѣ вредности, какъ непосредственно удручающія дѣтородныя части, такъ и сочувственно, или антагонистически дѣйствующія на нихъ. Въ семъ отношеніи всѣ вредныя для здоровья вліянія, к. т. дурная діета, нечистота, простуда, частое соитіе и т. п. въ точности должны быть избѣгаемы. Больной надлежитъ предписать надлежащиій образъ жизни, совѣтовать часто движеніе въ свободномъ воздухѣ, стараться уклонять застои въ воротной системѣ и присудствіе глисъ въ кишечномъ каналѣ, противудѣйствовать часто слу чающемуся здѣсь лишайному худосочію и, для лучшаго узнанія основной причины страданія, изслѣдоватъ въ точности дѣтородныя части. Большую пользу доставляетъ здѣсь соблюденіе чистоты и опрятности, а потому не обходимо нужно каждый день омывать дѣтородныя частія тепловатою водою, дѣлать общія, или мѣстныя ванны

особливо посредствомъ бидета (*bidet*). Пища должна быть простая, легкая, не разгорячающая, умеренно употребляемая; горячительные напитки вредны, а крѣпительная діэта съ умереннымъ употребленіемъ краснаго вина, только при особыхъ обстоятельствахъ, доставляетъ иногда пользу.

б) *По существеннымъ показаніямъ* надобно собразоваться съ главнымъ качествомъ страданія.

1.) Когда болѣзнь имѣеть болѣе дѣятельное, воспалительное свойство и соединена съ возвышеніою жизнедѣятельностию, съ полнокровiemъ и стеническимъ расположениемъ, какъ часто случается у молодыхъ полнокровныхъ женщинъ, то требуется противувоспалительный способъ, иногда довольно сильный и избѣжаніе всѣхъ вліяній и мѣстныхъ средствъ, дѣйствующихъ прямо на пріостановленіе теченія. Для внутренняго употребленія приличны здѣсь приготовленія селитры (N 18, 61, 62) и другія прохладительныя, умѣряющія средства, наипаче въ формѣ эмульсіи (N 5, 36), или въ слизистыхъ отварахъ к. с. decoct. altheæ. graminis, hordei, ave-næ etc. и притомъ, смотря по обстоятельствамъ, мѣстныя или общія отвлеченія крови, кои не обходимы наипаче въ то время, когда болѣзнь оказывается въ следствіе прекращеніаго мѣсячнаго очищенія и соединена съ сильнымъ приливомъ крови къ маткѣ, съ болями въ оной и т. п. Изъ мѣстныхъ средствъ назначаются въ семъ случаѣ нѣжныя, смягчающія и успокоивающія, к. напр. тепловатыя ванны въ бидетѣ (*in sessus*) изъ отваровъ смягчающихъ травъ, бузины, просвирокъ, алтейнаго корня и пр.

2) Если же на противъ того болѣзнь соединена дѣйствительно съ мѣстною или общую слабостю, блѣдностю и одутливостю лица, слабымъ, иногда очень скорымъ жиlobieniemъ, отекомъ ногъ къ вечеру и т. п., то необходимо нуженъ крѣпительный способъ лѣченія, употребляемый однакожъ съ осторожностю и въ должной мѣрѣ. Здѣсь предписываются: квассія (N 86), горкій трилистникъ, симаруба, горечавка (N 33), тысячелистникъ (N 47), коломба (N 50), каскариль, хина, желѣзные составы (N 87, 88, 56, 58), известковая вода (N 86), желѣзныя минеральные воды, особенно пирамонтская, эгерская и пр. Средства сіи, смотря по обстоятельствамъ, могутъ быть соединены съ чисто стягивающими (N 65), разрѣщающими, возвышающими маточную энергию (N 44, 75), бальзамическими (N 51). Особеннаго вниманія заслуживаетъ *piper cubeba*, даваемый въ порошкѣ, четыре раза въ сутки по драхмѣ (*Delpech*). Тамъ, где крѣпительные средства трудно переносятся, лучше возвышать силы приличною укрѣпляющею дієтою, ваннами и пр. Крѣпительно-стягивающія средства к. *raianhia*, *lign. campechiense*, *alumen*, *elex. acid.* *Halleri*, *uva ursi* и пр. приличны напипаче при очень обильномъ водянистомъ течении бѣлей.

Что касается до употребленія *наружныхъ* средствъ к. т. ваннъ, впрыскиваний, окуриваний и т. п., то ихъ надлежитъ предписывать всегда съ особеннымъ обращениемъ вниманія на индивидуальныя обстоятельства, дабы неумѣстнымъ раздраженіемъ больныхъ частей, простудою, или преждевременнымъ прекращеніемъ такового отдѣленія не подать повода къ другимъ очень важнымъ

болѣзнямъ. Простыя общія и мѣстныя ванны можно употреблять почти во всякомъ родѣ бѣлей. Крѣпительные ванны изъ настоя и отвара ароматныхъ травъ, к. напр. изъ шалфея, розмарина, лаванды, ромашки и пр. также изъ стягивающихъ веществъ на пр. изъ отвара ивовой, дубовой и хинной корки доставляютъ большую пользу тамъ, гдѣ явственно оказывается дѣйствительная слабость, общая или мѣстная; но холодныя и желѣзныя ванны, такъ какъ и вообще мѣстное употребленіе холдной воды требуютъ большой осторожности, особенно въ такомъ случаѣ, когда отъ скораго прекращенія бѣлей можно опасаться переносовъ. Для впрыскиваній одобряются наиболѣе настоя смягчающихъ веществъ: просвирняка, мальвы, бузины, цвѣтовъ коровяка (*verbasum*) и пр. Сильныя боли умѣряются часто отъ прибавленія маковыхъ головокъ, белены и болиголова. Хотя при возвышеннѣй раздражительности и воспалительному страданіи дѣтородныхъ частей можно дѣлать впрыскиванія изъ смѣшивающей съ молокомъ извѣстковой воды или слабаго раствора уксусокислаго свинца, однакоожь смягчающія вещества заслуживаютъ всегда преимущество, тѣмъ болѣе, что дѣйствуютъ также противъ самаго раздраженія и воспаленія. Когда бѣли зависятъ отъ мѣстныхъ пороковъ, отъ полипныхъ нарашеній, раковидныхъ перерожденій и т. п., то прибавленіе одурника (№ 89), лавровишневой воды, либо мирры очень полезно. Для укрѣпляющихъ впрыскиваній избираются такія же вещества, какъ и для крѣпительныхъ ваннъ. Впрыскиванія изъ отвара ивовой, дубовой или хинной корки съ прибавленіемъ квасцовъ (№ 90) могутъ

быть очень полезны для вялыхъ, нераздражительныхъ особъ, наипаче въ позднѣйшихъ периодахъ болѣзни; между тѣмъ какъ раздражительными и чувствительными людьми, равно какъ и расположеными къ воспалительнымъ страданіямъ очень дурно переносятся. Похваляются также въ позднѣйшихъ периодахъ, при существующей большой слабости, впрыскиванія изъ терпентинаго масла, бальзама копайника (N 91) и перуанскаго, кои дѣйствуютъ противутгилостно и уничтожаютъ нагноеніе. Изъ таковыхъ же средствъ, сообразно существующему состоянію, можно предписывать обмыванія, припариванія, полуваны и пр. Вкладываніе въ рукавъ матки тампоновъ, губокъ и пр. вещей, обмакиваемыхъ въ какое либо изъ означеныхъ лѣкарствъ, не удобно, потому что легко причиняетъ излишнее механическое раздраженіе. Весьма не вѣрно дѣйствуютъ также подкуриванія изъ бальзамическихъ веществъ к. т. ладана, стираксы, янтаря, можжевеловыхъ ягодъ и пр. ибо онѣ почти не проникаютъ къ страждущимъ частямъ, но легко могутъ наносить вредъ усиленною теплотою. Иногда весьма хорошее дѣйствіе оказываютъ промывательные изъ бальзамическихъ (N 92.) веществъ (*Velpeau.*)

3.) Въ упорныхъ случаяхъ надлежитъ обращать вниманіе на уничтоженіе *сопряженій*, вообще *побочныхъ страданій*, поддерживающихъ не рѣдко теченіе болѣй. Такимъ образомъ при болѣяхъ, зависящихъ отъ венозныхъ застоевъ въ брюхѣ (*levorrhœa venosa*) употребляются съ большою пользою карлсбадскія и маріенбадскія воды, особенно т. п. Крейцъ-бруннъ, Оберъ-зальцъ-бруннъ,

эмскія и пѣкоторыя сѣрощелочныя кавказскія воды, особенно источникъ N 10; kali tarlaricum (N 14), acetum, горькие разрѣшающіе экстракты (N 34, 38, 39), gum-mata ferulacea, мыльные составы (N 32), иногда rad. hellebori nigri, gratiola, colocynthis (N 46), вообще назначаются разрѣшающія сѣрия лѣкарства и минеральныя воды. Гдѣ явственно оказываются неправильности геморроя вмѣстѣ съ бѣлями, тамъ съ пользою можно противудѣствовывать онимъ сѣрыми цвѣтами (N 31, 40, 41.), пѣявками, парами, припускаемыми къ проходу и пр. При очень вкоренившемся худосочії (*Levcorrhœa dyscrasica*) надлежитъ обращать должное вниманіе на общее страданіе и золотушное сопряженіе стараться уничтожать рутными, сурмянными, юдовыми, также, смотря по обстоятельствамъ, крѣпительными и желѣзными средствами; а рахитическое и хлоротическое состояніе истреблять преимущественно горькими, крѣпительными желѣзо содержащими лѣкарствами. Составоломныя и ревматическія формы сопряженій требуютъ употребленія сурмяныхъ средствъ, *æthiopis antimonialis*, *guajaci*, *aconiti*, *saponariae*, *sarsaparillæ* etc. Въ лишайномъ и томъ худосочії, которое по свойству своему еще мало извѣстно и, которое Зунделинъ называетъ *allgemeine SÙchtigkeit*, доставляютъ большую помощь кровоочистительные средства (*rhæmatocathartica*), наипаче decoct. *Zittmanni*, decoct. sulphureti calcis. Hoffmanni (Rp. *Calcar. sulphur. stibiatæ* 3j. *Coque cum Aquæ destill.* lib. v. ad remanent. lib. jv. Col. D. S. Принимать по половинѣ фунта 1. 2. или 3 раза въ день съ молокомъ, либо мяснымъ бульономъ); также солянныя, сѣрия, а послѣ же-

лѣзныя ванны вмѣстѣ съ крѣпительными лѣкарствами. Когда болѣзнь чрезвычайно упорна и общаго худосочія еще не замѣчается, то часто дѣйствуютъ очень хорошо искусственныя язвы на рукахъ и ляшкахъ, особенно когда бѣли появились послѣ воспященнаго пота, скрывшагося лишая, скоро залѣченныхъ хроническихъ язвъ ипр. Тамъ, гдѣ причиною болѣзни бываетъ мокротное худосочіе и атоническое состояніе, большую пользу доставляютъ квассія, особенно настаиваемая известковою водою (N 86), щелочно-желѣзистыя воды и наконецъ крѣпительные средства вмѣстѣ съ бальзамическими (N 87, 88).

Недавно рекомендовано было употребленіе іодина въ бѣляхъ, и такъ какъ опь составляеть проницательное средство для желѣзистой системы, то вѣроятно долженъ быть весьма дѣйствителенъ; однакожъ онъ требуетъ всегда большой осторожности. Лучше всего предписывать для сего hydrojodas ferrі какъ внутрь, такъ и снаружи (Pierquin) (N 93).

ГЛАВА СЕДМАЯ.

БОЛѢЗНЕННЫЯ ИСПРАЖНЕНИЯ.

P р о т а .

(*Vomitus, emesis, hyperemesis*).

§ 196.

Рвотою называется не произвольное, совершающееся вдругъ съ болѣе или менѣе сильнымъ напряженіемъ