

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ОБЪ ИСХОДАХЪ ВОСПАЛЕНИЯ.

§ 36.

Междъю воспаленіемъ и его исходами нѣтъ никакого промежуточнаго состоянія;—они оказываются въ непрерывномъ послѣдованіи. Вообще исходы суть только дѣйствительныя обнаруживанія того, что содержалось въ воспаленіи готовымъ уже къ событию. Они удерживаютъ даже болѣе или менѣе характеръ первоначальнаго состоянія. Такимъ образомъ при наступившемъ на гноеніи, при отвердѣніи и антоновомъ огнѣ все еще существуетъ воспаленіе, хотя въ болѣе или менѣе измѣненномъ видѣ. Впрочемъ собственно только *выпотыніе* и дальнѣйшее преобразованіе онаго—*нагноеніе*, какъ произведенія образовательнаго стремленія, оказываются при неразрѣшившемся воспаленіи, прочие же исходы большею частію рождаются тогда, когда воспаленіе измѣняетъ свойство свое и воспящается въ чистомъ развитіи и совершеніи своемъ.

A.) Выпотыніе и нагноеніе.
(Exsudatio et suppuration).

§ 37.

При возвышенной степени воспаленія, продолжавша-

гося извѣстное время, начинается въ воспаленію мѣстъ собственного рода отдѣленіе соковъ изъ разложеній крови, составляющее болѣзненно-отдѣлительный процессъ. Воспаленный органъ, разлагая кровь, по разности состоянія оной, по силѣ воспаленія и по другимъ условіямъ, отдѣляетъ *сыворотку* то чистую, прозрачную, то красноватую, съ кровью смѣшанную, то изобилующую створоженнымъ бѣлкомъ и *волокнистымъ веществомъ*, способнымъ производить ложныя перепонки и другія ложныя образованія, то смѣшанную съ разложеннымъ, нествороженнымъ и отъ волокнистаго вещества крови совершение отличнымъ, бѣлковатымъ веществомъ (*епой*).

§ 38.

Простѣйшее флогистическое разложеніе крови есть *серозное выпотъніе*, при чмъ кровяные шарики остаются въ органѣ въ неизмѣнномъ состояніи, а сыворотка отлагается на поверхность, — посему выпотъніе таковое оказывается токмо въ самомъ началь и въ неочень значительной степени воспаленія. Если же шарики разлагаются на волокнистое и красное вещество крови, то часть послѣдняго примѣшивается къ выпотѣвшей сывороткѣ, между тѣмъ какъ волокнистое вещество задерживается въ паренхимѣ, въ какомъ случаѣ происходит *кровяно-серозное выпотъніе*, которое предполагаетъ уже извѣстную степень сваренія.

Простое серозное выпотъніе оказывается преимущественно при воспаленіи серозныхъ оболочекъ, наибол-

лѣе послѣ чрезмѣрно ослабляющаго лѣченія, также при неблагопріятныхъ вліяніяхъ атмосферы и другихъ окружающихъ обстоятельствъ, или при особенномъ расположениіи больнаго. Въ такомъ случаѣ отдаленіе серозныхъ влагъ, въ слѣдствіе возвышенной жизнедѣятельности, умножается до такой степени, что не можетъ быть воспринято всасывающими сосудами и, будучи не въ состояніи свободно испражниться къ наружѣ, скапливается въ полостяхъ и промежуткахъ тѣла. Такъ образуются водянистые накопленія (*hydrops acutus*) при воспаленіи серозныхъ покрововъ мозга и всѣхъ прочихъ внутренностей, также серозныхъ оболочекъ: околосердечія, грудной плевы, брюшины и пр. Весьма часто водянистые накопленія рождаются и въ клѣтчатомъ составѣ органовъ, особенно если воспаленія серозныхъ покрововъ нарушаются въ теченіи своеимъ, или воспіращаются въ критическихъ дѣйствіяхъ. Такъ напр. при воспіашеніи накожного воспаленія случается всегда или отекъ (*oedema*), или подкожная водяная болѣзнь (*hydrops subcutaneus*).

Въ пластическомъ выпотливіи составные части крови пропицаютъ чрезъ стѣнки сосудовъ, либо чрезъ отверстія ихъ (напр. въ ранахъ) и отлагаются на поверхность органовъ, не перерабатываясь жизненнымъ процессомъ въ волосныхъ сосудахъ и въ органической ткани, какъ бываетъ вообще при отдаленіяхъ. Появляющаяся здѣсь животворная пасока, которая, подобно пищательному соку и крови, оживлена, по видимому, первою системою, представляетъ, какъ въ отношеніи материальныхъ качествъ, такъ и силь, большое сходство съ оплодотвореннымъ яичнымъ желткомъ, ибо въ обѣ-

ихъ оказываются почти одинаковые жизненные процессы. При воспаленіи серозныхъ оболочекъ, переходящемъ въ сращеніе, выпотѣваемая студенообразная масса превращается въ плотную, сначала просвѣчивающую перепонку и въ кровяные шарики, представляющіе сперва красныя точки, а наконецъ красныя полоски (сосуды), кои устьями своими соединяются съ находящимися уже сосудистыми потоками, такъ что процессъ таковой совершенно сходствуетъ съ развитіемъ органическаго существа и кровяныхъ шариковъ въ массѣ оплодотвореннаго желтка. Таковая же точно пасока выпотѣваетъ обыкновенно и на поверхности свѣжихъ ранъ, если только въ опыхъ существуетъ самое легкое воспаленіе и соблюдаются всѣ условія скораго соединенія ихъ. И такъ въ слѣдствіе пластического выпотѣнія при воспаленіяхъ серозныхъ покрововъ внутреннихъ какихъ либо органовъ произражаются не правильныя сращенія ихъ, какъ болѣзниенные исходы; а въ свѣжихъ ранахъ совершается исцѣленіе.

§ 39.

Внутреннее паренхимное выпотѣніе съ особеннымъ животно-химическимъ разложеніемъ крови происходитъ только въ *нагноеніи* (rúogenesis), когда воспаленіе достигнетъ совершенного развитія. Посему нагноеніе представляетъ совершенѣйшій видъ выпотѣнія. Посредствомъ онаго, при содѣйствіи сообразной степени воспаленія, совершается въ тѣлѣ особенное стремленіе къ органическому произведенію, на подобіе питанія, и от-

дѣлается изъ пластическихъ составныхъ частей кроны бѣлка и волокнистаго вещества, собственнаго рода жидкость (*pus*), неимѣющая впрочемъ органическихъ свойствъ. Вообще главное дѣйствіе нагноенія состоить въ томъ, чтобы непотребное удалить изъ тѣла и на мѣсто его произвести лучшее. Посему гноящаяся часть дѣлается настоящимъ отдѣлительнымъ органомъ, при чёмъ существо его отнюдь непревращается въ гной. Если и случается иногда при нагноеніи потеря существа, то она независитъ отъ нагноенія, но отъ другихъ побочныхъ обстоятельствъ, напаче отъ предшествовавшаго чрезмѣрного воспаленія, которое нерѣдко производить столь значительныя измѣненія въ страждащемъ составѣ, что онъ неможеть уже служить для организма и, какъ непотребный, долженъ быть удаленъ. При самомъ даже изъязвлѣніи (*exulceratio*) потеря существа непроисходитъ отъ самаго нагноенія, но отъ сопровождающаго оное помертвѣнія, которое непримѣтно бываетъ, если оказывается въ малыхъ частицахъ (*Ведемейеръ*).

§ 40.

Свойства гноя. Гной (*pus, humor purulentus*) есть жидкость особеннаго рода, неимѣющая сходства съ другими животными соками, хотя, подобно онымъ, отдѣляется всегда изъ кроны, которая одна доставляетъ материалъ для образования гноя. Жидкость сія, какъ продуктъ воспаленія и нагноенія, несуществуетъ въ здоровомъ состояніи и потому составляетъ всегда совершенно новую матерію, отличающуюся отъ другихъ жидкостей,

приготовляемыхъ изъ кроzi (моча, слюна, желчь и проч.) содержаниемъ въ себѣ т. н. гнойнаго вещества, которое, будучи отдельено отъ прочихъ составныхъ частей гноя, имѣеть бѣлый цвѣтъ, непрозрачно, нествораживается и трудно растворяется въ водѣ.

Самый гной, какъ содержалище гнойнаго вещества, въ доброкачественномъ состояніи представляетъ непрозрачную, довольно густую, слизистую, свѣтло-желтую, иногда изъ бѣла-серую, либо зеленоватую жидкость, которая имѣеть приторный собственного рода запахъ, теряющійся по охлажденіи и слабый вкусъ, неоказывающій почти никакого ощущенія на языкѣ. Будучи удельно тяжелѣйшимъ воды, онъ погружается въ ней на дно и въ смѣшаніи съ водою образуетъ молочную (эмульсивную жидкость), въ которой нерастворяется, но, повидимому, только смѣшивается, ибо оставленный въ покое, опять отстаивается. При кипаченіи съ водою гной створаживается и послѣ выпариванія оставляетъ экстрактивную матерію, подобную той, которая получается вообще изъ животныхъ жидкостей. Отъ алкоголя гной створаживается, а въ крѣпкой серной кислотѣ растворяется и перемѣняется въ темнопурпуровый цвѣтъ, каковыи растворъ отъ прибавленія воды осаждается на дно бѣлымъ цвѣтомъ. Крѣпкая селитренная кислота растворяетъ гной при сильномъ вскипаніи, образуя лимонно-желтую жидкость, изъ которой посредствомъ воды гной осаждается сѣро-желтымъ цвѣтомъ. Крѣпкій ёдкій поташъ превращаетъ гной въ бѣлую, единообразную, въ нити растягивающуюся жидкость, которая осаждается, какъ отъ воды, такъ и отъ кислотъ. Отдаленные составные части

гноя суть вообще белковатое, экстрактивное и подобное жировосковой матеріи вещество, также солянокислая и фосфорокислая сода. Впрочемъ такъ какъ гной, по разности воспалаемыхъ частей, по степени воспаленія и по сложенію болѣаго, очень различенъ бываетъ, то и самыя химическія изслѣдованія онаго несовершенно согласны. *Берцеліусъ* приводить о семъ слѣдующее: гной непроизводить ни кислотныхъ, ни щелочныхъ реагенцій, но на воздухѣ легко окисаетъ, впрочемъ не надолго; ибо въ скоромъ времени развивается изъ онаго свободный амміакъ. Подъ сложнымъ микроскопомъ гной представляется разнообразною массою, состоящею изъ маленькихъ иловатыхъ, неправильныхъ частичекъ неравной величины, а по наблюденіямъ другихъ, изъ малѣйшихъ тѣлъ, сходныхъ по величинѣ своей съ органическими шариками (*moleculi*). Сіи шарики или зернушки гноя, по *Веберу*, бываютъ болѣе и прозрачнѣе кровяныхъ, въ свѣжемъ состояніи представляются весьма круглыми, въ водѣ увеличиваются и раздѣляются на малыя частицы, восприимая иногда извѣтъ форму шелковичной ягоды. Поелику они бываютъ вдвое болѣе, нежели зернушки, обрѣтающіяся въ мутной части слизи и поелику прозрачная часть слизи не содержитъ совершенно никакихъ зернушекъ, то сіе можетъ служить удовлетворительнымъ средствомъ къ отлигію гноя отъ слизи. Въ гноѣ изъ ампутаціонныхъ ранъ и изъ харкотныи чадотныхъ *Веберъ* находилъ зернушки одинаковой величины. Поперечникъ таковыхъ зернушекъ содержитъ отъ $\frac{1}{300}$ до $\frac{1}{500}$ парижскаго дюйма. Въ разсужденіи величины гноиные шарики чрезвычайно сходны съ ша-

риками, находящимися въ слюнѣ, впрочемъ въ семъ отношеніи можетъ служить отличіемъ то, что слюнные шарики показываются только порознь, между тѣмъ какъ гнойные представляются въ большемъ количествѣ одинъ возлѣ другого и скоро погружаются на дно. Таковая разность зернушекъ гораздо вѣрнѣе можетъ руководить къ отличію гноя отъ слизи, нежели представленные до сего пробы *Дарвина*, *Андралля*, *Бругмана*, *Граммейера* и *Грутгизена*.

§ 41.

Разности гноя, встречающіяся въ конкретныхъ болѣзняхъ случаихъ, зависятъ отъ измѣняющагося количественного содержанія гноинаго вещества къ серозной жидкости, отъ случайной примѣси постороннихъ веществъ, слизи, крови, члено-составной влаги, жира, отъ истребляемыхъ изъязвленіемъ мягкихъ частей, наконецъ отъ степени разложенія и гненія самихъ составныхъ частей гноя. По сemu гной бываетъ *густоватый*, *чрезмѣрно густой* (*glutinosum*) и *жидкий*. Сей послѣдний, если онъ потерпѣлъ известную степень разложенія и имѣетъ зловонный запахъ, называется *дурнокачественнымъ*, *разъльдающимъ гноемъ* (*ichor, sanies*); а красноватый гной, смѣшанный съ разложеніемъ кровью имѣется *сукровицей* (*p. sanguentum*). Когда къ гною примѣшивается слизь, пасока или сыворотка, вообще когда гной неимѣетъ настоящаго вида, то называется гноебразною матеріею (*materia purulenta*). Хорошій, посредственно густой гной рождается только при *флегмо-*

нозномъ воспаленіи въ подкожной клѣтчатой плевѣ. Въ паренхимѣ внутренностей и въ отдѣлительныхъ органахъ онъ бываетъ смѣшанъ съ посторонними частями, какъ напр. гной желѣзистый, мозговой, легочной, печеночный, костной и проч. Равнымъ образомъ при нагноеніи слизистыхъ, серозныхъ и синовіальныхъ перепонокъ гной перемѣшивается съ произведеніемъ ихъ отдѣленія, отчасти продолжающагося еще, по измѣненнаго воспаленіемъ. Посему чистый, несложный процессъ нагноенія обрѣтается токмо въ флегмонозномъ, клѣтчато-плевистомъ парывѣ, составляющемъ образецъ всѣхъ прочихъ произведеній гноя.

B.) Гнойной парывъ.

(*Abscessus*).

Syn. apostema, apostasis, exitura, vomica.

§ . 42.

Паривомъ называется полость въ какомъ либо органическомъ составѣ, не натурально образовавшаяся и содержащая въ себѣ гной, или гнойную жидкость, отдѣленную не по естественнымъ законамъ жизненныхъ от правленій, но при содержаніяхъ не правильно возвышенной жизнедѣятельности въ слѣдствіе воспаленія.

Сначала полость сія бываетъ очень малая, заключающая одну или иѣсколько капель гноя; но она увеличивается по мѣрѣ умноженія гноя, отъ давленія коего, дѣйствующаго эксцентрически, рождаются и самыя стѣнки полости. Стѣнки сіи образуются изъ воспаленнаго клѣтчаго вещества, которое отъ распуханія и периферического вы

потѣнія отодѣтвается такъ, что представляетъ иѣсколько слоевъ и почти сумочную перепонку, имѣющу вну- три негладкую, бугристую поверхность. Таковая пере- понка обрѣтается почти при всякомъ нарывѣ и только тамъ небываетъ, гдѣ чрезвычайный упадокъ жизнѣдѣя- тельности, либо чрезмѣрно скорое распространеніе гноя подъ сухожиліями и сухожильными перепонками пре- пятствуютъ образованію ея. Въ полости сей перепонки, кромѣ гноя, содержатся также многія волокнистые жил- ки (*filamenta*) остатки нервовъ, сосудовъ и клѣтчатой пlevы, кои большею частію неимѣютъ никакой жизнен-ности, иногда однакожъ проводятъ кровь и при разрывѣ своемъ изливаютъ оную.

§ 43.

Нарывы раздѣляются обыкновенно 1.) *по состоянію и степени ихъ жизнедѣятельности*: а.) на воспа- лительные (*abscessus inflammatorii s. phlegmonodes*) и б.) холодные наривы (*absc. chronicci, frigidi*). Первые составляютъ произведеніе явнаго воспаленія и сопровож- даются припадками возвышенной жизнедѣятельности, а въ послѣднихъ таковыя явленія оказываются не столь явственно, либо примѣчается только одно раздраженіе при ихъ происходженіи, но въ рѣдкихъ случаяхъ небыва- ваетъ никакихъ припадковъ.

2.) *По усилію къ заживленію*: а) *гноящіеся на-* ривы (*absc. suppurativi*), заключающіе въ себѣ добро- качественный гной и всѣ условия къ скорому заживле- нию; б) *изъязвляющіеся* (*absc. ulcerativi*), кои отдѣляютъ

жидкій гной, сопряжены съ медленнымъ разрушениемъ существа и превращаются въ язвы; с.) *антоновоогненныя* (absc. gangraenosi), кои соединены съ помертвѣніемъ животной массы и содержать жидкой гной, смѣшанный съ антоновоогненною сукровицею, какъ при злокачественномъ вередѣ, чумныхъ паховикахъ и проч.

3.) По происхожденію и причинамъ: а) *мѣстные* или *идиопатические* парывы (absc. topici s. idiopathici) т. е. такие, кои происходятъ отъ вѣшилого мѣстнаго вліянія на какую либо часть, напр. отъ мѣстнаго воспаленія, проницанія въ тѣло постороннихъ веществъ, раненія и проч. б) *общіе* или *конституціональные* парывы (absc. constitutionales), коихъ образование зависитъ отъ внутреннихъ причинъ, напр. парывы конгестивные, также рождающіеся при ревматическомъ, венерическомъ, золотушномъ и другихъ страданіяхъ; с) *переносные* парывы (absc. metastatici) суть тѣ, кои оказываются въ другомъ мѣстѣ, отдаленномъ отъ первоначально пораженнаго, либо обнаруживаются послѣ общей болѣзни съ критическимъ рѣшеніемъ внутренняго страданія, въ какомъ случаѣ именуются *критическими* (absc. critici).

4. По мѣстопребыванію парывы раздѣляются а) на *поверхностные, наружные* (superficiales, externi) и б) въ *глубинѣ обрывающіеся, внутренние* (absc. interni, occulti; vomicae).

5. Въ отношеніи къ органамъ парывы бываютъ: а) *клѣптично-плевистые* (absc. phlegmonodes), б) *рождающіеся въ желѣзистыхъ составахъ* (absc. glandulosi),

с) въ поясничныхъ мышцахъ (absc. lumbales), д) въ лимфатическихъ сосудахъ (absc. lymphatici) и проч.

§ 44.

Впрочемъ абсолютной разности между нарывами не существуетъ (*Ph. v. Walther*). Она можетъ быть только относительная, основывающаяся собственно на различной степени воспаленія, существующаго въ стѣнкахъ нарывовъ и на качествѣ гноя, содержащагося въ оныхъ. Въ таковой степенной разности первое мѣсто занимаетъ флегмонозный или клѣтчатый наррывъ, а золотушный, образующійся въ желѣзистыхъ частяхъ, поясничный, конгестивный и лимфатический содержится къ нему, какъ члены въ очередномъ, исходящемъ послѣдованіи. Такимъ образомъ въ флегмонозномъ, клѣтчато-плевистомъ наррывъ гноемъ бываетъ самой лучшей и густѣйшей, въ золотушномъ и поясничномъ хуже, а еще хуже въ холодномъ конгестивномъ наррывѣ; но самое неправильное смѣшеніе гноя, въ противоположности къ флегмонозному, представляетъ лимфатический наррывъ. Точно также содержится и степень воспаленія. Флегмонозному наррыву предшествуетъ и сопутствуетъ всегда сильнѣйшее воспаленіе, въ золотушномъ оно оказывается очень слабымъ, медленнымъ, недѣятельнымъ и не состоить въ соразмѣрности съ медленно раждающимся гноемъ; въ холодномъ, конгестивномъ наррывѣ не примѣчается уже никакого воспалительного противодѣйствія въ гноящихся органахъ, покрайней мѣрѣ оно бываетъ непримѣтно и существуетъ въ очень слабой степени; а въ такъ называемомъ лим-

Фатическомъ нарывѣ не обнаруживается, по видимому, никакого воспаленія. При такой разности силы воспаленія въ стѣнкахъ гноящихся полостей необходимо должно принять, что воспаленіе вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняется и качественно. Такимъ образомъ воспаленіе въ стѣнкахъ золотушного, желѣзистаго нарыва отличается не одною слабѣйшею степенью силы своей, но и въ качественномъ отношеніи должно быть почитаемо другимъ, нежели въ флегмонозномъ нарывѣ.

Нагноеніе безъ воспаленія, покрайней мѣрѣ безъ усиленія къ оному, существовать не можетъ; въ холодныхъ нарывахъ оно находится только въ непримѣтной степени, а лимфатические рождаются въ частяхъ, где натура силилась произвести воспаленіе, но оно, по причинѣ слишкомъ слабой жизнедѣятельности органовъ, по причинѣ чрезмѣрно упавшей нервной силы и образовательности крови, не могло развититься даже до примѣтной степени и нагноеніе образовалось въ слѣдствіе одного страдательного скоплѣнія.

§ 45.

Явленія, замѣчаемыя въ теченіи наривовъ бываютъ не одинаковы. Въ началѣ воспаленнаго нарыва или въ то время, когда воспаленіе переходитъ въ нагноеніе, всѣ припадки болѣе и болѣе умножаются, опухоль увеличивается, дѣлается тверже, ограниченнѣе и воспринимаетъ темнокрасный цвѣтъ. Жаръ и боль при силь-

номъ беспокойствѣ возвышаются иногда до неспосной степени, а въ самой опухоли оказывается непріятное чувство біенія. Въ это время часто появляется новый огневичный припадокъ, если горячка, сопровождавшая воспаленіе, уничтожилась; въ противномъ случаѣ обнаруживается мгновенное ожесточеніе оной, новый припадокъ озноба, смыняющагося жаромъ и потомъ, означающій начало нагноенія и первое наступленіе гнойной горячки (*febris suppurativa*). Наконецъ жилобіеніе, бывшее доселѣ твердымъ, дѣлается мягкое; горячка оказываетъ явственнѣйшія послабленія; припадки мѣстнаго страданія пѣкоторымъ образомъ уменьшаются: опухоль болѣе и болѣе сосредоточивается, поверхность ея возвышается, по сторонамъ рождается не рѣдко отекъ; кожа, покрывающая нарывъ, воспринимаетъ темнокрасный цвѣтъ, переходящій часто въ смуглый, темносиній или желтоватый; верхняя кожица отстаетъ; твердость, краснота и воспаленіе уменьшаются и, при ощущеніи болѣніемъ холода въ опухоли, испытывающая рука, если нарывъ доступенъ осязанію, примѣщаетъ зыбленіе жидкости (*fluctuatio*), которое оказывается сперва только въ пѣкоторыхъ мѣстахъ, или въ глубинѣ, а потомъ, болѣе и болѣе умножаясь, занимаетъ всю поверхность, въ слѣдствіе чего нарывъ безпрестанно напрягаясь, завостряется и въ срединѣ своей, или на возвышенійшемъ мѣстѣ, воспринимаетъ бѣловатый, или желтоватый цвѣтъ. Въ семъ состояніи нарывъ называется *зрѣлымъ* (*abs. maturus*) и вскорѣ вскрывается самъ собою однимъ большимъ, или многими маленькими отверстіями.

По испражненіи гноя начинается другой періодъ на-

рыва т. е. свободное отдѣленіе гноя къ наружіи или въ другую полость. Въ сie время всѣ мучительные припадки проходятъ, жаръ и краснота исчезаютъ, опухоль уменьшается, края оной опадаютъ, стѣнки дѣлаются слабкими и збористыми. Наконецъ полость мало по малу выполняется нарощеніемъ мясныхъ сосочековъ (*granulationes*), которое, оказываясь во внутренней перепонкѣ нарыва, продолжается обыкновенно до заживленія.

Такъ всегда образуется и проходитъ нарывъ въ благопріятныхъ случаяхъ. Если же отъ какой либо причины стѣнки нарява разрушаются, перераждаются, дѣлаются мозолистыми, скиррозными либо истребляются антоновымъ огнемъ, то нарывъ превращается въ гноящуюся поверхность, либо въ свищевую язву и требуетъ тогда дѣятельныхъ мѣръ искусственного вспомоществованія. Тоже самое почти происходитъ, если нарывъ поддерживается бездѣйственнымъ состояніемъ жизнедѣятельности, общимъ какимъ либо страданіемъ или особеною наклонностію къ изъязвленію.

Участіе, воспринимаемое всемъ организмомъ при означеныхъ измѣненіяхъ нарява, бываетъ очень различно. Въ чисто мѣстномъ нарывѣ сопровождающая его, даже очень значительная горячка исчезаетъ либо тотчасъ по испражненіи гноя, либо по прошествіи иѣкотораго времени. Напротивъ того въ конституціональныхъ и переносныхъ нарявахъ вскрытие опухоли большею частію бываетъ признакомъ усиливашія болѣзни, или наступленія явленій предвещавшихъ дурной исходъ.—Если скопляется гной въ большомъ количествѣ близъ очень раздражительныхъ

частей тѣла, то онъ поддерживаетъ общее конституциональное раздраженіе и производить особенную горячку (*febris irritativa*). Тоже самое происходитъ, когда гной, задерживаемый долгое время въ тѣлѣ, всасывается посредствомъ венъ (*Magendie, Camerer*) и переносится въ массу крови. Наконецъ долговременное и обильное отдѣленіе гноя въ нарывѣ причиняетъ чрезъ потерю соковъ общее истощеніе, въ какомъ случаѣ оказываются обыкновенно явленія противудѣйствія или органической самозащищаемости (*febris hecistica*). Это случается тѣмъ скорѣе, чѣмъ важнѣе для жизни органъ, въ которомъ рождается нарывъ.

§ 46.

Распознаваніе. При различныхъ содержаніяхъ нарява и самыя явленія онаго различно измѣняются, особенно въ нарявахъ, образующихся во внутреннихъ важныхъ органахъ, въ глубоколежащихъ частяхъ, либо подъ сухожильными растяженіями, также при бездѣйственныхъ, холодныхъ нарявахъ и проч.

1. Во внутреннихъ, неподлежащихъ зреію и ощущенію органахъ можно предполагать образованіе нарява, если начальные явленія воспаленія, хотя и уменшились, но все еще продолжаются долгое время въ иѣкоторомъ измѣненномъ видѣ и при томъ безъ предшествовавшихъ рѣшительныхъ испражненій, если жгучая боль дѣлается бьющеюся, при чёмъ иногда оказывается чувство озноба и, если отправленіе страждущаго органа совершенно не возстановляется. При таковыхъ об-

стоятельствахъ вѣрный признакъ внутренняго нагноенія составляетъ почти всегда гнойной осадокъ въ мочѣ, который отличается отъ другихъ гноеподобныхъ осадковъ своею нерастворяемостію въ водѣ, коею разводится моча. Сверхъ сего, поелику заключенныя въ полостяхъ тѣла жидкости находятся, по причинѣ беспрестанно смыняющагося давленія и противудавленія стѣнъ, въ постоянномъ волнобразномъ движениі, то и присутствіе гноя въ таковыхъ полостяхъ можетъ быть открыто посредствомъ *стетоскопа*, который нерѣдко и чрезъ толстыя стѣны дѣлаетъ ощутительнымъ волнобразное движение жидкостей.

2. При образованіи нарывовъ подъ сухожильными расстяженіями (*fasciae*) вышеозначенной (§ 45.) формы опухоли не бываетъ, завостреніе и зыбленіе въ оной совершенно необнаруживаются и въ такомъ случаѣ присутствіе содержимаго внутри гноя узнается изъ рожевиднаго воспаленія вѣнчика покрововъ, которое въ новѣйшія времена сдѣлалось извѣстнымъ подъ названіемъ ложной рожи (*pseudo-erysipelas*).

3. Иногда наривы оказываются безъ предшествовавшаго мѣстнаго воспалительного раздраженія, раждаются отъ одного токмо скопленія (*abscessus congestivi*). Наривы сіи образуются часто между глубоколежащими мышичными слоями, даже между сими и костію и составляютъ болѣею частію произведеніе скрытныхъ болѣзней, происходящихъ отъ внутреннихъ конституціональныхъ причинъ, отъ какого нибудь ходосочія, либо въ слѣдствіе отложения переносныхъ болѣзнетворныхъ матерій. Въ сихъ случаяхъ очень важно узнать забола-

товоременно присутствіе мѣстопребыванія нагноенія. Постоянная, тупая, продолжительная боль въ глубинѣ, наипаче по расположению мышицъ, горячка, сопровождаемая возвышенію раздражительностію, имѣющая большую наклонность превращаться въ изнурительную, отечная, или рожевая опухоль, могутъ руководить къ распознаванію.

4. Бездѣйственные нарыва (abscessus torpidi), какъ напр. золотушные, случающіеся преимущественно близъ желѣзистыхъ органовъ, начинаются твердою, сперва долгое время неболящею опухолью, наконецъ при тупой боли и чувствѣ жара оказывается въ оной слабое воспаленіе и блѣдно-красный цвѣтъ, послѣ чего слѣдуетъ уступчивость и мягкость опухоли, по вскрытии коей и по испражненіи гноя воспаленіе тотчасъ исчезаетъ и оказывается спаденіе покрововъ.

5. При нарывахъ лимфатическихъ опухоль образуется безъ красноты и боли, при одномъ чувствѣ давленія и растяженія, постепенно выравнивается, не переходя на окружающія части и обнаруживаетъ воспаленіе покрововъ часто уже послѣ несколькиихъ мѣсяцовъ.

§ 47.

Продолженіе наривовъ бываетъ неодинаково и зависитъ вообще отъ различныхъ условій, наипаче отъ состоянія жизнедѣятельности въ страждающей части и отдѣлительной ея способности. Наривы въ частахъ, покрытыхъ слизистыми перепонками созреваютъ гораздо скорѣе, нежели наружными покровами и вскрывают-

ся также очень скоро. Равнымъ образомъ скоротечные, флегмонозные нарывы оканчиваются въ очень короткое время т. е. въ 8 или 12 дней; напротивъ того обрѣтающіеся въ глубоко лежащихъ частяхъ, или въ недѣятельныхъ органахъ требуютъ гораздо большаго времени; холодные же и лимфатические нарывы оканчиваются нерѣдко по прошествіи многихъ мѣсяцевъ. Развивающіеся подъ сухожильными и плотными волокнистыми составами весьма медленно вскрываются.

§ 48.

Причины. Всѣ вредности, подающія поводъ, къ про-
исходженію воспаленія (§ 12.) могутъ быть причинными
моментами и самыхъ нарывовъ. Опытность научаетъ,
что натура образованіемъ нарывовъ весьма часто про-
тивудѣйствуетъ виѣшнимъ раздраженіямъ, силясь отдѣ-
лить и испразнить оныя. Такимъ образомъ мы видимъ
ежедневно, что попавшія въ тѣло пули, иглы также от-
ломки костей, остатки принадлежностей зародыша, по-
мертвѣлые части какого либо органа, неразрѣшенныя
лигатурныя нити выводятся наривами къ поверхности
и испражняются. Всѣ сіи вредности, равно и случаи,
при коихъ онѣ проникли и пребывали въ организмѣ,
принадлежать къ мѣстнымъ причинамъ нарывовъ. Об-
щія или внутреннія причины суть всѣ худосочія к. т.
венерическая болѣзнь, золотуха, составоломъ, ревма-
тизмъ, приставшая зараза, гнилая матерія, скрывшіяся
внутрь сыпи, поглощенный ядъ и проч.

Сверхъ сего наривъ есть частій сопутникъ острыхъ

болѣзней, въ коихъ онъ обнаруживается критически, въ видѣ переноса, либо какъ припадокъ, смотря потому, сильится ли натура перенести общій болѣзненный процессъ на одинъ органъ, какъ при критическомъ нарывѣ заушныхъ желѣзъ въ тифѣ, или восстановить образованіемъ необыкновенного отдѣленія равновѣсіе между отправленіями, какъ при молочномъ переносѣ и молочномъ нарывѣ.

§ 49.

Предсказаніе. Поелику нарывъ составляетъ болѣзненную форму, которая обнаруживается въ столь различныхъ видахъ и содеряніяхъ, то для правильного сужденія о вліяніи онаго на здоровье особы, надлежитъ обращать вниманіе на слѣдующіе моменты:

1. *Состояніе жизнедѣятельности нарыва.* Умѣренная степень воспаленія при нарывѣ допускаетъ доброкачественное образованіе гноя и вмѣстѣ съ тѣмъ возможность къ скорому заживленію, если впрочемъ другія обстоятельства не подаютъ повода къ иному приговору объ этомъ. Очень высокая степень воспаленія есть также неблагопріятное явленіе, ибо въ такомъ случаѣ находится всегда значительное общее страданіе и предстоитъ опасность антонова огня. При хроническомъ воспаленіи и преимущественной наклонности къ изъязвлению недостаетъ жизнедѣятельности къ надлежащему продуктивному образованію, отъ чего излѣченіе длиется всегда долгое время и организмъ, теряя отъ продолжительного пагноенія много соковъ, можетъ впасть въ изпуритель-

ную лихорадку. При бездѣйственномъ состояніи нарыва легко остается затвердѣніе: теченіе его бываетъ очень продолжительное, края, отвердѣвая, загибаются, дѣлаются мозолистыми и образуются свищевые ходы съ отдѣленіемъ жидкаго, болѣе или менѣе дурнаго гноя. Тамъ, где образованію нарыва не предшествовало никакое воспаленіе, предсказаніе очень не благопріятное, ибо въ такомъ случаѣ, по недостатку образовательной силы, не предвидится никакихъ условій къ заживленію.

2. *Мѣстопребываніе нарыва.* Поверхностный нарвъ, находящійся въ отдаленіи отъ члено-составныхъ соединеній, костей, дыхательного горла и другихъ важныхъ органовъ счастливо оканчивается, если только благопріятствуютъ ему другія обстоятельства. Нарвы же, образующіеся подъ сухожильными растяженіями, вблизи костей и проч., въ рѣдкихъ случаяхъ благополучно проходятъ; а рождающіеся во внутреннихъ органахъ и полостяхъ тѣла всегда очень сумнительны и опасны для жизни.

3. *Обыкновенность нарыва.* Небольшіе нарвы излѣчиваются обыкновенно скорѣе и не производятъ столь значительного общаго страданія, какъ обширные, кои наносятъ иногда крайнее ослабленіе силъ и самую смерть отъ медленной горячки (*febris lenta*).

4. *Причины.* Мѣстные, идиопатическіе нарвы допускаютъ гораздо лучшее предсказаніе, нежели происходящіе отъ общаго конституціонального страданія. Если образованіе нарыва зависитъ отъ огневичнаго состоянія, чрезъ что общее страданіе улучшается, или исчезаетъ, то предсказаніе благопріятно, потому что

общая болезнь преобразуется въ местную; напротивъ того мало подаютъ надежды на благополучный исходъ тѣ нарывы, кои зависятъ отъ общей хронической болѣзни, или отъ худосочія, коего скорое удаленіе находится въ границѣ возможности.

§ 50.

Леченіе. Хотя нарывъ представляетъ местную болѣзнь, но такъ какъ въ оной рѣдко не воспринимаетъ сострадательного участія весь организмъ и общая жизнедѣятельность оказываетъ величайшее влияніе на существующій при семъ местный болѣзненный процессъ, то и лѣченіе нарыва во всякомъ разѣ не можетъ ограничиваться однимъ местнымъ вспомоществованіемъ, но требуетъ притомъ врачебнаго содѣйствія на общія силы организма. По сemu лѣченіе нарываемъ бываетъ общее и местное.

§ 51.

А. Общее леченіе, дѣйствуя на организмъ сообразно существующему измѣненію жизнедѣятельности, состоить въ назначеніи либо умѣряющихъ, противувоспалительныхъ средствъ, когда общее страданіе оказывается чрезмѣрнымъ воспалительнымъ возбужденіемъ, либо раздражающихъ и укрѣпляющихъ, если существуетъ притомъ бездѣйственное, ослабленное состояніе, либо измѣняющихъ и специфическихъ, если требуетъ того какое либо худосочное страданіе.

§ 52.

В. Мъстное лѣченіе, имѣя цѣлію уничтожить усѣпшино и безъ всякихъ послѣдствій мѣстный болѣзnenій процессъ, требуетъ выполненія слѣдующихъ показаній:

1. Дѣйствовать на ходъ воспалительного процесса, отъ коего зависитъ нагноеніе такъ, чтобы нарывъ могъ окончиться, сколько возможно благополучнѣе, было бы то чрезъ разрѣшеніе, или чрезъ нагноеніе.
2. Если исходъ нарыва долженъ совершаться чрезъ нагноеніе, то гноящуюся опухоль надлежитъ привести къ скорѣйшему созрѣнію.
3. Образавшуюся въ нарывѣ гнойную жидкость испразнить и, при дальнѣйшемъ отдѣленіи оной, доставлять ей свободное вытеченіе къ наружѣ.
4. По испражненіи оной жидкости гноящуюся поверхность нарыва приличными средствами приводить къ заживленію.

§ 53.

Относительно первого показанія мы можемъ начавшееся уже нагноеніе остановить и, усиливая всасываніе гноя, совершенно разрѣшить, либо способствовать нагноенію и тѣмъ привести нарывъ къ созрѣнію.

Разрѣшеніе нарывовъ хотя предпринимается рѣдко, однакожъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно необходимо, именно тамъ, где страждущій органъ нужно предохра-

нить отъ разрушающаго дѣйствія воспалительного на-
гноенія, гдѣ образованіе нарыва недавно началось, а
чрезвычайно медленное его созрѣваніе можетъ угрожать
произрожденіемъ въ послѣдствіи злокачественныхъ язвъ,
свищей и проч. Сверхъ сего при лѣченіи конгестивныхъ,
лимфатическихъ и другихъ нарываемъ почти всегда до-
ставляетъ вящшую пользу споспѣществованіе всасыва-
нію нарыва.

I. Если нарвъ долженъ быть разрѣшаемъ, то
надлежитъ обращать вниманіе на состояніе его
жизнедѣятельности и по оному опредѣлять способъ
лѣченія.

а). При *созышенной жизнедѣятельности*, при всѣхъ
признакахъ усиленного воспалительного возбужденія въ
общемъ и мѣстномъ страданіи, напиache при темной
краснотѣ нарыва, жестокой, то колющей и жгущей,
то бьющейся боли, сильномъ напряженіи, большомъ
жарѣ и проч. можно ожидать успѣха въ предполагае-
момъ разрѣшеніи только отъ надлежащаго употребленія
противувоспалительныхъ, умѣряющихъ и успокоиваю-
щихъ средствъ. Сюда принадлежать общія и мѣстныя
кровопусканія, слабительный изъ среднихъ солей, наи-
пиache изъ услащенной ртути отъ 6 до 10 гр. на пріемъ,
повторенный втираніемъ сѣрої ртутной мази въ окружно-
сти страждущей части отъ половины до цѣлой драхмы,
примочки изъ холодной воды, если употребленіе ихъ по
другимъ условіямъ не можетъ быть вреднымъ; въ про-
тивномъ случаѣ тепловатыя примочки изъ настоя ромаш-
ки или бузины, уксусо-кислаго свинца и настояки опія
(N 105), возможное спокойствіе всего тѣла, а особенно

страждущей части, прохладная температура воздуха и скучная растительная диета. Всё раздражающія средства, наипаче пластыри и мази, равно какъ смягчающія припарки и примочки не соответствуютъ таковой цѣли и скорѣе могутъ произвести нагноеніе и даже антоновъ огонь, нежели разрѣшеніе.

b). Напротивъ того, когда воспалительная опухоль, начинаящая гноиться, представляетъ болѣе хроническое течение и *состояніе жизнедѣятельности въ онѣ* слишкомъ слабое т. е. вместо живаго, краснаго, она имѣеть болѣе блѣдный, или сине-красноватый цвѣтъ и при ощущеніи оказывается болѣе мягкою, тѣстовитою, нежели напряженной, мало или вовсе не болитъ и проч. то надлежитъ возвышать дѣятельность сосудовъ, дабы усилить всасываніе и чрезъ то самое разрѣшить опухоль. Въ семъ случаѣ приличны такъ называемыя разрѣшающія средства, изъ коихъ дѣйствительнейшія суть теплія примочки изъ настоя ароматныхъ травъ съ нашатыремъ, также изъ уксуса, воды и поваренной соли, втираниемъ летучихъ мазей на самой опухоли, какъ *linimentum ammoniato-camphoratum cum tra ori*, оподель-докъ, смѣсь *ung. nervini* cum *ungu. hydrarg. cinereo*, *ungv. kali hydrojodici*, *ungv. e digitali et caet.* Сверхъ сего весьма хорошую услугу доставляетъ здѣсь употребленіе легко разрѣшающихъ пластырей, какъ *emplastrum de galbano crocatum*, *empl. gummi ammoniaci*, *empl. hydrargiri*, особенно съ камфорою и опіемъ. Впрочемъ самое лучшее, могущественное разрѣшающее дѣйствіе оказывается въ такомъ случаѣ продолжительное, сначала умѣренное, но постепенно усиливающее *давленіе* на воспа-

лительную опухоль. Оно можетъ быть производимо либо приличными повязками и упругими пелотами, либо посредствомъ свинцовой или каменной пластинки, либо методическимъ наложеніемъ на опухоль (крестообразно, или звѣздообразно) ленточекъ липкаго пластиря.

Всѣ однакожъ сильно раздражающія и красноту наводящія; равно какъ всѣ смягчающія средства противны пред назначеній цѣли и, вместо разрѣшенія, могутъ произвести *изглазленіе*, или *дурнокачественное перерожденіе* нарыва. Самое даже общее раздражающее лѣченіе не должно отступать отъ средины и основываться преимущественно на сложеніи больнаго. Хотя сильныя испражненія низа, повторенные рвотныя и голодъ чрезвычайно способствуютъ предполагаемому здѣсь процессу всасыванія, однакожъ они могутъ быть назначаемы съ успѣхомъ токмо для вѣлыхъ, впрочемъ крѣпкихъ и полносочныхъ субъектовъ, но отнюдь не для слабихъ и тощихъ, коимъ съ болѣшею пользою можно предписывать возбуждающую и пряную пищу при умѣренномъ тѣлесномъ движеніи и употреблениіи общихъ тепловатыхъ ваний. Сии послѣднія, по отличному разрѣшающему дѣйствію ихъ, заслуживаютъ преимущественнаго употребленія и могутъ быть усиливаемы прибавленіемъ поваренной соли, поташа, ароматныхъ травъ и т. п. если нужно произвести накожное раздраженіе и увеличить дѣйствіе отдѣлительныхъ органовъ.

§ 54.

II. Когда же нарывъ доброкачественъ, находится въ

безопасномъ мѣстѣ, неугрожаетъ никакому органу, скоро созрѣваетъ, обнаруживается въ видѣ перелома или переноса и зависитъ отъ матеріальной причины, отъ попавшихъ въ организмъ постороннихъ тѣлъ, остатковъ принадлежностей зародыша и т. п. то разрѣшеніе въ такихъ случаяхъ во все неумѣсто, но необходимо нужно способствовать нагноенію нарыва, при чемъ также должно преимущественно руководствоваться состояніемъ жизнедѣятельности нарыва. Сообразное настроеніе жизнедѣятельности составляетъ здѣсь единственный способъ, коимъ можно достигнуть предполагаемаго намѣренія, ибо средствъ, собственно гной производящихъ и положительно способствующихъ нагноенію мы не имѣемъ.

Такимъ образомъ только а) *при возышенной степени жизнедѣятельности*, гдѣ явственно оказываются всѣ припадки общаго и мѣстнаго воспалительнаго возбужденія, можетъ быть употребляемъ противувоспалительный способъ. Впрочемъ никогда не должно забывать, что для образования нагноенія необходима довольно значительная степень воспаленія. По сому общія кровопусканія и спорыя испражненія низа вообще не должны быть употребляемы въ томъ періодѣ болѣзни, въ которомъ нельзя уже предотвратить переходъ воспаленія въ нагноеніе, либо, гдѣ онъ нуженъ по особымъ терапевтическимъ показаніямъ; но гораздо лучше въ такомъ случаѣ предписывать только среднія соли въ малыхъ пріемахъ, наипаче селитру и очищенный винный камень (N 11.); а при усиленномъ первномъ эретизмѣ белену, лавровиццовую воду, уксусокислый мор-

тії (N 77.) и проч. назначая притомъ легкую растительную пищу и обильное употребленіе кисловатыхъ прохладжающихъ (N 19.) и слизистыхъ напитковъ.

Тоже самое должно наблюдать въ семъ разѣ и при мѣстномъ лѣчениі нарыва, умѣряя только слишкомъ возвышенное воспалительное раздраженіе и напряженіе, но отюдь не уничтожая самаго воспаленія, безъ котораго никакъ не можетъ произойти хорошее нагноеніе. Посему обильныя мѣстныя кровопусканія показуются только тамъ, гдѣ воспаленіе чрезмѣрио вызвашено, сосуды судорожно сжаты, напряженіе и боль нестерпимы и предстоитъ опасность перехода въ антоповъ огонь. Въ другихъ случаяхъ достаточно употребленіе влажной теплоты, не только для умѣренія болѣзnenныхъ припадковъ, но и для поддержанія процесса нагноенія. Примочки изъ теплой воды, либо изъ отвара какихъ либо слизистыхъ средствъ к. т. просвирника, мальвы, льняныхъ сѣяній и проч. также припарки изъ льняной муки, овсяныхъ крупъ, бѣлаго хлѣба, разваренного въ водѣ или молокѣ, наилучше соответствуютъ всякому показанію, предстоящему здѣсь. Примочки и припарки, приготовляемыя изъ разныхъ аптечныхъ смягчающихъ травъ (*species emollientes*), несмотря на ихъ дороговизну, не имѣютъ никакого преимущества предъ означенными простыми веществами. Равнымъ образомъ прибавленіе къ нимъ разныхъ наркотическихъ и другихъ травъ к. т. белены, болиголова, шафрана, или ромашки, мелилотной травы и т. п. должно почитать въ семъ случаѣ совершенно излишнимъ и бесполезнымъ. Главное дѣло состоять здѣсь въ

томъ, чтобы припарки и примочки таковыя надлежашимъ образомъ и безпрестанно употребляемы были, чтобы онѣ покрывали не только страждущую часть, но и всю окружность ея и всегда содержимы были въ ровной температурѣ. Сверхъ сего припарки лучше прикладывать непрямо на опухоль, по чрезъ ветошку, или кисею. Всѣ другія средства к. т. смягчающія мази и пластыри совершенно излишни и никогда не могутъ замѣнить дѣйствія теплыхъ смягчающихъ припарокъ, разрѣшающихъ застой соковъ и судорожныя затворенія сосудовъ, умалляющихъ болѣзнищая напряженія и тѣмъ способствующихъ отдѣленію гноя. Собственно же раздражающія лѣкарства дѣйствуютъ здѣсь весьма вредно и ни въ какомъ случаѣ не должны быть употребляемы.

б) Напротивъ того со всѣмъ иначе надлежитъ поступать тамъ, едѣ гноящійся нарывъ не представляетъ надлежащей степени воспаленія, потребной для приготовленія гноя, мало, или во все не болитъ и вообще обнаруживаетъ свойство болѣе бездѣйственное, нежели воспалительное, Здѣсь-то имѣютъ мѣсто раздражающія и даже красноту наводящія средства, изъ коихъ преимущественнѣйшая суть: печенный лукъ, медовая лепешка, діахильный и другіе смоляные пластыри, припарки, приготовляемыя изъ гнилыхъ яблокъ, сваренныхъ съ пивомъ, также нагнаивающая припарка *Керндолл* (№ 106).

Кромѣ сихъ средствъ можно употреблять повременамъ и смягчающія припарки столь теплые, какъ только можетъ перенести больной, наипаче если нарывъ очень твердый. Обыкновенно днемъ лучше прикладывать теп-

лъя припарки, а на ночь покрывать опухоль пластыремъ, продолжая до толѣ, пока твердость смягчится и произойдетъ такая степень воспаленія, при которой можетъ послѣдовать надлежащее нагноеніе. Общее лѣченіе должно также соотвѣтствовать здѣсь мѣстному, ибо только при возвышенномъ возбужденіи общихъ силъ можетъ быть производимо постоянное поддержаніе мѣстнаго воспалительного состоянія. Посему питательная, крѣпильная діета, при умѣренномъ употребленіи вина, въ большей части случаевъ бываетъ очень прилична, если однакожъ не вспрещаютъ того какія либо особенные болѣзни и худосочные состоянія, измѣняющія столь часто нормальный ходъ жизнедѣльности, на что врачъ, преимущественно въ сихъ случаяхъ, долженъ обращать вниманіе.

§ 55.

III. Приведши вышеозначеннымъ образомъ *нарывъ* *созрѣю* *надлежитъ*, по третьему показанію, *испражнить образовавшійся въ ономъ гной или гнойную жидкость*. Испражненіе таковое производится либо силами натуры, либо рукодѣятельнымъ вспомоществованіемъ искусства. Какъ тотъ, такъ и другой путь въ разныхъ случаяхъ имѣютъ не одинаковый успѣхъ, а потому:

а). *Произвольному вскрытию*, совершающемуся силами самой природы, могутъ быть предоставлены не большие, близко подъ кожею обрѣтающіеся нарывы, всѣ нагноенія желѣзъ или нарывы въ желѣзистыхъ ор-

гапахъ, были бы они худосочного свойства, или пѣть; равнымъ образомъ всѣ нарывы, обнаруживающіе недостатокъ жизнедѣятельной энергіи к. т. мало болящіе, несильно воспаленные и такіе, въ коихъ нагноеніе, а съ онимъ и смягченіе окружной твердости медленно проходитъ.

Напротивъ того б) *искусственное вскрытие* имѣетъ мѣсто преимущественно 1. *при совершенно созрѣвшихъ нарывахъ*, т. е. тамъ, гдѣ опухоль въ окружности смягчилась, зыбленіе вездѣ ощущается равномѣрное, но нарывъ самъ собою не вскрывается; 2. *при нарывахъ вблизи важныхъ органовъ, полостей и проч.*, въ какомъ случаѣ гной, остающійся долгое время въ заключеніи, производить давленіе на таковые органы, либо отлагается во внутреннія полости. Сіе случается наиболѣе съ наривами на шеѣ, въ подмышкахъ, между брюшными мышцами, вблизи прямой кишкы, мочеваго пузыря, слезнаго мѣшечка, дыхательного горла, члено-составныхъ соединеній и т. д. Въ такихъ случаяхъ, если дѣйствительно предстоитъ опасность, надлежить тотчасъ по обнаруживаніи нагноенія предпринять искусственное вскрытие, недожидалась даже совершенного созрѣнія нарыва. 3. *При нарывахъ, находящихся подъ сухожильными растяженіями, сухими жилами, связками и т. д.*, кои по чрезвычайной упругости и твердости своей, воспращаютъ вскрытие къ наружки и производятъ чрезъ то обширное разстройство около лежащихъ частей, наипаче клютчатой плевы. 4. *При большихъ наривахъ, образующихся въ очень чувствительныхъ частяхъ*, гдѣ скопленіе гноя, причи-

иля неносимы боли, действуетъ вредно на общее здоровье. 5. *При критическихъ, переносныхъ и не постоянныхъ нарывахъ*, въ коихъ всегда потребно скорое испражненіе гноя.

Впрочемъ опытами доказано, что парывы, коихъ вскрытие предоставляетъся натурѣ, гораздо скорѣе заживають, нежели вскрываемые искусствомъ. Сie зависитъ отъ того, что до послѣдованія произвольного вскрытия, воспаленіе накожныхъ покрововъ достигаетъ обыкновенно высокой степени, напряженіе бываетъ сильное, опухоль, здѣлавшись совершенно зыблющеюся, завостряется въ какомъ либо возвышенномъ или наклонномъ мѣстѣ, наконецъ прорывается и, по истеченіи гноя, опадаетъ, дѣлаясь постепенно плосче, при чёмъ накожные сосуды, будучи уже сильно воспалены, легко соединяются съ дномъ самаго нарыва, не образуя полой язвы и заживленіе какъ нарыва, такъ и вскрывшагося на кожѣ мѣста, слѣдуетъ всегда въ скорѣйшемъ времени. Напротивъ того при искусственномъ вскрытии нарыва хирургъ недожидается усиленной степени воспаленія покрововъ, завостренія опухоли и совершеннаго смягченія всей твердости, но вскрываетъ нарывъ тотчасъ при появленіи въ какомъ либо мѣстѣ выбленія. Отъ такового слишкомъ ранняго испражненія гноя и мгновеннаго уничтоженія всего напряженія прекращается почти совершенно воспаленіе и нагноеніе, недостигшее еще возвышенной степени, безъ чего не можетъ произойти и смягченіе существующей твердости, а лишенные жизнедѣятельности общіе покровы не могутъ соединяться съ дномъ нарыва и такимъ образомъ рождается полая язва, которая весьма медлен-

но, часто по прошествии несколькиx мѣсяцевъ, приходитъ къ заживленію.

Обыкновеннѣйшіе способы вскрытия нарываовъ суть: *разрѣзъ посредствомъ ланцета или онкотома, прикладываніе подкаго средства и употребленіе заволоки.* Разрѣзъ, заслуживающій въ большей части случаевъ преимущество предъ другими способами вскрытия, не долженъ ограничиваться однимъ проколомъ, какъ обыкновенно дѣлается, но состоять въ довольно большомъ раздѣленіи покрововъ, что необходимо нужно для того, чтобы доставить свободное и безпрепятственное вытеченіе гнойной матеріи, произвѣсть и поддержать воспаленіе, потребное для соединенія и сращенія краевъ раны и наскожныхъ покрововъ и тѣмъ предупредить образованіе полой язвы. Опасеніе дѣлать большой разрѣзъ, для избѣжанія вхожденія воздуха въ полость нарыва и разложенія чрезъ то самаго гноя, неосновательно, ибо весьма многія обширныя раны, подвергаясь вліянію атмосфернаго воздуха гораздо болѣе, нежели вскрываемые нарывы, непретерпѣваютъ ни сколько отъ разложенія гноя, да и вхожденія воздуха въ гнойную полость нельзя избѣжать и при самомъ малѣйшемъ отверстіи, которое еще болѣе можетъ служить причиной вреднаго дѣйствія воздуха, ибо въ такомъ случаѣ онъ, проникнувшій въ гнойную полость, не можетъ имѣть свободнаго выхожденія изъ оной.

§ 56.

IV. По вскрытии нарыва дальнѣйшее леченіе

его располагается также по существующему состоянию жизнедѣятельности, отъ коего преимущественно зависитъ какъ количество, такъ и качество отдѣляемаго гноя.

Такимъ образомъ, только при умѣренной степени жизнедѣятельности можетъ быть отдѣленіе хорошаго гноя въ потребномъ количествѣ и зависящее отъ того органическое вознагражденіе потерянаго существа образованіемъ новыхъ мясныхъ сосочковъ (*granulationes*), кои, произраѣдаясь въ отдѣлительной поверхности, постепенно выполняютъ полость нарыва и тѣмъ производятъ совершиенное заживленіе.

Если все это совершаются надлежащимъ образомъ, если гной имѣеть достаточную густоту и натуральный цветъ и отдѣляется умѣренно, если мясные сосочки, возвышающіеся со дна, довольно красны, умѣренно плотны и чувствительны, то пѣтъ никакого сомнѣнія, что въ отдѣляющей гноемъ поверхности обрѣтается нормальная степень жизнедѣятельности. Здѣсь врачъ долженъ уклонять только то, что можетъ нарушать натуральный процессъ т. е. воспрещать употребленіе очень соленої, копченой, или слишкомъ пряной пищи и спиртныхъ напитковъ, совѣтовать избѣгать пребыванія въ дурномъ воздухѣ, слишкомъ частаго очищенія гноящейся поверхности и перевязки, равно какъ прикладыванія т. и. живительныхъ мазей. Перевязка въ семъ случаѣ должна быть производима сколько возможно проще и притомъ не чаще, какъ одинъ разъ въ сутки; при чемъ обмываніе раны лучше всего дѣлать посредствомъ губки, напитываемой теплою водою, отнюдь не касаясь ею по-

верхности раны. Очистивъ такимъ образомъ рану отъ излишняго гноя, можно покрывать ее тонкою лыняною холстинкою или корпейкою связкою (*plumaceau*), укрѣпляя ее простымъ бинтомъ, либо двумя ленточками липкаго пластиря. Кто желаетъ непремѣнно производить перевязку съ мазью, тотъ можетъ холстинку та-ковую или плюмасо намазывать нѣсколько розовою помадою (*ung. rosatum*), либо свежеприготовленною мазью изъ воска, растительного масла и личнаго желтка. Такъ должно поступать дотолѣ, пока отдѣлительная поверхность приближится къ заживленію. Въ сie время въ томъ мѣстѣ, которое не покрыто еще кожею, образует-ся плотное, бѣловатое, блестящее покрываюло, называемое рубцемъ (*cicatrix*). Произрожденіе его есть также дѣло натуры и потому врачъ долженъ только уменьшать величину его, сблизяя покровы ленточками липкаго пластиря, давая страждущей части способствующее тому положеніе и ускоряя иногда выполненіе рубца употребленіемъ легко стягивающихъ средствъ, либо придо-трогиваніемъ селитрокислого серебра.

§ 57.

Таковое однажды благопріятное состояніе не всегда встрѣчается по вскрытии пары, а потому и самое лѣ-ченіе не во всякому случаѣ можетъ быть столь про-стое. Здѣсь нерѣдко оказывается либо *слишкомъ скудное*, либо *очень обильное*, либо не имѣющее *потреб-наго качества отдаленіе гноя*, что зависитъ отъ не-

правильнаго состоянія общей или местной жизнедѣятельности, либо отъ порочной формы самой отдѣлительной поверхности.

1. Если гной отдѣляется *очень скучно* и потому выполнение гноящейся поверхности новымъ мяснымъ нарастаніемъ происходитъ очень медленно, либо вовсе необнаруживается, то таковое слишкомъ слабое произрожденіе гноя и органической массы можетъ зависѣть отъ двухъ противуположныхъ неправильностей т. е. отъ *чрезмѣрно возвышенного*, либо отъ *слишкомъ упавшаго состоянія жизнедѣятельности*.

a) Въ первомъ случаѣ отдѣлительная поверхность бываетъ темно-или смуглокрасная, часто очень гладкая, болящая и при ощущеніи довольно твердая, либо во всей окружности нарыва существуетъ еще воспалительная твердость. Здѣсь приличенъ только всеобщій антифлогистический (впрочемъ ограниченный) способъ лѣченія и местное употребленіе влажной теплоты посредствомъ смягчающихъ припарокъ и примочекъ, при продолжительномъ употребленіи коихъ отдѣлительная поверхность въ скоромъ времени воспринимаетъ нормальное состояние и умноженнаго отдѣленія гноя тѣмъ вѣрнѣ можно надѣяться, если при томъ удалено будетъ всякое раздраженіе раны и всякая излишняя перевязка, а страждающая часть будетъ имѣть иѣсколько возвышенное положеніе.

b) Когда же слишкомъ скучное отдѣленіе гноя происходитъ отъ противуположнаго состоянія т. е. отъ *слабости или бездѣйствія*, то наривъ представляется блѣднымъ и вялымъ, а самъ болицой отъ предшество-

вавшихъ изпуряющихъ вліяній болѣе или менѣе ослабленнымъ, безсильнымъ, блѣднымъ въ лицѣ и знобкимъ. Здѣсь-то показуется общее крѣпительно-возбуждающее лѣченіе и питательная раздраживающая пища и здѣсь-то можно и должно умножать нагноеніе употребленіемъ раздраживающихъ мазей, изъ коихъ преимущественныя суть *ung. terebinthinæ, balsamum Frahmii, bals. Arcæi, ung. basilicum, elemi etc.* сами по себѣ либо съ добавлениемъ на одинъ унцъ всякой таковой мази трехъ драхмъ настойки смирны. Сверхъ сихъ весьма хорошо действуетъ мазь изъ красной осадочной ртути (*ung. præcipit. rubri*), составляемая, смотря по надобности, крѣпче или слабѣе изъ 1 или 2 др. красной ртути и 1 унца жиру. При семъ полезно также, для большаго прилива соковъ, держать страждущую часть въ нѣсколько наклоненномъ положеніи и умножать дѣятельность въ оной треніемъ, горчичниками, ароматными припарками и проч.

§ 58.

2) Если же напротивъ того гной отдаляется *слишкомъ обильно*, то причиною сего можетъ быть либо чрезмѣрно *возышенная репродуктивная дѣятельность*, либо совершенно *упавшая жизнедѣятельность*:—*общее и мнѣстное ослабленіе силъ*.

а) Въ первомъ случаѣ гной, отдаляющійся въ излишествѣ, бываетъ доброкачественный и отдаѣтельная поверхность въ скоромъ времени выполняется новымъ мяснымъ нарастаніемъ, но выполненіе таковое, въ слѣд-

ствіе возвышенной репродуктивности, превышаетъ нормальныя границы, поднимается надъ краями кожи и потому заживленіе раны или гнойной поверхности не можетъ совершаться. Часто все сіе происходитъ отъ слишкомъ теплой, сложной перевязки, отъ лѣченія нормальной отдѣлительной поверхности раздражающими мазями и отъ чрезмѣрно питательной, пряной пищи, — въ какомъ случаѣ можетъ быть вѣрно уклоняю избѣжаніемъ таковыхъ причинъ. Иногда же надобно стараться ограничивать таковое ростопроизводство и усиленное отдѣленіе гноя назначеніемъ малопитательной, растительной пищи, повторенными испражненіями низа, наипаче слабительными изъ услашенной ртути, сухою, плотно налагаемою перевязкою, возвышеннымъ положеніемъ страждущей части для уменія прилива соковъ, либо употребленіемъ свинцовой воды и холода, который сильно противудѣйствуетъ возвышенной репродуктивной силѣ, но не вездѣ въ таковыхъ случаяхъ можетъ быть употребляемъ безъ всякой опасности и вреда.

b) *Во второмъ случаѣ*, гдѣ отдѣляется гной въ излишествѣ и при томъ дурного качества, гдѣ ростопроизводство, по причинѣ общаго и местнаго ослабленія силъ, находится въ совершенномъ упадкѣ, или оказывается неправильнымъ образомъ, гдѣ произраждается т. н. дикое мясо, блѣдные, вялые, легко кровь истощающіе мясные сосочки и вся отдѣлительная поверхность представляетъ ослабленный, дурноцвѣтный видъ, лѣченіе должно основываться на возбужденіи силъ, также на ограничованіи и поправленіи отдѣленія.

При умѣренно возбуждающей пищѣ, болѣе сухой, пе-

жели жидкой надлежитъ поддерживать мѣстное лѣченіе отдѣлительной поверхности употребленіемъ хины (N 22. 50.), исландскаго моха, ароматнаго ира и другихъ горькихъ и притомъ праныхъ средствъ (N 96.)

Относительно мѣстнаго лѣченія надобно стараться ограничить слишкомъ обильное отдѣленіе жидкаго гноя, измѣнить его качество въ химическомъ отношеніи и потомъ содѣйствовать возбуждающимъ образомъ на разслабленныя волокны, измѣняя настроеніе ихъ жизнедѣятельности. Симъ показаніямъ соотвѣтствуетъ сперва болѣе сухое, нежели влажное лѣченіе гнойной поверхности, присыпаніе оной порошкомъ изъ ароматныхъ, легкостягивающихъ и такихъ веществъ, кои дѣйствуютъ химически на поправленіе отдѣленій. Сюда принадлежать уголь и ромашковые цветы, превращенные въ мѣлкій порошокъ, сами по себѣ, либо съ прибавленіемъ мирры и камфоры, а при сильномъ перерожденіи присыпаніе отдѣлительной поверхности красною осадочною ртутью. Средства сіи можно также употреблять въ формѣ мази (N 107). Если отдѣленіе довольно уже уменьшено, а гноящаяся полость все еще имѣеть вялый болѣзненный видъ, то весьма хорошо дѣйствуетъ примочка изъ раствора сулемы въ известковой водѣ (aqua phagadenica), растворъ хлоровой извести, селитрокислаго серебра и проч.