

*C. Отвердніе.*  
*(Induratio.)*

*Syn.* *Consolidatio, hepatisatio, callositas, porosis, tylosis;*  
окрѣпость, бугорковатость.

§ 59.

*Отвердніе*, какъ исходъ воспаленія, есть то состояніе, при которомъ въ слѣдствіе выпотѣнія, чрезъ отложеніе густой массы и чрезъ дальнѣйшее преобразованіе оной псевдопластическою дѣятельностію, рождается въ страждущей части чрезмѣрное умноженіе плотности ея, препятствующее свободному отправленію.

Отвердніе въ воспаленіи совершается надобно сращенію поверхностей посредствомъ сложнаго перепончатаго образованія. Выпотѣваемое вещество наполняетъ клѣточки клѣтчатой плевы и промежутки между нервами, сосудами, желѣзистыми шариками, волокнами и пластинками, лежащими слоебразно одна на другой. По мѣрѣ переходенія своего въ створоженное либо въ полуствороженное состояніе, вещество сіе сцѣпляетъ между собою таковыя разнородныя части, производя какъ бы внутреннее сплоченіе, такъ что собственное качество ихъ устройства исчезаетъ, а соразмѣрио тому и отправление ограничивается, или совершенно уничтожается. Въ высшей степени отверднія невозможно отличить и анатомически отдѣлить ни нервовъ, ни сосудовъ, ни клѣтчатой плевы, ни другаго элементарнаго состава. Это неудается даже и послѣ долгаго вымачиванія (*maceratio*). Всѣ части сливаются въ такомъ слу-

чай въ совершенно единообразную, неразличаемую масу. Нервы теряютъ свою чувствительность, сосуды затворяются во внутреннихъ своихъ полостяхъ и не проводятъ соковъ, волокны дѣлаются не способными къ сокращенію и сжатію, а жѣлѣзные шарики прекращаютъ свое отдѣленіе. Вообще питаніе, смѣна животной матеріи и отдѣленіе останавливаются. Самая тонкія разливныя впрыскиванія проникаютъ только въ большия сосуды отвердѣвшаго органа, но въ малыя вѣтви недостигаютъ.

Въ отношеніи жизнедѣятельности отвердѣніе обнаруживаетъ предикаты, совсѣмъ противоположные воспаленію и нагноенію, к. т. ослабленное кругообращеніе, уменьшенное произрожденіе теплоты, медленное питаніе и пр. Не смотря на это отвердѣніе часто находится съ ними въ одномъ органѣ, только въ различныхъ частяхъ, оказываясь на пр. въ периферической твердости воспаленія, въ отолощеніи клѣтчатаго существа и перепонокъ, въ стѣнкахъ нарыва, также въ мозолистости, окружающей иногда язвы и пр. Вообще отвердѣніе есть такое патологическое состояніе, которое, измѣняясь по свойству органа, бываетъ основаниемъ безчисленныхъ, минимо различныхъ болѣзненныхъ случаевъ к. на пр. пятна роговой оболочки, бѣльма, бугры въ паренхимѣ внутренностей, окрѣплости мышицъ и связокъ, кропость клѣтчатаго существа (*Hepatisatio*) и проч. Не смотря одинакожъ на такое бездѣйственное состояніе, отвердѣнія имѣютъ также наклонность къ воспалительнымъ возбужденіямъ и даже къ центральному нагноенію. Воспаленіе въ нихъ, по видимому, въ сущности своей несо-

вершенно уничтожается, а дѣлается только скрытымъ, всегда готовымъ къ явственному обнаруживанию.

§ 60.

Воспаление переходитъ въ отвердѣніе обыкновенно въ то время, когда воспалительное выпотѣніе оказывается въ умѣренномъ количествѣ, не всасывается обратно и не превращается въ гной, а воспринимаетъ плотный видъ и въ ономъ претерпѣваетъ означенныя дальнѣйшія псевдопластическихія измѣненія. Если воспалительный процессъ мгновенно останавливается, не достигая перелома и дальнѣйшаго образованія, то рождается обыкновенно отвердѣніе. Само по себѣ воспаленіе не имѣть особеннаго стремленія къ отвердѣнію, но образование его зависитъ болѣе отъ постороннихъ вліяній.

§ 61.

*Явленія отвердѣнія*, остающагося послѣ воспаленія суть: продолжающаяся, хотя нѣсколько уменьшенная опухоль безъ центральнаго смягченія, но напротивъ съ увеличеною твердостію, медленно прекращающаяся боль, уменьшенная температура и постоянное нарушение отправлений. Во внутреннихъ органахъ диагностический признакъ составляетъ токмо послѣднее т. е. нарушение отправлений, остающееся по окончаніи воспаленія и соединенное иногда съ примѣтною извиѣ твердостію и умноженіемъ облятности органа.

Дѣйствія отвердѣній на жизнь и здоровье страждущей

особы разнствуютъ по разности отвердѣлой части, по важности, или неважности оной и по мѣстопребыванію близъ органовъ высшаго, или низшаго достоинства. Вообще отвердѣнія препятствуютъ болѣе или менѣе отправленію органа, въ коемъ они находятся, уменьшаютъ, прекращаютъ, либо значительно измѣняютъ отдѣленіе его, съуживаютъ стѣники въ каналахъ и чрезъ то дѣлаютъ препятствіе прохожденію соковъ, причиняютъ давленіе на близлежащія части и слѣдственно ограничиваютъ отправленіе смежныхъ органовъ. Отвердѣвшая часть ощущается твердѣйшею и болѣею обыкновен-наго, однакожъ не всегда бугристою, но часто ровною. Въ высшей степени образуетъ она примѣтную выпуклость, бываетъ болѣе или менѣе подвижною и сама по себѣ не оказываетъ боли, но можетъ возбуждать оную давленіемъ и раздраженіемъ смежныхъ частей. Если отвердѣніе поражаетъ прозрачныя и лоснящіяся части, то онѣ дѣлаются непрозрачными и теряютъ лоскъ.

§ 62.

**Наклонность къ отвердѣнію** обрѣтается въ хро-ническомъ, бездѣйственномъ воспаленіи, въ органахъ, менѣе изобилующихъ кровью и медленно сме-няющихся животное вещество, въ лимфатическихъ и отдѣлительныхъ желѣзахъ, въ слизистыхъ перепонкахъ и желѣзистыхъ внутренностяхъ, при бездѣйственномъ сложеніи тѣла, флег-матическомъ, черножелчномъ темпераментѣ, у худосоч-ныхъ особъ, напаче золотушныхъ и страждущихъ со-ставоломомъ. Оно произраждается также послѣ слишкомъ

обильныхъ и часто повторяемыхъ кровопусканій, при употреблениі воды, содержащей въ себѣ землянистая известковая части и дурной трудно варимой пищи, при всегдашнемъ пребываніи во влажныхъ, углубленныхъ жилищахъ и пр.

*Слугайными причинами* могутъ быть всѣ тѣ вліянія, кои измѣняютъ предшествовавшій отвердѣнію воспалительный процессъ, или прекращаютъ дальнѣйшее его развитіе и образованіе. Сюда принадлежитъ наипаче злоупотребленіе льдано-холодныхъ примочекъ, стягивающихъ, свинцовыхъ, вообще внутрь вгоняющихъ (r. *percutientia*) средствъ и проч.

### § 63.

*Предсказаніе.* Отвердѣнія, остающіяся послѣ воспаленій, не всегда бываютъ доброкачественны, но составляютъ нерѣдко упорныя болѣзnenныя состоянія и дѣлаютъ тщетнымъ настоятельное употребленіе самыхъ дѣйствительныхъ средствъ. Воспящая отправленію поражаемыхъ ими частей и смежныхъ органовъ, они часто причиняютъ вредныя для здоровья, даже угрожающія опасностію послѣдствія, наипаче если удаленіе ихъ операциею невозможно. Сверхъ сего отвердѣнія у худосочныхъ особъ имѣютъ большое расположеніе къ преобразованію въ скирръ и ракъ и въ такомъ случаѣ маловажная витиальная причина можетъ подать поводъ къ тому.

§ 64.

*Лъженіе* имѣеть цѣлію совершенное устраненіе отвердѣнія. Таковое показаніе выполняется двоякимъ образомъ т. е. либо *возвышеніемъ всасывающей дѣятельности проводящихъ сосудовъ* посредствомъ такъ называемаго разрѣшающаго способа, либо *совершеннымъ удаленіемъ отвердѣвшей части изъ границъ организма*.

*Первымъ способомъ* медленнѣе достигается цѣль излѣченія, а потому его можно назначать тамъ, где не предстоитъ опасность и отвердѣніе доброкачественное, или находится во внутреннихъ органахъ. Средства, принадлежащи къ оному, дѣйствуютъ *динамически либо механически*. Къ первымъ относятся такъ называемыя *разрѣшающія средства*, изъ коихъ умѣренныя суть: свѣжевыжатые соки и сгущенные экстракты всѣхъ горьковатыхъ растѣній, содержащихъ въ себѣ мыльные, соляные, либо сахаристыя начала, напиache radic. graminis (N 34, 38, 39), cichorii intybi, leonth. taraxaci, saponariae; herb. sumariae officinalis, marrubii albi, chelidoniis majoris, calendulae officinalis, chaerophylli sylvestris, veronicae beccabungae, sedi telephii etc. Среднюю степень въ классѣ разрѣшающихъ средствъ занимаютъ виннокаменно-кислый и уксусокислый соли (N 32.), пашатырь, щелочи, мыльные и сѣрные составы, щелочно-соляные минеральныя воды, особливо Карлсбадскія, Маріенбадскія, Эмскія и проч. также бычачья желчь, смолы: gum. resina ammoniaci, galbani, assae foetidae; guajacum, stipit.

sol. dulcamarae, acetas ammoniae liquidus, acetum squiliticum etc. Сильно и весьма проницательно дѣйствуютъ: senega, squilla (N 27.), conium maculatum, belladona, digitalis purpurea, acidum hydrocyanicum, murias barytae, jodinum, praeparata mercurialia et antimonialia. Сверхъ сего даваемыя по временамъ рвотныя и слабительныя оказываютъ весьма хорошее разрѣшающее дѣйствие.

§ 65.

Къ наружнымъ разрѣшающимъ средствамъ принадлежать преимущественно теплые простыя ванны и полуванны, щелочные и сѣрные, искусственные, или натуральные ванны, прищусканіе разрѣшающихъ паровъ, либо воды въ струистомъ стремлениі (douche), содержаніе въ умѣренной теплотѣ отвердѣлаго органа, осторожное употребленіе электричества, гальванизма въ заключенномъ кругѣ столба, прикладываніе раздражающихъ пластырей (N 135): к. с. emplastrum de gummi ammoniaco cum acetо squillae,empl. hydrargiri, oxycrosetum et de galbano crocatum,empl. conii,empl. saponatum, особливо съ прибавленіемъ опія, камфоры, соли оленѣяго рога, каменнаго масла и проч. втирание разрѣшающихъ мазей (N 122): unguenti hydrargiri cinerei съ мыломъ и камфорою, ungv. hydrojodatis potassae, ungv. e digitali, припариваніе ароматическими и наркотическими травами, каковы на пр. species resolventes Phar. Bor., напичке съ прибавленіемъ камфорнаго спирта, нашатыря и уксуса, наконецъ фонтанели и заволоки, дѣлаемыя близъ отвердѣвшей части. На внутреннія отвердѣ-

нія можно иногда съ успѣхомъ дѣйствовать и промыва-  
тельными (N 42.).

*Механическое разрѣшающее дѣйствіе* оказываетъ  
наиپаче треніе и давленіе, производимое непосредст-  
венно на страждущую часть. Въ отвердѣніяхъ, рождаю-  
щихся въ окружности какихъ либо каналовъ, давленіе  
дѣлается посредствомъ бужей, приготовляемыхъ изъ раз-  
личныхъ матеріаловъ, наиપаче изъ римскихъ струнъ, а  
иногда посредствомъ турундъ. Въ другихъ случаяхъ оно  
производится посредствомъ металлической пластиинки и  
циркулярно прикладываемаго пластыря, какъ *emplastrum*  
*consolidans Ph. Bor.*

Большѣю частію однакожъ совершиное разрѣшеніе  
отвердѣнія удается только въ то время, когда стражду-  
щій органъ приведенъ будетъ въ состояніе умѣреннаго  
флогистического раздраженія, или въ тотъ періодъ вос-  
паленія, въ которомъ оно прежде остановилось. Впрочемъ  
таковое, вновь производимое воспалительное  
раздраженіе не должно быть слишкомъ сильное, а  
потому съ разрѣшающими средствами нужно по-  
ступать осторожно, сообразуясь съ раздражающею си-  
лою ихъ. Если произойдетъ чрезмѣрное возбужденіе,  
то назначать пѣвки, дабы отклонить другіе неблаго-  
приятные исходы.

### § 66.

*Совершенное удаление отвердѣвшей части изъ*  
*границъ организма* производится либо прижиганіемъ,  
либо вырѣзываніемъ.

*Прижиганіе* употребляется рѣдко: оно дѣйствуетъ

за однимъ разомъ неуглубленно, но для истребленія отвердѣвшей опухоли должно быть повторяемо иѣсколько разъ, а потому при обширныхъ отвердѣніяхъ не оказывается желаемаго успѣха. Только въ поверхностныхъ, небольшихъ отвердѣніяхъ, маловажныхъ перерожденіяхъ кожи и мозолистыхъ свищевыхъ ходахъ — оно за-служиваетъ иѣкоторое вниманіе.

*Вырѣзываніе* напротивъ того иногда необходимо въ самыхъ доброкачественныхъ отвердѣлыхъ опухоляхъ, если онѣ, отъ тяжести и давленія на смежные органы, причиняютъ беспокойные припадки. Въ случаяхъ, угрожающихъ опасностю, нужно смотрѣть на доступное положеніе отвердѣвшей части и опасность, сопряженную съ вырѣзываніемъ.

---

D.) *Антоновъ огонь*  
(*Mortificatio*).

§ 67.

*Антоновъ огонь* есть собственнаго рода уничтожение жизненности въ какой либо части тѣла, находящейся въ связи съ живымъ организмомъ.

Отрѣзанный членъ не подвергается антонову огню, но гниости, какъ бываетъ и съ мертвымъ тѣломъ. Трупное гнѣеніе и антоновъ огонь, хотя суть сходныя состоянія, но отнюдь не представляютъ однотожества (*identitas*). Химическіе продукты обоихъ различны: ан-

тоновооглений гасъ не развивается при истлеваніи тѣла и запахъ приantonовомъ огнѣ отличается отъ запаха трупного гненія. Въ частяхъ, помертвѣвшихъ отъ antonova огня, никогда не оказывается животныхъ низшаго разряда, рождающихся по себѣ (*per generationem aequi vocam*), какъ сіе случается при гненіи тѣла. Совершенная гнилость оказывается въ помертвѣшей части только въ то время, когда она отдѣлится отъ живаго тѣла, или будетъ имѣть съ нимъ только нѣкоторую внѣшнюю связь. Поелику непремѣнныя условія antonova огня суть: омертвѣніе части, продолженіе жизни въ цѣломъ организмѣ и существующая связь между ими, то изъ сего слѣдуетъ, что между помертвѣвшими уже и живыми частями должно находиться также нѣкоторое дѣйствіе и противодѣйствіе.

Тамъ, где уничтожается жизненность какого либо органа, имѣющаго еще связь съ живымъ организмомъ, находится также возвышенная до чрезмѣрности жизнедѣятельность, вообще припадки усиленнаго воспаленія. Жизненное пламя пылаетъ въ такомъ случаѣ со всею силою предъ своимъ потуханіемъ. Однакожъ, по мѣрѣ какъ наступаетъ дѣйствительное помертвѣніе какойлибо части, прекращаются въ оной и всѣ воспалительные припадки, продолжая свирѣпствовать только въ пограничныхъ частяхъ. Помертвѣвшій же составъ дѣлается обыкновенно безчувственнымъ, недвижущимся, холоднымъ, чернымъ, или пепельно-серымъ.

Воспаленіе, приводя жизнедѣятельность въ чрезмѣрное напряженіе, легко можетъ ослаблять и уничтожать ее и такимъ образомъ произраждать antonovъ огонь, по

наступлениі коего останавливается уже кругообращеніе соковъ, животворное вліяніе первыхъ агентовъ, а съ ними и всякое ростопроизводство.

Посему *антоновъ огонь* есть *следствіе, или исходъ воспаленія*. Въ рѣдкихъ только случаяхъ онъ рождается, по видимому, безъ предшествовавшаго ему воспаленія, отъ причины мгновенно уничтожающей жизненность въ какой либо части тѣла. Впрочемъ трудно согласиться, чтобы и въ семъ случаѣ помертвѣнію, или антонову огню не предшествовало воспаленіе, по крайней мѣрѣ такое, которое мгновенно проходитъ и потому трудно примѣчается. Помертвѣлому состоянію всегда почти предшествуетъ боль, проче же воспалительные припадки к. т. краснота и опухоль не могутъ быть примѣчаемы, если оно происходитъ въ глубоколежащихъ частяхъ. Вообще антоновъ огонь, безъ воспаленія содержится точно такъ, какъ нагноеніе безъ воспаленія (въ холодныхъ нарывахъ, въ лимфатическихъ опухоляхъ § 44).

### § 68.

*Течениe* антонова огня раздѣляется на три периода, хотя они переходятъ иногда одинъ въ другой столь непримѣтно, что трудно опредѣлить начало и конецъ каждого изъ нихъ.

a) *Периодъ предвестниковъ* (*gangrænosis, gangrænescens-tia, inflammatio gangrænosa*). Существенные признаки воспаленія возвышаются до чрезмѣрности, достигшая значительной величины опухоль, дѣлается весьма на-

приженною, сухою и твердою, краснота бываетъ темная или смуглая, вообще весьма усиленная, боль чрезвычайная, нестерпимая, болѣе и болѣе усиливающаяся до наступленія втораго періода, жаръ находится въ прямомъ содѣржаніи съ прочими припадками. Существующая огневица обнаруживаетъ при семъ въ болѣшой или меньшей степени припадки воспалительной горячки. Періодъ сей продолжается не долго. Столь значительное возбужденіе въ скоромъ времени должно перейти въ ослабленіе.

б) *Періодъ начинаящагося антонова огня (gangræna).* Опухоль въ семъ состояніи нѣсколько увеличивается, дѣляясь впрочемъ не столь напряженною и твердою, но болѣе мягкою и какъ бы отекшою; на поверхности ея усматриваются пузыри, наполненные прозрачною, или темносиневатою жидкостію; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ верхняя кожица отъ прикосновенія отстаетъ и прилипаетъ къ пальцамъ, краснота становится темнѣе и отливаетъ грязно-смуглымъ цвѣтомъ. Боль перемѣняется въ тупую и давящую, теплота умаляется, горячка, представлявшая въ предшедшемъ періодѣ болѣе воспалительный характеръ, переходитъ въ астеническое или тифозное состояніе. Такъ какъ въ семъ періодѣ страждающая часть удѣрживаетъ еще теплоту и чувство, то можетъ быть, хотя очень рѣдко, другой исходъ, а неизвѣстительное помертьяніе.

с) *Періодъ совершиенно образовавшагося антонова огня (sphacelus),* представляетъ мѣстную смерть и отличается слѣдующими явленіями: давящая, тупая боль совершенно прекращается, болѣй не чувствуетъ даже

прикосновенія, пораженное мѣсто бываетъ синеватое, пепельно-сѣрое, или черное. Мягкія части дѣлаются рыхлыми, гнилыми, тѣстообразными и могутъ быть отщипываемы безъ болей. Если разрушеніе антопово-огненное распространяется на кости, то онѣ представляются бѣлыми, желтыми, или черными. При влажномъ помертвѣніи (*sphacelus humidus*) кровь, коею наполнены были помертвѣлые части, переходитъ въ гніеніе, дѣляется жидкоко и вытекаетъ изъ мертвыхъ сосудовъ, изливаясь кнаружи, или подъ кожу. Въ опухоли развивается воздухъ и при дотрогиваніи примѣчается хрустѣніе (*emphysema gangraenosum*). При разрѣзѣ, отъ выхожденія воздуха, опухоль спадается, при чмъ освобождается также особенный гнилой запахъ и истекаетъ смрадная, черная, острая матерія. Въ окружности помертвѣлыхъ частей существуетъ антопово-огненное воспаленіе, которое постепенно переходитъ во второй и третій періодъ и такимъ образомъ помертвѣніе распространяется далѣе и далѣе (*sphacelus progrediens*). Общее страданіе обнаруживается особенною гнилою горячкою (*febris sphacelosa, typhus gangraenosus*).

При таковомъ безпрестанномъ распространеніи антопова огня и умноженіи общаго страданія либо слѣдуетъ смерть, либо натура съ помощью искусства производить слѣдующія перемѣны. Помертвѣніе, распространившись на извѣстную обятность, останавливается, не переходя на смежныя части (*sphacelus fixus*). При семъ рождается красная *пограничная линія* (*ligne de demarcation; limitatio*), которая отдѣляетъ помертвѣлые части отъ здоровыхъ и представляетъ различную

форму, по разности разрушения, причиняемаго антоно-  
вымъ огнемъ. Въ семъ самомъ мѣстѣ, въ послѣдствіи вре-  
мени, развивается нагноеніе и образуется борозда, про-  
ничающая болѣе или менѣе въ глубь, смотря по углу-  
блению самого погрѣвѣнія. Лишенныя жизненности ча-  
сти отдѣляются и остается изъязвленное мѣсто, которое  
мало по малу воспривимаетъ доброкачественное нагное-  
ніе (*stadium granulationis et cicatrisationis*). Въ это же вре-  
мя измѣняется и общее страданіе, разрѣшаюшася совер-  
шеннѣемъ, или несовершеннѣемъ переломомъ.

### § 69.

*Распознаваніе* антоновоогненнаго состоянія во внѣши-  
хъ, подлежащихъ зрецю частяхъ, легко можетъ быть  
произведено по изложеннымъ здѣсь признакамъ; но *при*  
*внутреннемъ* развитіи такового состоянія, оно можетъ  
быть заимствовано только изъ общихъ, конституціональ-  
ныхъ припадковъ. Въ сихъ случаяхъ, въ какомъ бы  
внутреннемъ органѣ ни произоходился антоновъ огонь,  
главные а) *Припадки* (*предѣстники*), въ *первомъ пе-  
riодѣ* его (*gangraenescentia*) суть: возвысившееся до чрез-  
мѣрности стеническое напряженіе огневичныхъ движений  
мѣстнаго воспалительного страданія, выражющееся крѣп-  
кимъ, полнымъ жилобіеніемъ, чрезвычайнымъ беспокой-  
ствомъ, особенною мучительною тоскою, нестерпимою  
болью въ страждущемъ органѣ и вообще столь силь-  
нымъ возмущеніемъ въ тѣлѣ, что опытный наблюдатель  
легко можетъ предвидѣть изъ онаго разрушительный ис-  
ходъ. б) *Во второмъ periodѣ* (*gangraena*) жилобіеніе

начинаетъ гораздо болѣе ускоряться, первѣдко даже до чрезмѣрности и вдругъ теряетъ свою полноту и твердость, дѣлаясь мягкимъ, а иногда и перемежающимся; горячка измѣняетъ свой характеръ, дѣлаясь астеническою, тифозною; больной получаетъ томный взглядъ, впадаетъ въ большое ослабленіе, тоскливоѣ безпокойство и бредъ; наступаютъ холодные ноты, гастрические припадки съ отрыжкою, икотою, сильною жаждою и колющими жаромъ въ кожѣ. Въ дальнѣйшемъ теченіи лицо больнаго спадается и становится желтоватымъ.

с) Въ третьемъ періодѣ (*sphacelus*) тифозное свойство горячки усиливается, жилобіеніе бываетъ чрезвычайно малое, нитеобразное, дрожащее, перемежающееся; все тѣло, паипаче брюхо значительно вздувается; отъ параличнаго пораженія грудныхъ и брюшныхъ внутренностей рождается очень трудное дыханіе съ хрипѣніемъ и непроизвольное выхожденіе кала и мочи, издающихихъ трупинный запахъ; лицо и конечности охладѣваются; иногда всѣ соки приходятъ въ гнилостное состояніе, появляются поты и кровотеченія, какъ въ высшей степени гнилой горячки; наконецъ больной впадаетъ въ большую сонливость, поражается корчами, получаетъ гипократическое измѣненіе въ чертахъ лица и умираетъ.

### § 70.

*Причины.* Преимущественное расположение къ антопову огню поселять а) высшаго степень общей, или мѣстной слабости, произродившейся послѣ трудныхъ болѣзней, непомѣрнаго напряженія тѣлесныхъ и душев-

ныхъ силъ, отъ потери крови и другихъ соковъ;—ослабленіе тѣла, остающееся послѣ обильныхъ кровопусканий, глубокая старость, пребываніе въ дурномъ, испорченномъ воздухѣ, скудное питаніе, атоническое, худосочное состояніе тѣла, наипаче цыиготное, венерическое, составоломкое, золотушное и т. д. d) *огень ильное устройство организации*, какъ напр. въ клѣтчатой плевѣ и брюшныхъ перепончатыхъ органахъ; c) *скудное настроение жизнедѣятельности* к. напр. въ костяхъ, сухихъ жилахъ и крайнихъ оконечностяхъ.

Къ *случайнымъ причинамъ* принадлежать 1. *Механическія*: давленіе, воспашеніе кровообращенія, ушибы, растяженія, разрывы, порѣзы и проч. 2. *Динамическія*: a) *воспаленія* либо чрезмѣрно сильныя, флегмоноznыя, либо атоническія, случающіяся въ первыхъ и гнилыхъ горячкахъ; b) *яды*, растительные (secale cornutum, синеродистая кислота и проч.) животные (укушеніе змѣй и пр.) и болѣзнетворные напр. міазмы и прилипчивости; c) *физическая и хемическая средности* к. т. холодъ, огонь, чрезмѣрно острыя животныя жидкости и Ѣдкія минеральныя вещества, особенно крѣпкія кислоты и щелочи, металлическія соли, наипаче сульма и мышьякъ.

§ 71.

*Разности* антонова огня могутъ быть *существенные и случайные*. *Существенные* разности основываются на причинахъ его и въ семъ отношеніи раздѣляется онъ на a) *Антоновъ огонь отъ мѣстныхъ причинъ* (mortificatio topica) к. т. отъ чрезмѣрно воз-

высыпшагося воспаленія, озобленія, ожогъ, вообще отъ химическихъ, либо механическихъ вліяній. б) *Антоновъ огонь отъ общихъ внутреннихъ причинъ* (*mortificatio constitutionalis*), куда принадлежатъ критической, переносный антоновъ огонь, также случающійся при злой корчѣ (*raphania*) и отъ старческой дряхлости. с) *Антоновъ огонь отъ вліянія какой либо заразы:* госпитальный антоповъ огонь, злокачественный волдырь (*pustula maligna*) и заразительный вередъ (*carbunculus contagious*).

*Случайные разности* антонова огня зависятъ отъ вида состоянія пораженной имъ части. Въ семъ отношеніи раздѣляютъ антоновъ огонь *на воспаленный* (*gangraena*) и *холодный* (*sphacelus*). Первымъ называется то состояніе, или то поприще воспаленія, где начинается уже исчезаніе жизненныхъ силъ, но находится еще некоторая жизненность въ части и где возможно еще возстановленіе ею, а вторымъ видомъ означается такое состояніе антонова огня, где главные факторы жизненности: раздражительность и чувствительность уничтожились, а вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось и ростопроизводство,—словомъ, где изчезли всѣ признаки жизни и прежняго воспаленія и воспослѣдовала мѣстная смерть или помертвѣніе. Смотря по тому, остается ли въ такомъ случаѣ пораженная помертвѣніемъ часть въ сухомъ видѣ, или переходитъ въ гнилостное разложеніе, холодный антоновъ огонь раздѣляется *на сухой* (*sphacelus siccus, mummificatio*) и *на влажный* (*sphacelus humidus, putrefactio*). Сухой антоновъ огонь ограничивается иногда поверхностнымъ распространениемъ, оказываясь

чаще всего на общихъ покровахъ толстымъ струпомъ, называемымъ *струпнымъ помертвѣніемъ* (*sphacelus escharoticus*). Важѣйшую разноть сухаго антонова огня составляетъ также костное помертвѣніе (*necrosis*), отличающееся самою большою сухостію и холдностію.

§ 72.

**Предсказание.** Всякій антоновъ огонь вообще сопряженъ съ опасностію. Происходящій отъ мѣстныхъ причинъ, хотя и допускаетъ лучшее предсказаніе, но иногда также дѣйствуетъ столь вредно на организмъ, что смерть бываетъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ.

Во всякомъ случаѣ здѣсь должно принимать въ соображеніе: а) *періодъ болѣзни*. Въ первомъ періодѣ, гдѣ еще необразовался антоновъ огонь, а находится токмо высшая степень воспаленія, болѣе можно надѣяться на излѣченіе, нежели во второмъ періодѣ, гдѣ почти всегда омертвѣваетъ, если не весь пораженный членъ, то по крайней мѣрѣ часть онаго. б) *Важность органа* т. е. необходимъ ли онъ для жизни, или нѣтъ и не состоить ли въ сочувствіи съ другими важными органами. При пораженіи мозга смерть можетъ послѣдовать даже въ первомъ періодѣ. с) *Распространеніе антонова огня*. Въ семъ отношеніи весьма важно знать, ограничился ли онъ, или продолжаетъ распространяться, обрѣтается ли болѣе на поверхности, или проникаетъ въ глубину и поражена ли имъ большая часть члена. При обширномъ распространеніи его можетъ быть опасно и самое нагноеніе, обнаруживающееся по отпаденіи помертвѣлаго вещества. д) *Внѣшнее*

*свойство*; — помертвѣніе влажное гораздо хуже, нежели сухое, с) *Общее состраданіе*. Если въ мѣстной болѣзни воспринимаетъ большое участіе весь организмъ, то опасность велика, напаще при гнилой горячкѣ. г) *Сложеніе, возрастъ больнаго и сопряженія*. Дряхлость тѣла, старость и существующія притомъ худосочія дѣлаютъ предсказаше очень неблагопріятнымъ.

*Внѣшнія содержанія* напр. дурной госпитальный воздухъ, сильный лѣтній жаръ и проч. содѣлываютъ болѣзнь гораздо опаснѣе.

*Смерть* въ такомъ случаѣ можетъ приключаться 1) отъ уничтоженнаго отправленія въ помертвѣломъ организмѣ, если онъ необходимо нуженъ для жизни; 2) отъ антикоагулянной горячкѣ, ослабляющей до чрезмѣрности силы больнаго; 3) отъ изнурительной лихорадки, которая обнаруживается иногда въ слѣдствіе обильныхъ кровотечений и нагноенія, дѣлающагося по отдѣленіи мертвыхъ частей; 4) отъ нервнаго удара, раждающагося въ то время, когда смерть оказывается мгновенно, что происходитъ вѣроятно отъ пораженія нервовъ.

§ 73.

*Лѣченіе*. Слово аントоповъ огонь, съ которымъ обыкновенно предполагается уничтоженіе жизнедѣятельности, никогда не должно служить при лѣченіи безусловнымъ показаніемъ къ употребленію однихъ возбуждающихъ и раздражающихъ средствъ. Здѣсь, что касается до жизнедѣятельности, то въ разныхъ періодахъ болѣзни явственно можно видѣть различное, даже совершенно противу-

положное состояніе оной,—и потому лѣченіе отнюдь не можетъ ограничиваться какимъ либо классомъ средствъ и общими показаніями, но требуетъ бдительнаго вниманія ко всѣмъ измѣненіямъ жизнедѣятельности и точнѣйшаго примѣненія лѣкарствъ къ состоянію оной. Вообще лѣченіе антонова огня лучше всего располагать по периодамъ, въ которыхъ явственно обнаруживается возвышение и постепенный упадокъ жизненныхъ силъ.

§ 74.

**I. Въ періодъ предвѣстниковъ** (*inflammatio gangrenosa*), гдѣ существуетъ обыкновенно усилившееся до высочайшей степени воспаленіе, сопровождаемое дѣятельною стеническою горячкою (*synoqua gravior*), лѣченіе должно быть какъ *общее*, такъ и *мѣстное*, только *антифлогистическое*. Кровопусканія изъ руки въ такомъ случаѣ необходимо нужны, но надлежитъ въ точности опредѣлять количество испражнляемой крови по сложенію больнаго, состоянію жилобенія и по другимъ отношеніямъ. Лучше повторять кровопусканіе, если оно нужно, нежели разомъ выпускать слишкомъ много крови, напаече у посредственно крѣпкихъ субъектовъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь всегда должно имѣть въ виду угрожающую перемѣну свойства горячки, предстоящее антоновоогненное разрушеніе и необходимо нужное въ послѣдствіи поддержаніе силъ для пограничнаго воспаленія и нагноенія. Впрочемъ робкость здѣсь также неумѣстна и отнюдь не должна отводить отъ выполненія того, что совершило нужно для умѣренія чрезвычайно

возбужденаго состоянія. Кромѣ сего внутрь даются въ семь случаѣ въ большихъ пріемахъ противувоспалительныя средства, особенно селитра (N 11.) и дѣйствія ихъ поддерживаются прохладительною діэтою. Слабительныя изъ среднихъ солей (N 20), дѣйствующія также антифлогистически чрезъ испражненіе соковъ, наиболѣе показуются тамъ, гдѣ существуютъ желудочныя нечистоты.

§ 75.

Что касается до мѣстнаго лѣченія, то первая потребность онаго состоить въ томъ, чтобы удалить всѣ вредности, причинившія и умножающія воспаленіе,—следственно всякаго рода ущемленія и давленія на страждущую часть устранить, постороннія тѣла, если возможно, извлечь, а чрезмѣро растянутыя и напряженныя части ослабить посредствомъ разрѣза и пр. При сильной воспалительной опухоли очень полезны мѣстныя кровоотвлеченія, производимыя, смотря по обстоятельствамъ, посредствомъ пыжокъ, кровососныхъ банокъ, либо насѣчекъ и послѣ оныхъ холодныя примочки, сами по себѣ, или съ примѣсью свинцового сахара (N 105), уксуса и проч. Впрочемъ коль скоро, по употребленіи холодныхъ примочекъ, воспалительная опухоль непоказываетъ ни малѣйшаго знака къ разрѣшенію т. е. краснота, твердость и боли умножаются, обнаруживается біеніе и чувство тяжести и боли вообще неполучаетъ никакого облегченія, то надлежитъ тотчасъ прекратить употребленіе холодныхъ примочекъ и вмѣсто оныхъ назначать теплыя смягчающія припарки (N 48), доволь-

ствуясь въ такомъ случаѣ тѣмъ, что воспослѣдуетъ нарывъ, по не антоновъ огонь.

### § 76.

*II. Второй періодъ, гдѣ обыкновенно начинается уже образованіе антонова огня, наступаетъ очень скоро, особенно если въ первомъ періодѣ непредшествовало ему надлежащее антифлогистическое лѣченіе. Онъ имѣть также свои постепенности, при коихъ явственно можно отличить два состоянія: а) сперва атоническое съ страдательнымъ растяженіемъ сосудовъ и невозможностью освободиться отъ пренаполненія оныхъ, а послѣ б) собственно антоновоогненное состояніе, обнаруживающееся величайшимъ упадкомъ ростопроизводства, образованіемъ антоновоогненныхъ пузырей и изъязвленіемъ (helcosis gangrenosa).*

*А.) При атоническомъ состояніи, если напряженная опухоль показываетъ большое пренаполненіе сосудовъ кровью, приличны мѣстныя испражненія посредствомъ насѣчекъ, или пьявокъ, собственно для того только, чтобы освободить волосные сосуды отъ страдательного скопленія въ оныхъ и чтобы, по испражненіи, удобнѣе можно было оживляющими средствами произвести въ оныхъ надлежащую степень жизнедѣятельности и силы сокращенія. Послѣ таковыхъ испражненій, мѣстное атоническое состояніе требуетъ оживляющихъ средствъ, изъ коихъ самое лучшее есть теплота. Посему здѣсь преимущественно приличны теплые примочки, или припарки изъ ароматныхъ травъ к. т. изъ цвѣ-*

тотъ ромашки, мяты травы, набора ароматныхъ веществъ (*species aromaticæ Ph. Borus.*), къ коимъ, при значительномъ упадкѣ жизнедѣятельности, можно прибавлять съ большою пользою камфорный спиртъ, или уксусъ.

Что касается до *внутреннего лѣченія*, то здѣсь, тотчасъ при появлѣніи атонического состоянія, прежній противувоспалительный способъ долженъ быть оставленъ и назначенъ легко возбуждающій изъ ароматическихъ средствъ к. с. aqua aromaticæ citri, flor. avrantiorum, melissæ, chamomillæ съ прибавленіемъ къ нимъ, смотря по надобности, либо saturationis kali carbonici, либо acetatis ammoniæ liquidæ, либо минеральныхъ кислотъ, наимѣче соляной (N 64.).

*B.) Собственно антоновоогненное состояніе* (*gangraena*) характерически отличается величайшимъ упадкомъ репродуктивной силы. Огневичное страданіе воспринимаетъ здѣсь болѣе или менѣе тифозный характеръ и требуетъ сообразнаго ему общаго лѣченія, при которомъ всегда должно обращать вниманіе на степень упадка жизнедѣятельности. Болѣе всего здѣсь нужно стараться отвращать переходъ въ помертвѣніе (*sphacelus*), въ чёмъ успѣть можно приведеніемъ въ правильное состояніе упавшей репродуктивной силы посредствомъ хорошей пищи, возбуждающихъ и укрѣпляющихъ лѣкарствъ. Для сего однакожъ необходимо нужно надлежащее направлѣніе органовъ пищеваренія и плотоуподобленія, ибо безъ того не можетъ выдѣлываться хороший питательный сокъ,—и потому самая питательная пища не прине-

сеть никакой пользы. Слѣдовательно общее лѣченіе должно основываться на слѣдующихъ условіяхъ.

1. Если притомъ находится желудочное сопряженіе и явственно оказываются гастрические припадки к. т. совершивший недостатокъ аппетита, тошнота и наклонность къ рвотѣ, рыхло-влажный, обложеній (по не черный и сухой) языкъ, гнилой вкусъ, гнилая отрыжка и давленіе въ предсердіи, то употребленія рвотнаго ничего недолжно останавливать. Для сего избирается лучшіе испекакуаникъ, ибо рвотный камень легко производитъ поносъ, могущій усилить общую слабость.

2. Когда же при таковомъ состояніи обнаруживается вздутие живота и запоръ на низѣ, причемъ антоново-огненная часть представляетъ весьма дурной, болезненный видъ, то настоитъ показаніе къ употребленію слабительного, впрочемъ легкаго, недрастического, к. с. средня соли: sulphas sodæ, s. magnesia, (N 20). phosphas sodæ (N 15.), decoct. tamarindorum (N 13), serum lactis tamarindatum и проч.

3. Весьма часто случается, что послѣ такового лѣченія возстановляется аппетитъ—и въ сіе время приличное діететическое содержаніе наиболѣе можетъ поправить упавшую репродуктивную силу. Въ такомъ случаѣ позволяетъ животная пища и весьма умѣренное употребленіе хорошаго бѣлаго вина. Сперва можно кушать мясные супы, яйцы въ смятку, студень изъ телятины ногъ и проч., а потомъ мало по малу переходить къ жареному мясу изъ дичи, телятины, цыплять и проч. Коль скоро же при семъ горячка станетъ умножаться, языкъ зѣблается сухимъ и позывъ на пищу будетъ уменьшать-

ся, то употребление вина нужно отказать и животную пищу лучше перемнить на легкую растительную. Иногда и здесь рвотное доставляет большую пользу.

4. Если всеобщая слабость очень велика, состояніе жизнедѣятельности и до обнаруживанія болѣзни было скучное, болѣй уже старъ, либо ослабленъ предшествовавшимъ лѣченіемъ, языкъ однакожъ не показываетъ присутствія желудочныхъ нечистотъ, то большую пользу доставляютъ: умѣренное употребление вина, *infusum calami aromatici, gentianae rubrae, aether sulphuricus* (N 33), *aqua cinnamomi, aqua mentae crispaе, decoctum cinchonae* (N 22) и проч. Таковое лѣченіе до тѣхъ поръ, пока существуетъ только ганграпозное состояніе, почти всегда достаточно бываетъ. Хипа въ порошкѣ, хотя и вошла здесь въ большую славу; но точнѣйшія наблюденія не подтверждаютъ особенной ея пользы.

### § 77.

*Мѣстное лѣченіе* античного огня (*gangraena*) должно быть соединено всегда съ вышепредложеннымъ общимъ лѣченіемъ. Коль скоро въ наружныхъ частяхъ замѣтится измѣненіе въ цѣѣтѣ, уменьшеніе чувствительности, образованіе античного огненныхъ пузырковъ, или прекращеніе прежнаго нагноенія, то на онныя тотчасъ надлежитъ прикладывать теплый примочки изъ настоя ароматныхъ травъ съ прибавленіемъ камфорного спирта, вѣсколько разъ въ день вливатъ терпентинное масло, либо овлаживъ онымъ плюмасо, прикладывать его на страждущее мѣсто, прикрывая сверху теплою аромат-

шюю припаркою. Все сіє должно продолжать до тѣхъ поръ, пока антоповоогненное страданіе получитъ оживленный видъ (*stadium detersionis*) и больной будетъ ощущать боль. Ежели при семъ окажутся помертвѣвшія пепельносѣрыя части, то можно отдѣлять ихъ пинцетомъ, наблюдая однакожъ всаски, чтобы симъ непричиинить боли и кровотеченія. Коль скоро появится доброкачественное наращеніе мясныхъ сосочековъ и воспослѣдуетъ хорошее нагноеніе, то можно прикладывать сухое плюмасо и края язвы стягивать липкимъ пластыремъ; а при дурномъ состояніи и нагноеніи особенно рекомендуется *Рустова мазь* (N 107), настойка смирины, камфора, селитренные пары, припарки, освобождающія углекислый газъ, дрожжи, тертая морковь и проч.

## § 78.

*III. Третій періодъ* представляетъ мѣстную смерть (*sphacelus*), при чемъ больной находится въ величайшей опасности, наипаче когда помертвѣніе болѣе и болѣе распространяется. *Общее страданіе* при семъ воспринимаетъ всегда совершенно *тифозный характеръ*; посему въ такихъ случаяхъ должно всеми мѣрами стараться возвышать жизненные силы летучими возбуждающими и раздражающими средствами, изъ коихъ мыскусъ (*moschus orientalis*) въ настоящемъ, неподдѣланномъ видѣ и въ большихъ приемахъ (5—10 гранъ) заслуживаетъ всякое преимущество. Сверхъ сего сюда принадлежать эфиры, особенно сѣрный, камфора (N 22), соль оленяго рога, крѣпкія наливки мауна, змѣевика, баранки и упот-

ребление настоящаго старого рейнвейна, либо токайскаго вина.

§ 79.

*Мъстное лѣченіе* помертвѣнія разнствуетъ по различнымъ формамъ онаго:

1. Если воспалительная опухоль сдѣлалась мягкою, рыхлою и подъ кожею образовалась гнилая матерія, либо воздушная опухоль, то надлежитъ здѣдать на оной пѣсколько насѣчекъ, или вскрыть совершеннымъ разрѣзомъ, для того чтобы испразнить гнилую матерію и развившіеся тамъ гасы. Впрочемъ при семъ необходимо нужно соблюдать величайшую осторожность, по причинѣ неравномѣрнаго распространенія помертвѣнія въ глубинѣ и на поверхности.

2. Вскрывши таковую полость, должно употреблять раздражающія и оживляющія средства. Вся полость опрыскивается терпентиннымъ масломъ и наполняется свертками корпіи, овложенными симъ же масломъ, съ тѣмъ намѣренiemъ, чтобы произвести произраждательное воспаленіе, если жизнеподобность, покрайней мѣрѣ въ глубинѣ, не совершенно еще уничтожена. Вкладываемое плюмасо изъ корпіи можно намазывать также сваривающими бальзамическими мазями.

3. Во влажномъ помертвѣніи рекомендуются лѣкарства наиболѣе въ сухой формѣ. Для сего помертвѣвшая поверхность присыпается хиннымъ порошкомъ, овложеніемъ, для большаго дѣйствія, ole trebenihiæ, либо порошкомъ изъ хины, камфоры, мирры, квасцовъ, также

угольнымъ порошкомъ (*Rust*). Въ сухомъ же помертвѣніи предпочтитаются болѣе припарки изъ угольного порошка, льняныхъ сѣмянъ, также изъ настоя солода, овсяной муки и дрожжей (*S. Cooper*). Однако жъ припарки сіи уничтожаютъ, по видимому, одну гнильость, но мало способствуетъ отдѣленію помертвѣлыхъ частей отъ живыхъ. Посему вѣсма хорошо прибавлять къ онѣмъ раздражающія и возбуждающія средства к. с. pulvis calami aromatici, p. flor. arnicæ, p. hbæ scordii, spiritus camphoratus, ammonia liquida, aetheroleum terebinthinæ, oleum petræ, mixtura oleoso-balsamica ph. Bor. также горчица, хрѣнъ, имбирь и проч. Отличное дѣйствіе оказываетъ въ семъ случаѣ селитра въ порошкѣ (*Rust*), разжиженныя минеральная кислоты и растворъ хлоровой извести.

4. *На смежныя части* таковой помертвѣлой поверхности или полости, наипаче если кожа здѣлалась на онѣй дурноцвѣтною или вздутую, можно прикладывать съ большою пользою теплые припарки изъ цветовъ ромашки съ камфорнымъ спиртомъ, либо ставить весь членъ въ теплую ароматную ванну, обмывать его виннымъ и другими спиртами, настоемъ руты, розмарина, баранки и проч.

### § 80.

Если при таковомъ общемъ и мѣстномъ лѣченіи упавшая жизнедѣятельность начнетъ возвышаться и большой становиться поправляться, то здѣсь, какъ и при антиновоогненномъ состояніи (§ 76), обнаруживается образовательное воспаленіе и добро качественное нагноеніе, коимъ

полагаются границы распространению помертвения. При семъ произраждается красная, воспалительная линія, а по отдѣлениіи мертвыхъ частей остается болѣе или менѣе углубленная язва, коей лѣченіе производится по общимъ правиламъ. Когда помертвѣнію подвергнется весь членъ, большой или малый, но опое далѣе не распространяется, то натура весьма медленно производить отдѣленіе мертвыхъ частей и членъ таковыи, находясь въ гниломъ состояніи, или сморщившись на подобіе муміи, держится еще долгое время на сухожильныхъ частяхъ и костяхъ. Если же и послѣдуетъ произвольное отпаденіе, то послѣ оного остается всегда культа конусообразной фигуры съ выстоящею впередъ костью и съ весьма растянутую поверхностию раны, которая покрывается весьма не скоро и притомъ худымъ, легко раздирающимся рубцомъ. Таковое невыгодное, слишкомъ продолжительное отдѣленіе члена можетъ быть ускорено искусствомъ, посредствомъ простой ампутационной раны, дѣлаемой въ надлежащее время и въ приличномъ мѣстѣ и соединяющей въ себѣ всѣ условія скораго заженія. Опасности, что ампутационная рана здѣлается опятьantonовоогненнюю, нельзя предполагать тамъ, где antonovъ огонь произошелъ отъ чистомѣстныхъ а не отъ внутреннихъ причинъ и где состояніе силъ некоторымъ образомъ надежно.

### § 81.

Случается одинакожъ, что несмотря на всю дѣятельность общаго и мѣстнаго лѣченія, antonovoогненное разрушеніе не останавливается, но безпрестанно распро-

страпяется далѣе вверхъ. Здѣсь предстоитъ очень важный вопросъ, должно ли отнимать членъ въ здорово-вомъ мѣстѣ для сохраненія конечности и для спасенія больнаго? *Рустъ*, утверждаясь на многочисленныхъ опытахъ, утверждаетъ, что въ большей части случаевъ больные, спасенные отъ распространенія влажнаго аントонова огня посредствомъ отрѣзанія большихъ членовъ, могли бы выздоровѣть и безъ онаго и что изъ тѣхъ, кои, не смотря на здѣланное имъ отнятіе, померли, по крайней мѣрѣ нѣкоторые остались бы въ живыхъ, если бы неподвергались операциі. Вообще о семъ предметѣ трудно начертать рѣшительныя правила и главнымъ дѣломъ останется всегда *judicium practicum*, совѣты другихъ и собственная опытность. Надобно впрочемъ положить себѣ за правило: избѣгать сколько возможно отрѣзанія члена и, дѣйствуя па остановленіе аントонова огня приличными наружными и внутренними средствами, ожидать образованія пограничной линіи, ибо тамъ, гдѣ натура не въ силахъ произвести такового образованія, нельзя надѣяться, чтобы послѣ толниихъ потрясеній организма, какія сопряжены съ отнятіемъ члена, она могла бы укрѣпиться въ силахъ своихъ и въ ранѣ, искусствомъ здѣланной, произвести всѣ условія къ благополучному заживленію. Конечно, если при семъ оказываются значительныя кровотеченія, коихъ, по вышеизложеннымъ правиламъ, остановить невозможно, то настоитъ прямое показаніе къ отнятію члена, ибо въ такомъ случаѣ кровотеченіе угрожаетъ не избѣжною смертію, а для спасенія жизни лучше предпринимать сумнительное, даже опасное средство, нежели никакого.

---

## О

### ВОСПАЛЕНИЯХЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ

---

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### ВОСПАЛЕНИЯ КОЖНОЙ СИСТЕМЫ

(*Dermatophlogoses*).

#### § 82.

*Кожа* (*cutis*) устроена изъ двухъ, удобно отдѣляемыхъ между собою слоевъ. Первый слой ея составляетъ *верхняя кожица* (*cuticula, epidermis*), или тонкая перепонка рогового существа, не имѣющая ни сосудовъ, ни нервовъ и потому совершенно нечувствительная. Она покрываетъ виѣшнюю поверхность кожной перепонки и тѣмъ умѣряетъ чувствительность оной и предохраняетъ отъ раздраженія виѣшихъ вліяній. Толщина сей кожицы не во всѣхъ мѣстахъ одинакова и тамъ, гдѣ покры-

ваемая ею кожная перепонка соединяется съ внутреннею перепончатою системою т. е. съ слизистыми оболочками, верхняя кожица переходитъ въ гораздо тончайшій покровъ (*epithelium*). Подъ сею кожицею, въ пѣ-которыхъ мѣстахъ, особенно на подошвахъ, находится слизистая сѣточка (*corpus reticulare, s. rete mucosum Malpigi*). Сверхъ сего верхняя кожица спаѣжена весьма многими скважинами, для прохожденія волосъ, вырастающихъ въ кожной перепонкѣ и особенными канальцами, чрезъ которыхъ выступаетъ потъ (*Eichhorn*). У означенныхъ скважинъ простираются отъ нее внутрь къ кожной перепонкѣ тончайшіе отростки или продолженія, кои окружаютъ слабко волосъ до самаго корня и соединяются съ онимъ почти такъ, какъ верхняя кожица съ корнемъ ногтя. Какимъ образомъ происходитъ образованіе верхней кожицы, это еще недоказано, но такъ какъ она находится въ двухмѣсячномъ зародышѣ (*Meckel*), то нельзя ее почитать засохшимъ отдѣленіемъ кожной перепонки.

Второй слой кожи составляетъ собственно *кожная перепонка* (*corium, derma*), состоящая изъ особливой мягкой и вязкой, подобной кѣлтчатому веществу, но гораздо плотнѣйшей ткани, въ которой можно отличать очень мѣлкіе волокны, слоебразно расположенные. Плотность сей ткани па внутренней ея сторонѣ гораздо меньшая, нежели посрединѣ и въ наружной сторонѣ. Внутренняя, гораздо рыхлѣйшая сторона кожной перепонки соединяется съ *жирною пленкою* (*panniculus adiposus*), а виѣшняя, отличающаяся болѣе или менѣе углубленными линіями, идущими въ разныхъ направле-

ніяхъ (*Purkinie*), покрываются верхнею кожицею. Маленькие бугорки или возвышения, образующіяся между оными линіями называются *кожными сосочками* (*papillae corii, textus papillaris*), усматриваемыми гораздо явственнѣе тамъ, гдѣ находится утонченѣйшее чувство осознанія напр. на верхушкахъ пальцевъ, титечныхъ соскахъ и проч. Слѣдственно сосочки сіи наиболѣе изобилуютъ нервами.

*Накожные, или сальные желзы* (*foliculi s. sebaceae*), отдѣляющія накожный жиръ (*sebum*), суть маленькие кругловатые мѣшечки, изъ коихъ болыше состоять изъ сплоченныхъ между собою клѣточекъ и открываются на кожѣ короткимъ проходнымъ каналомъ (*Weber*). Онѣ находятся въ кожной перепонкѣ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ растутъ волосы, но на подошвахъ и ладоняхъ никогда не замѣчены. Вообще въ нихъ заключаются почти всегда болыше или меньшіе волосы и потому мѣшечки ихъ суть ничто иное, какъ влагалища волосъ (*Weber*).

Кожная перепонка весьма изобилуетъ также сосудами, кои составляютъ въ оной особенную сосудистую сѣточку (*rete vasculosum*). По *Эйхгорну* артеріи ея образуютъ въ самомъ внутреннемъ слоѣ сѣточку, изъ коеї вѣтви, проницая чрезъ средній плотный слой кожной перепонки, соединяются опять въ тончайшую сѣточку въ поверхностномъ слоѣ между кожными сосочками. Въ сихъ сѣточкахъ артерій начинается образованіе мѣлкихъ кожныхъ *венъ*, кои тотчасъ соединяются съ большими вѣтвями просвѣщающими обыкновенно чрезъ кожу тамъ,

гдѣ она наиболѣе истончена. *Лимфатические сосуды* находятся въ кожной перепонкѣ въ большомъ количествѣ. Ртуть, наливаемая въ какой либо крупный лимфатический сосудъ, посредствомъ нажиманія, можетъ быть вытѣснена въ тончайшія вѣточки, кои въ поверхностномъ слоѣ кожной перепонки распространяются на подобіе дерева (*Haase*).

§ 83.

По таковому устроенію кожи явственно можно видѣть, что местопребываніе воспаленій составляетъ кожная перепонка и преимущественно сосудистая сѣточка оної, служащая питательнымъ аппаратомъ для всѣхъ прочихъ частей кожи. Въ верхней кожице, не имѣющей ни сосудовъ, ни первовъ, воспаленіе обнаруживаться не можетъ, а подкожная клѣтчатая пleva, принадлежащая также къ аппарату общихъ покрововъ, принимаетъ участіе въ накожныхъ воспаленіяхъ, кои, распространяясь на ону, значительно измѣняютъ свою форму и называются *флегмонозными*.

Вообще кожа, какъ перепончатый аппаратъ, имѣющій репродуктивную жизнь, способна всегда подвергаться воспалительнымъ процессамъ, тѣмъ болѣе, что она находится въ непосредственной связи съ вѣнчнею атмосферою, удобнѣе другихъ поражается механическими, химическими и другими вредностями и касательно от правленій своихъ к. т. испаренія, выведенія изъ тѣла ненужныхъ и воспріятія въ оное инородныхъ веществъ

чаще другихъ органовъ подлежитъ болѣзняеннымъ измѣненіямъ, не говоря уже о величайшемъ сочувствіи и антагонистическомъ дѣйствіи между ею и внутреннею перепончатою системою, въ слѣдствіе коихъ на кожѣ отражаются весьма многія внутреннія страданія подъ названіемъ сыпей. Впрочемъ, хотя во всѣхъ безъ изъятія накожныхъ сыпяхъ существуетъ воспалительное состояніе кожи (*Haase, Rayer.*); однакожъ большою частію оно бываетъ здѣсь не столько самостоятельнымъ, какъ припадочнымъ, зависящимъ либо отъ сочувственаго страданія кожного органа, либо отъ антагонистического дѣйствія въ тѣлѣ. Посему сыпнныя воспаленія будутъ разсмотрены здѣсь только въ общемъ ихъ содержаніи, какъ воспаленія кожи, а въ частности они изложены будутъ между такими болѣзнями, къ которымъ они могутъ быть отнесены по существенному своему значенію (см. сыпное воспаленіе). Къ явственнымъ и болѣе самостоятельнымъ воспаленіямъ кожи принадлежать: рожа, ноготьда, кровавый и антоновоогненный вередь, злокачественный волдырь, пролежни, ожоги и отмораживанія.

---

Рожа.

(*Erysipelas.*)

*Syn:* Erythropelas, rosa, brunus, icteritia rubra, ignis sacer, ig. sylvestris, sebris erysipelacea.

§ 84.

*Рожею* называется въ общемъ значеніи слова всякое мѣстное поверхностное воспаленіе кожи съ умноженнымъ развитіемъ теплоты и съ разливающимся неограниченнымъ распространеніемъ красноты, которая при давлѣніи перстомъ исчезаетъ, а по отнятіи онаго опять появляется.

Болѣзненная форма сїя обнаруживается въ безконечно разнообразныхъ измѣненіяхъ, личинахъ и сопряженіяхъ—и потому ученіе о рожѣ до тѣхъ поръ, пока *Рустъ* не объяснилъ въ точности сего предмета, заключало величайшую путаницу и противурѣчія въ мѣніяхъ. Слѣдя остроумному и основательному его разбору, мы раздѣляемъ теперь всѣ формы рожи на два главныхъ рода подъ названіемъ *истинной и ложной рожи*.

§ 85.

*A. Настоящая или истинная рожа* (*erysipelas verum s. exanthematisum*) представляетъ собственного рода страданіе, проистекающее отъ пищеварительного аппарата и зависящее отъ желчнаго раздраженія. Она отличается слѣдующими свойствами: большее или меньшее пространство кожи поверхностно воспалается, дѣлается блѣднокраснымъ, лоснящимся, неограниченнымъ и отливается желтымъ цвѣтомъ. Краснота отъ давлѣнія перстомъ исчезаетъ, но по отнятіи онаго тотчасъ возстановляется. При сбѣк кожа нѣсколько распухаетъ и ощущается.

щается горячею, по мягкою. Боль рѣдко бываетъ сильная, рвущая, но обыкновенно слабая, болѣе зудящая, жгучая, колющая и напрягающая. Страданіе таковою болѣшю частію сопровождается воспалительною горячкою желудочно-желчнаго свойства. Настоящая рожа чаще всего обнаруживается на лицѣ (*erysipelas faciei*); впрочемъ она встречается на всѣхъ прочихъ частяхъ и, кромѣ лица, появляется преимущественно на голеняхъ и женскихъ грудяхъ. Если она переходитъ въ изъязвленіе и антоновъ огонь, то никогда необразуетъ зыблюющагося нарыва, а всегда только открытую, гнилую язвенную поверхность.

§ 86.

*Отличія сей рожи относительно формъ бываютъ слѣдующія:*

1. *Пузырчатая рожа* (*erysipelas pustulosum*, *bullosum*, *phlycteaenodes*), при коей съ означенными припадками рожи обнаруживаются еще на верхней кожице пузыри, то малые, величеною въ прослоеное зерно (*er. miliare*), то большіе, подобные пузырямъ, нарываемымъ испанскими мушками (*er. vesiculare*). Рожа сія продолжается одну, или двѣ недѣли и сопровождается часто весьма сильною желчною горячкою.

2. *Воспалительная рожа* (*erysipelas phlegmonodes s. inflammatorium*) есть та, при коей припадки воспаленія подкожной плевы (*phlegmone*) смѣшиваются съ припадками рожи и потому местное страданіе въ такомъ случаѣ бываетъ гораздо возвышенѣе, тверже, болѣе

ограничено, сопряжено съ большею краснотою, жаромъ и болью и сопровождается всегда гораздо сильнѣйшею горячкою. Сія рожа, по причинѣ сопряженія своего съ подкожнымъ воспаленіемъ, принадлежитъ болѣе къ настоящему роду.

3. *Отечная рожа* (er. oedematodes) есть та, при коей воспалительная опухоль бываетъ гораздо блѣднѣе, возвышеніе, мало болитъ и отъ давленія перстомъ получаетъ впадину, невдругъ выполняющуюся. Впрочемъ, если рожевидное воспаленіе покрываетъ какую либо отечную опухоль, то болѣзнь непринадлежитъ къ настоящему роду рожи, а составляетъ только сопряженіе отека съ рожею (oedema erysepelatosum).

4. *Скиррозная рожа* (er. scirrhodes). Такъ называется настоящую рожу *Платнеръ*, если она ощущается твердою болѣе обыкновенного; другое же даютъ таковое название той рожѣ, которая присоединяется къ скирру, но въ семъ случаѣ рожа принадлежитъ къ приподобнымъ явленіямъ.

5. *Антоновоогненная рожа* (er. gangraenosum, sarcinulosum, typhodes) есть весьма рѣдкая болѣзнь, существующая иногда эпидемически и известная своею злокачественностью. Сопровождающая ее горячка въ самомъ началѣ уже бываетъ тифозная и местное страданіе въ скоромъ времени переходитъ въ антоновоогненное состояніе. Рожа сія оказывается на лицѣ, шеѣ, плечахъ и мочонкѣ, распространяясь скоро на близлежащія части, при чмъ онѣ чрезвычайно распухаютъ, сильно болятъ и покрываются темнымъ, кармазинокраснымъ цвѣтомъ, который чрезъ 24 часа постепенно тем-

иѣя, переходитъ въ віолетово-синій и черносмуглый, на-  
конецъ появляются многіе большия антоново-огненные  
пузыри, какъ сигналъ влажнаго, быстро распространяю-  
щагося антонова огня, отъ коего въ скоромъ времени  
приключается смерть, при ужасныхъ явленіяхъ разло-  
женія и гнилостнаго состоянія въ тѣлѣ. Рожа сія хотя  
и составляетъ разительное измѣненіе настоящей рожи,  
однакожъ ее должно отличать отъ т. н. ложной рожи  
(pseudoerysipelas) и отъ всѣхъ тѣхъ случаевъ, гдѣ анто-  
новъ огонь рождается при рожевомъ страданіи, какъ  
исходъ отъ случайныхъ вліяній, превратнаго лѣченія ипр.

### § 87.

*Отличія настоящей рожи по мѣсту, занимае-  
ному ею, суть:*

1. *Рожа, оказывающаяся на лицѣ* (erysipelas faciei)  
составляетъ собственный видъ настоящей рожи, запи-  
маетъ либо всю голову, либо одно лицо, либо нѣкото-  
рыя части опаго, сопровождается обыкновенно гораздо  
сильнѣшими общими припадками, нерѣдко головною  
болью, бредомъ, спячкою и апонектическимъ состоя-  
ніемъ. Иногда же воспринимаетъ видъ пузырчатой ро-  
жи и находится въ сопряженіи съ опухолью шейныхъ  
желѣзъ.

2. *Рожа женскихъ грудей* (ег. mammae) рож-  
дается во время беременности и кормленія грудью, по-  
ражаетъ либо одну, либо обѣ груди, сопровождается  
сильною болью и сопряжена всегда съ нарушеніемъ  
отдѣленія молока. Отъ сей рожи должно отличать ложную,

рожу женскихъ грудей, которая оказывается при переходѣ воспаленія грудей въ нагноеніе и составляетъ виѣшній рефлексъ образующагося въ глубинѣ нарыва.

3. *Рожа на ногахъ* (er. pedum), поражаетъ наиболѣе людей, кои много стоять, или исправляютъ ногами очень трудныя работы, также старыхъ худосочныхъ особъ, пьяницъ и тѣхъ, кои страждуть хроническими сыпями, застарѣлыми язвами, водяною болѣзнью и пр. Обыкновенно рожа сія имѣетъ мѣстопребываніе въ стопѣ ноги, около лодыжекъ и въ икрахъ, но на лѣшкахъ рѣдко случается.

4. *Поясобразная рожа* (zona, zoster s. erysipelas zonaformе) есть видъ пузырчатой рожи, которая въ большей части случавъ оказывается на брюхѣ, рѣже на груди, шеѣ, лицѣ и мошонкѣ, окружая какую либо часть въ видѣ пояса, рѣдко сплошнаго, но всегда почти съ однимъ или многими здоровыми промежутками кожи.

### § 88.

*Течение.* Болѣзнь сія начинается обыкновенными предвестниками горячки, к. т. усталостью, тягостію въ членахъ, угрюмостію, томлениемъ, болью въ головѣ и пояснице, ознобомъ и т. п. Потомъ наступаютъ явственныя огневичные припадки к. т. жаръ, жажды, головная боль, давленіе подъ ложкою, напряженіе въ предсердіи, наклонность къ рвотѣ, очень обложеній языкъ, иногда бредъ, сонливость и даже бѣшенство. Наконецъ вдругъ выступаетъ рожа и въ то время горячка иѣсколько уменьшается; впрочемъ бываютъ случаи, гдѣ она продолжается

въ той же силѣ, или даже увеличивается. Свойство горячки рѣдко бываетъ чисто воспалительное, или простудно-ревматическое, но гораздо чаще желудочно-желчное. Вообще горячка разнствуетъ по сложенію и возрасту больныхъ, по господствующему болѣзенному расположению,—и въ семь отношеній отъ самой простой воспалительной можетъ доходить до гнилой горячки. По совершенномъ развитіи, рожа въ продолженіи трехъ или четырехъ дней обыновенно умножается и далѣе распространяется (ер. ambulans), столько же времени остается въ цвѣтешіи и потомъ уже начинаетъ уменьшаться.

§ 89.

**Исходы.** Самый лучшій и частѣйшій исходъ сей болѣзни есть 1.) *разрѣшеніе*, совершающееся часто обыкновенными критическими явленіями, причемъ краснота дѣлается постепенно блѣднѣе, опухоль опадаетъ, кожа желтѣеть, сморщивается и паконецъ слупливается малыми чешуйками. 2.) *Нагноеніе*,—исходъ, несвойственный настоящей рожѣ и доказывающій всегда сопряженіе опой съ отекомъ либо съ воспаленіемъ клѣтчатой плевы (phlegmone). 3.) *Антоновъ огонь* случается только при эпидемической рожѣ въ соединеніи съ гнилою и первою горячкою, также у старыхъ худосочныхъ особъ, при неправильномъ лѣченіи и оказывается гораздо чаще въ рожѣ на ногахъ, нежели на лицѣ. 4.) *Переносы* (metastases), по причинѣ большой наклонности рожи передѣлывать отъ одной части къ другой (е. *vacum*, *erraticum*), случаются весьма часто и угрожаютъ наиболѣшему опас-

сностію въ то время, когда рожа переносится отъ периферіи къ внутреннимъ органамъ, потому что внутреннія воспаленія такового рода бываютъ чрезвычайно сильны и удобно поражаются антоновыми огнемъ. 5.) *Послѣдственная болѣзнь*, остающіяся иногда послѣ рожи, суть обрыхлѣніе органической массы и отекъ страдавшихъ частей.

§ 90.

*Причины.* Многіе имѣютъ *предрасположеніе къ рожѣ*, по которому они подвергаются ей отъ самой малозначительной причины. Предрасположеніе сіе можетъ быть также наслѣдственное. У иѣкоторыхъ рожа обнаруживается ежегодно въ извѣстное время (er. periodicum). Старики страждутъ часто привычною рожею на ногахъ (er. habituale) и подвергаются большой опасности, если она скрывается внутрь. Но вообще рожею поражаются удобите люди иѣжные, чувствительные и раздражительные, желчного темперамента, также очень тучные, либо худосочные, предающіеся пьянству и проч. Мѣсячное очищеніе и беременность могутъ быть также предрасполагающими моментами оной.

Изъ слугайныхъ причинъ самое могущественное есть годичное состояніе воздуха. Посему рожа чаще всего слушается осенью, или въ такое время, когда послѣ жаркой погоды слѣдуетъ холодная и влажная. Весьма много также содѣйствуютъ на произрожденіе оной душевныя возмущенія, особенно испугъ, досада, гнѣвъ и другія страсти, наводящія неправильное отдѣленіе желчи.

Сюда же припадлежатъ обремененія желудка грубою, неудобоваримою пищею, употребленіе въ пищу устрицъ, раковъ, грибовъ, иногда луку и чесноку. Въ другихъ случаяхъ болѣзнь сія рождается послѣ пьянства, мгновенной простуды, прекращенныхъ кровотеченій и слиза-  
зетеченій, заживленныхъ фонтанелей или язвъ, непускания крови послѣ сдѣланной привычки и проч.

§ 91.

*Предсказание*, Рожа невсегда бываетъ опасною болѣзнию и проходитъ нерѣдко сама собою, безъ всякаго лѣчения. Главныя неблагопріятныя обстоятельства суть переносы, угрожающіе опасностю жизни и неправильное лѣченіе, отъ чего она переходитъ иногда въantonовъ огонь. Если рожа присоединяется къ хроническимъ болѣзнямъ, или зависитъ отъ цыпогтиаго и другаго худосочного состоянія, то часто бываетъ дурнаго значенія. Здѣлавшись привычною, она служить иногда къ поддержанию относительного здоровья. Въ некоторыхъ случаяхъ рожа бываетъ критическою и съ появлениемъ ея прекращаются другіе болѣзненные припадки.

§ 92.

*Лѣченіе* настоящей рожи раздѣляется на мѣстное и общее:

1. *При мѣстномъ лѣченіи* надлежитъ всячески избегать влажности и холода. Вообще здѣсь ненужно поступать очень дѣятельно, а лучше негативно, ограничи-

вальсь избѣжаніемъ и удаленіемъ вредностей. Посему сухіе мѣшечки, наполненные ромашковыми или бузинными цветами, ароматическими травами, бобовою мукою съ примѣсью камфоры, или безъ оной, либо свертокъ пакли, усыпанный пудрою, мѣломъ и т. п.; присыпки изъ легкихъ всасывающихъ веществъ, какъ *pulvis absorbens Ph. C. R.* и проч. наиболѣе приличны въ семъ случаѣ. Таковые мѣшечки и присыпки, отвращая вліяніе холоднаго воздуха и другія вредности, поддерживаютъ теплоту въ страждущихъ частяхъ и тѣмъ способствуютъ разрѣшенію. Подобнымъ образомъ дѣйствуетъ кусокъ фланели или ваты, заячаго либо кроликового меху, лебяжей кожи и пр. Рожа, оказывающаяся на туловищѣ и конечностяхъ нестоль чувствительна къ водѣ, какъ рожа на лицѣ. На оную можно прикладывать съ пользою свѣжіе листы капусты, винограда и проч. кои пріятнѣмъ образомъ прохладжаютъ, утолаютъ боль и напряженіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ ускоряютъ и самое излѣченіе. Вообще рожа, получающаяся въ отдаленности отъ лица, гораздо лучше, нежели личная, переносить влажное лѣченіе, неотступая на внутренія части; - разумѣется влажность таковая должна быть теплая, а не холодная, употребляемая въ примочкахъ безостановочно, въ противномъ случаѣ гораздо приличнѣе совершенно удерживаться отъ оной и оставаться при травяныхъ мѣшечкахъ, кои всегда вѣрище дѣйствуютъ. Одна только пузырчатая рожа часто не переносить сухой теплоты и требуетъ нерѣдко влажно теплыхъ примачиваній (*epithema*) изъ свинцовой воды. Тоже самое можно сказать и о пологообразной рожѣ, сопряженной всегда почти съ образованіемъ пузырей.

Всѣ мази и пластири, всѣ смолистыя раздражающія, спиртныя, кислые или жирные вещества совершенно вредны и оказываютъ всегда дурныя послѣдствія к. т. умноженіе воспаленія и распространеніе его на клѣтчатую плеву (*phlegmone*), либо переходъ его въ атоновъ огонь.

§ 93.

2. *Общее лѣченіе.* Поелику настоящая рожа зависитъ всегда отъ внутренней причины, то въ большей части случаевъ, при мѣстномъ лѣченіи, необходимо и общее. Кровопусканіе изъ руки, въ прямомъ отношеніи, рѣдко бываетъ потребно. Впрочемъ оно можетъ быть производимо съ пользою, если рожа произошла въ слѣдствіе прекращенныхъ кровотеченій, также у полнокровныхъ людей, склонныхъ къ апоплексическому удару, напичче, если они поражаются рожею на лицѣ въ значительной степени и имѣютъ твердое жилобіеніе. При таковыхъ обстоятельствахъ кровопусканіе доставляетъ большое облегченіе. Однако же оно не должно простираться до такого количества, какъ при чистыхъ внутреннихъ воспаленіяхъ, ибо послѣ всякаго ослабленія, а слѣдственно и послѣ наводимаго кровопусканіемъ, рожа удобно отступаетъ внутрь.

Если рожа совершенно простая и не сопровождается огневичными движеніями, притомъ языкъ чистый и испражненіе на низъ свободное, то кромѣ приличной діэты, не нужны никакія внутреннія лѣкарства. Въ другихъ легкихъ случаяхъ дается уксусокислый амміакъ

(N 82, 108), бузинная и малиновая вода, сюрмяное вино и проч. Когда же языкъ, какъ въ большей части случаевъ бываетъ, сильно обложенъ и находятся всѣ признаки желудочныхъ нечистотъ, то настоитъ непремѣнное показаніе къ испражняющимъ средствамъ. Однакожъ не все равно, производится ли въ такомъ случаѣ испражненіе низомъ, или верхомъ—и опытъ доказалъ, что рвотное при рожѣ гораздо преимущественнѣе слабительного. Вообще въ такомъ случаѣ лѣченіе настоящей рожи должно начинать рвотнымъ и повторять оное, смотря по обстоятельствамъ, на второй или третій день. Слабительное ни въ какомъ родѣ не можетъ вознаграждать рвотнаго. Только при рожѣ на головѣ и лицѣ, по причинѣ существующаго при семъ напора крови къ головѣ, должно наблюдать иѣкоторую осторожность, не давая рвотнаго прежде уменшенія онаго напора кровопусканіемъ, или пьявками, приставляемыми на шеѣ, либо за ушами. Послѣ достаточныхъ испражненій рвоттою могутъ быть даваемы съ пользою легкія слабительные изъ среднихъ солей (N 14. 15.), александрийскаго листа (N 101.), машны (N 12.) и проч., а при явственномъ сопряженіи съ растройствомъ желчной системы: тамарицы (N 15.), черносливный кисель, очищенный винный камень и т. п. Впрочемъ всѣ испражненія должны быть производимы съ иѣкоторою осторожностію и силы по возможности сберегаемы. Если оказывается на clinность къ поту, то приличны теплые чайные настои изъ сухой малины, бузиновыхъ, липовыхъ и померанцевыхъ цветковъ, также употребленіе потогонительныхъ легкихъ, не горячительныхъ средствъ (N 108). Темпе-

ратура въ комнатѣ больнаго не должна быть очень возышена, ибо въ противномъ случаѣ рожа либо отсту-  
паетъ, либо дѣлается злокачественною.

*Антоновоогненное состояніе*, въ которое рожа пе-  
реходитъ только по причинѣ эпидеміи, или чрезмѣрнаго  
ослабленія тѣла и старости, требуетъ сильнѣйшихъ  
возбуждающихъ средствъ, к. с. камфора, мскусъ, опій,  
углекислый амміакъ, змѣевикъ, маунъ, хина, әфиры  
(N 22), спиртъ оленъяго рога, крѣпкія ароматическія на-  
стойки, минеральныя кислоты (N 16, 64.) и соотвѣтствую-  
щая симъ средствамъ діета, хорошее вино, пряно-  
сти и проч.

Если же рожа, по какой либо причинѣ, скрывается  
снутрь, то надлежитъ всѣми силами стараться возста-  
новить ее снаружи. Предпринимая сіе, большею частію  
надлежитъ удовлетворять также другимъ, крайнѣ нуж-  
нымъ показаніямъ. Кровопусканіе здѣсь есть первое и  
важнѣйшее дѣло. Однакожъ показанія къ сему нельзѧ  
искать въ одномъ жилобіеніи, которое часто бываетъ  
въ такомъ случаѣ весьма малое и сжатое, какъ вообще  
при внутреннихъ воспаленіяхъ, но послѣ кровопусканія  
возвышается. Посему здѣсь нужно смотрѣть болѣе на  
общее состояніе, на силы больнаго, жаръ, тоску, уско-  
ренное дыханіе и проч. Часто въ семъ случаѣ и отъ  
рвотнаго должно ожидать большой помощи, особливо  
если идти къ тому противупоказанія. Когда же возста-  
новленіе рожи таковымъ путемъ не удается, то пред-  
писывается селитра и камфора въ достаточномъ пріемѣ,  
настоящей мскусъ отъ 10 — 12 гранъ, потогонительные  
напитки, спиртъ оленъяго рога, вино и проч., дѣлаются

ванны и полуванны, напаче если жизненныя силы скоро упадаютъ, конечности охладѣваютъ и жилобіеніе уменшается.

Изъ мѣстныхъ средствъ, возстановляющихъ рожу очень хорошо дѣйствуетъ сильное треніе суконкою, или щоткою того мѣста, гдѣ была рожа, также прикладываніе къ оному горчичнаго тѣста, хрѣну, или имбира, послѣ обожженія его виннымъ спиртомъ, вообще сильнѣйшихъ красноту наводящихъ средствъ (N 109).

§ 94.

*Лѣченіе предрасположенія къ рожѣ* необходимо для тѣхъ людей, кои, при малѣйшемъ поводѣ и даже безъ всякаго повода, поражаются рожею. Совершенно истребить таковое расположение весьма трудно, однакъ слѣдующія средства, въ точности выполняемыя, оказываются иногда благопріятный успѣхъ. На сей конецъ рекомендуютъ употреблять хину въ существѣ, отварѣ и микстурѣ поперемѣнно въ продолженіи нѣкотораго времени, избѣгая притомъ всѣхъ причинъ, особенно душевныхъ возмущеній, жирной, острой, соленої пищи и спиртныхъ напитковъ и наблюдая легкую утонченную діету; кромѣ сего дѣлать теплые ванны, прилежное движеніе на свободномъ воздухѣ, сухія тренія кожи, избѣгать простуды и носить на головѣ тѣлѣ перстяныя фуфайки, фланелевые или ваточныя рубашки. Весною можно пить съ пользою сыворотку, свѣжевыжатые соки изъ травъ (38 и 39), либо умѣренно-слабящую напизъ минеральную воду (напр. Зеидшицкую горькую) и даже пускать кровь, если сложеніе тѣла по-

зволяетъ. Часто большую пользу доставляютъ Фонтанелли и Теплицкія или Кавказскія сѣрныя ванны и неремѣна мѣстопребыванія, особенно переѣздъ въ теплѣйшую страну.

---

§ 95.

*B. Ложною или ненастоящею рожею* (*erysipelas spurium s. pseudoerysipelas*) называется по *Русту* то болѣзнишее состояніе, которое, хотя имѣеть виѣшній видъ, сходствующій съ настоящею рожею, но въ другихъ отношеніяхъ совершенно отличается отъ оной, представляя всегда постоянное воспаленіе кожи съ слабою краснотою. Сюда принадлежатъ два рода накожныхъ воспаленій: *первообразное рожевидное воспаление* или такое, которое оказывается въ слѣдствіе виѣшнаго накожнаго раздраженія и *припадочное рожевидное воспаление*, составляющее только рефлексъ или отраженіе другаго страданія к. т. углубленнаго воспаленія, скрытаго нагноенія и т. п.

§ 96.

1. *Первообразное рожевидное воспаление* (*erysipelas spurium idiopathicum, erythema, dermatitis partialis*), что касается до распознаванія, имѣеть всѣ виѣшнія признаки настоящей рожи к. т. разливающуюся красноту, скоропроходящее исчезаніе оной при давленіи перстомъ, жгучую боль, легкую опухоль кожи, съ тою

однакожъ разностію, что краснота здѣсь менѣе отливаетъ желтизною и образованіе пузырьковъ рѣдко встрѣчается. Сверхъ того настоящая рожа раждается всегда отъ внутреннихъ причинъ и притомъ послѣ извѣстныхъ предвѣстниковъ огневичныхъ движеній, а рожевидное воспаленіе сего рода происходитъ только отъ вѣнчикахъ вліяній и сопровождается огневичными движеніями послѣ уже, когда воспослѣдуетъ совершенное развитіе его, или оказывается безъ онъхъ.

§ 97.

*Исходы.* Воспаленіе сіе болѣшею частію разрѣщается, при чемъ, какъ и при настоящей рожѣ, кожица слупливается; нагноеніе столько же несвойственно сему воспаленію, какъ и настоящей рожѣ и зависитъ преимущественно отъ худосочнаго состоянія больнаго; вообще оно представляетъ болѣе процессъ изъязвленія, нежели истинное нагноеніе. Иногда послѣ сего воспаленія раждается легкое отвердѣніе кожи и сращеніе оной съ клюпчатою плевою, по рѣдко антоновъ огонь, который оказывается только въ теченіи злокачественныхъ, гнилыхъ горячекъ, или при усилвшемся до чрезмѣрности худосочнѣ тѣла.

§ 98.

*Причины,* производящія болѣзнь сію суть болѣшею частію случайныя. а) *Механическія вліянія* всякаго рода, куда относятся: сильное трепіе кожи, продолжи-

тельное давление, легкія раненія, разрѣзы и уколы оной.  
б) *Дѣйствія животныхъ ядовъ* напр: при проколахъ для прививанія оспы, при укушеніи змѣевъ, бѣшеныхъ собакъ и иѣкоторыхъ насѣкомыхъ. с) *Всѣ раздраженія кожи острыми веществами* к. т. горчицею, перцомъ, имбиремъ, хрѣномъ, шпанскими мушками, жаленіемъ крапивою и проч. д) *Солнечный и огненный жаръ*, причиняющій легкія ожоги первой степени и е) *усиленный холодъ*, дѣйствующій въ продолженіи короткаго времени.

§ 99.

*Предсказаніе* здѣсь обыкновенно бываетъ благопріятное. Большею частію воспаленіе сего рода представляеть легкій мѣстный припадокъ, удобно уничтожаемый искусствомъ и только при худосочіи оказывающей значительныя беспокойства и трудно излѣчиваемый. Оно не имѣетъ наклонности къ переносамъ и, хотя часто распространяется на очень значительное пространство, но никогда не скрывается внутрь и не бросается на другія благороднѣйшія части,—чего всегда надлежитъ опасаться при настоящей рожѣ.

§ 100.

*Лѣченіе.* Не смотря на сходство сего воспаленія съ настоящею рожею, лѣченіе его совершенно противуположно оной. Сколь ни приличны травяные мѣшечки въ настоящей рожѣ, но здѣсь они большею частію могутъ дѣлать вредъ, умножая существенную причину болѣзни. Вообще рожевидное воспаленіе сіе требуетъ всегда дѣя-

тельного лѣченія, при которомъ собственно - дѣйствующее средство есть холода. По сему въ такихъ случаяхъ употребляется холодная вода или лѣдъ, холодная земля или глина, свѣжіе листы капусты, подорожника, винограда, зеленая корка бузины, отдѣленная отъ верхней кожицы, тертая картофель, или морковь и т. п. Если болѣзнь таковыи легкимъ средствамъ скоро не уступаетъ, то можно ускорять лѣченіе припусканіемъ пьявокъ въ окружности страждущей части и употребленіемъ холодныхъ примочекъ изъ свинцовой воды, изъ уксуса, разводимаго по поламъ водою, изъ Теденовой воды (N 56), смѣшанной съ равною частію простой воды и проч.— Отъ таковыхъ средствъ болѣзнь оканчивается обыкновенно въ короткое время. Когда же на четвертый или пятый день разрѣшенія оной непослѣдуетъ, то можно перейти отъ холодныхъ къ теплымъ примочкамъ, особенно къ наливкѣ бузиновыхъ цвѣтовъ, иногда съ прибавленіемъ acei saturni (N 105). Примочки сіи могутъ служить и при наклонности къantonову огню; впрочемъ тогда лучше дѣйствуетъ настой набора ароматныхъ травъ съ прибавленіемъ нашатыря и алкоголя.

Если мѣстное раздраженіе столь значительно, что въ слѣдствіе онаго произошла огневица, то назначается общее противувоспалительное лѣченіе (§ 32): прохладительные напитки (N 19), кисловатыя слабительныя изъ тамариидовъ и виннаго камня (N 13. 14.) или pulvis temperans Rosensteinii Ph. Sv. Въ случаѣ необходимости можно дѣлать и самое кровопусканіе. При сильныхъ боляхъ и чрезмѣрной раздражительности назначается морфиі, белена (N 1, 77). и проч.

При укушениихъ ядовитыми насекомыми и змѣями, хотя холодъ составляетъ также весьма действительное средство, но въ самомъ началѣ отлично действуютъ щелочи, специфически уничтожающія силу животныхъ ядовъ. Посему, тотчасъ по воспослѣдовавшемъ укусеніи, должно пустить на больное мѣсто одну или двѣ капли ammoniæ liquidæ, либо намазать оное обыкновенною летучею мазью, а потомъ употреблять холодныя примочки, кои, при недостаткѣ свинцовой воды и другихъ аптекарскихъ припасовъ, весьма хорошо могутъ быть дѣлаемы изъ кислаго молока.

Тамъ, гдѣ воспаленіе перейдетъ въ антоповъ огонь, нужны раздраженія и противугнилостныя средства: камфорный спиртъ, смѣшанный по поламъ съ свинцовою водою, растворъ хлоровой извести, unguentum de styrace (N 107.), ungu. basilicum cum tra myrrhæ, ungu. terebinthinatum, ungu. camphoratum, ungu. Aulenrielei, queruginum s. contra decubitum Ph. univ. и проч. (§ 79.).

---

§ 101.

2. *Приводичное или сопутственное рожевидное воспаление* (erythema symptomaticum, consensuale, pseudoerysipelas Rustii) есть ничто иное, какъ только рефлексъ или отраженіе другаго какого либо страданія, обрѣтающагося глубже подъ кожею. Страданіе таковое можетъ быть:

А. Воспалительное напряженіе серозныхъ, волокни-

стыхъ оболочекъ и сухожильныхъ растяженій, вообще воспаленіе, нагноеніе иantonовъ огонь всѣхъ составовъ тѣла, лежащихъ подъ кожею, отъ клѣтчатой до мозгокостной пlevы (*periosteum internum*), также раздраженіе, причиняемое посторонними, проникнувшими внутрь тѣлами, пулями, отдѣленными при помертвѣніи кусками костей и т. п.

**В.** Перепосное отложеніе на клѣтчатую плеву, надкостную плеву и желѣзы жидкой или твердої массы, какъ бываетъ въ ревматическихъ, составоломныхъ, золотушныхъ и родильныхъ болѣзненныхъ состояніяхъ.

**С.** Особенное некротическое перерожденіе клѣтчатой плевы (*necrosis telae cellulosa subcut.*), распространяющееся на большую или меньшую объятность, иногда на весь членъ и зависящее, какъ предполагаютъ, отъ вліянія особенно измѣняющейся атмосфера, сильного холода и вдругъ сменяющейся температуры.

### § 102.

При всѣхъ сихъ страданіяхъ образуется на кожѣ рожевидное воспаленіе, почти такъ, какъ описано при настоящей рожѣ, съ тою однакожъ разностію, что краснота при немъ распространяется нестоль равномѣрно, какъ при настоящей рожѣ и въ некоторыхъ мѣстахъ бываетъ болѣе усиленная, а въ другихъ даже віолетовая, что страждущая часть не обнаруживаетъ значительного жара и ощущается иногда твердою и шишковатою, а иногда мягкою и тѣстоватою съ обрѣтающеюся въ глубинѣ болью, а иногда и зыблениемъ. Впрочемъ

обнаруживаніе сей болѣзни не во всякомъ случаѣ бываетъ одинаково и зависитъ отъ разности внутренняго подкожнаго разстройства, коего сочувственнымъ страданиемъ бываетъ виѣшнее накожное воспаленіе.

1. *При воспалительномъ напряженіи* серозныхъ и волокнистыхъ органовъ, при *травматическихъ поврежденіяхъ*, при раздраженіи посторонними тѣлами, сочувственное накожное воспаленіе содержится почти такъ, какъ травматическая рожа (*erys. traumaticum*), распространяясь иногда на дальнее пространство и усиливаясь вообще отъ степени и силы внутренняго страданія, какъ напр: при отекѣ, ноготномъ воспаленіи (*paratitium*), головныхъ поврежденіяхъ и проч.

2. *При переносныхъ отложеніяхъ*, если отлагаемая масса жидкаго качества, то поражаемыя части скоро омертвѣаютъ и процессъ изъязвленія господствуетъ во всей силѣ. Въ семъ случаѣ, нерѣдко въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ въ совершенно здоровыхъ до того частяхъ, произраждается сочувственное покраснѣніе кожи, подъ коимъ ощущается зыблеціе и напрягающая боль, а по вскрытии такового мѣста можно извлечь цѣлыми кусками помертвѣлую клѣтчатую плеву. Когда же отлагаемая масса твердаго качества, то существо страждущихъ частей разбухаетъ, отвердѣваетъ и мало по малу теряетъ жизненность. Таковое измѣненіе развивается часто въ теченіи нѣсколькихъ недѣль, обнаруживаясь также сочувственою краснотою кожи и болицю, довольно обширною твердостію, ощущаемою въ глубинѣ и переходя либо въ медленное разрушеніе, либо въ помертвѣніе перерожденныхъ орга-

новъ, при чёмъ объятность части умножается, прежняя твердость дѣлается мягкою, твердоватою, оказывается зыбленіе и наступаетъ разрушеніе и дурногойное изъясненіе.

3. Тамъ, гдѣ оказывается особенное *некротическое перерожденіе клѣтчатой плевы* отъ атмосферическихъ вліяній, обнаруживаніе болѣзни бываетъ довольно странное. Въ какой либо части тѣла примѣчается не большое, впавшее, зыблющееся мѣсто, которое, по рассказу большаго, появилось вдругъ назадъ тому за день, или за два, послѣ совершенного здоровья. При лѣченіи его, по всѣмъ правиламъ искусства, открывается на другой день другое таковое же мѣсто, даже въ отдаленной части, также зыблющееся и къ вскрытию готовое, по томъ третіе, четвертое, пятое, всякий день новое, пока разрушеніе распространится на цѣлый членъ. На кожѣ появляется лоснящаяся, синеватая краснота съ отекомъ и пузырки. Если въ началѣ болѣзни кожа разрѣзается, то истекаетъ сперва водянистая жидкость, потомъ гной, а въ послѣдствіи блѣдоватая, жирообразная масса. Буде же страждущее мѣсто не вскрывается, то означенные пузырки, по прошествіи нѣкотораго времени, разрываются, испражняя блѣдно-цвѣтную, ихорозную жидкость; на кожѣ рождаются блѣдоватыя, или черноватыя мѣста, кои вскорѣ проваливаются, помертвѣвшая клѣтчатая плева выходитъ цѣлыми кусками; вся связь между кожею, клѣтчатою плевою и мышицами уничтожается, разрушеніе отъantonova огня болѣе и болѣе увеличивается, нагноеніе бываетъ весьма обильное и

дурное, отъ коего слѣдуетъ наконецъ совершенное истощеніе силь.

§ 103.

*Общее страданіе* обнаруживается при семъ горячкою. Мѣстной рвущей, бьющейся боли предшествуетъ болѣе или менѣе сильный огневичный ознобъ, послѣ нѣсколькихъ приступовъ коего появляется непрерывная горячка, которая съ распространениемъ страданія постепенно усиливается, рѣдко впрочемъ бываетъ чисто гастрического свойства, какъ при настоящей рожѣ, но всегда воспринимаетъ характеръ, соотвѣтствующій мѣстному страданію и потому при воспалительномъ напряженіи поражаемыхъ частей удерживаетъ то стеническое, то астеническое свойство, при усилившемся антоновоогненному разрушеніи тифозное, а при чрезмѣрно-обильномъ нагноеніи и изъязвленіи гектическое, сопровождаемое изнурительными потами и поносами.

§ 104.

*Причины* первого рода сего рожевиднаго воспаленія составляютъ многоразличныя подкожныя страданія к. т. воспаленіе, нагноеніе или антоновоогненное разрушение сухожильныхъ растяженій, связокъ, мышицъ, сухихъ жилъ и сухожильныхъ влагалищъ, клѣтчато-плевистыхъ слоевъ, обрѣтающихся между мышцами, надкостной плевы, самыхъ костей и мозгокостной плевы, вообще всякий невскрывшійся нарывъ, костоѣда и по-

мертвѣніе костей, всѣ травматическія поврежденія, напаche огнестрѣльныя и пр; а *втораго и третьаго рода*: особенное некротическое перерожденіе клѣтчатой плевы, коему подаютъ поводъ иногда переносныя отложенія какой либо болѣзнетворной матеріи, а иногда особенное состояніе атмосферы, напаche вліяніе суровой погоды и особенная смѣняемость температуры.

§ 105.

*Предсказаніе* здѣсь бываетъ различное и зависитъ преимущественно отъ причины, производящей внутреннее разстройство, отъ пространства, занимаемаго симъ послѣднимъ и отъ мѣстопребыванія онаго. Боспалительное состояніе означенныхъ подкожныхъ составовъ сопряжено съ меньшою опасностію, нежели нагноеніе и автомовоогненное разрушеніе оныхъ. Страданіе сухожильныхъ растяженій, мышицъ и перепончатыхъ составовъ допускаетъ лучшее предсказаніе, нежели страданіе синовіальныхъ оболочекъ, членосоставныхъ поверхностей, костей и надкостной плевы. Болѣе всего опасно некротическое перерожденіе клѣтчатаго вещества, особенно если оно есть слѣдствіе переноснаго отложенія, распространяется по всему члену, поражаетъ слабыхъ, истощенныхъ и худосочныхъ субъектовъ, или когда болѣзнь долго неизнается и смѣшивается съ настоящею рожею, отъ чего пропускается благопріятѣйшее время для лѣченія и дается случай болѣзни усиливаться и распространяться.

§ 106.

*Леченіе* сей болѣзни требуетъ особеннаго вниманія къ *причинамъ и периодамъ* оной. Вообще здѣсь преимущественно надлежитъ дѣйствовать противъ внутренняго подкожнаго страданія, сообразуясь съ его состояніемъ, периодомъ и свойствомъ; посему:

1. Если по точномъ изслѣдованіи откроется, что рожевидное воспаленіе на кожѣ зависитъ собственно отъ воспаленія глубже лежащихъ частей, при чёмъ неоказывается еще ни малѣйшаго зыбленія, то можетъ доставить помощь только противувоспалительный способъ к. т. пьявки, приложеніе льда, примочки изъ холодной воды, или раствора уксусокислого свинца, особенно втирание снаружи на страждущихъ частяхъ и въ окружности оныхъ сѣрой ртутной мази и примочка Руста (№ 105). При воспалительному напряженіи сухожильныхъ растяжений, вместо холодныхъ, можно употреблять теплые примочки и припарки изъ льняныхъ сѣмянъ, ромашковыхъ, или бузиновыхъ цвѣтовъ и, кромѣ втирания описанной ртутной мази, дѣлать теплые ванны и производить настѣчки, или разрѣзъ для уничтоженія чрезмѣрнаго напряженія.

Таковое мѣстное лѣченіе поддерживается соотвѣтствующими внутренними средствами. Если причиною болѣзни бываютъ переносы, то въ семь периодъ большую пользу доставляютъ слабительная изъ услащенной ртути. При гастрическомъ состояніи, обложенномъ языкѣ, отрыжкѣ и проч. предписываются въ самомъ началѣ

рвотныя, чрезъ что всегда ходъ болѣзни сокращается. Вообще даютъ противувоспалительныя средства, напиache слабительныя соли, назначается утонченная діета, употребленіе кисловатыхъ напитковъ и соблюденіе спокойствія больной части.

2. Когда же воспаленіе перейдетъ въ нагноеніе, примѣщается значительное скоплениe гноя и явственное зыблениe, то отъ разрѣшающихъ средствъ нечего ожидать, а должно стараться въ возможной скорости доставить гною свободное вытеченіе къ наружн., особенно, если здѣсь предполагаются переносы, страданіе существуетъ въ клѣтчатой плевѣ и на покровахъ оказывается особенно измѣненный цвѣтъ. Въ такомъ случаѣ разрушеніе глубоколежащихъ составовъ тѣла ежечастно увеличивается и опасность для члена и жизни возрастаетъ каждую минуту. Посему тотчасъ надлежитъ разрѣзать кожу, если возможно, по всему распространению зыблющагося мѣста и, введши въ здѣланное отверстіе палецъ, разширить по оному рану посредствомъ бистурея съ пуговкою по всѣмъ направленіямъ, гдѣ имѣеть мѣсто разрушеніе клѣтчатаго вещества, дабы удалить застоявшійся сукровичный гной и часто большіе куски совершенно помертвѣлой клѣтчатой плевы (*Rust, Dupuytren, Lawrence*).

Послѣ сего нужно заботиться о поддержкѣ натуры въ отдѣленіи разрушенныхъ частей, возстановленіи силъ и произведеніи хорошаго нагноенія. Внутрь даются здѣсь крѣпительныя средства съ минеральными кислотами (N 9.) и назначается питательная діета, а мѣстно употребляются безостановочно теплые припарки изъ

бузиновыхъ, или ромашковыхъ цветовъ, изъ набора разрѣшающихъ ароматныхъ травъ, либо смягчающихъ средствъ (*Chelius*), при чемъ болѣе всего нужно стараться о надлежащемъ вытеченіи гноя и употреблять приличную компрессивную повязку (*Velpeau*). Если при таковомъ лѣченіи нагноеніе постепенно уменьшается, отставшая кожа начинаетъ приставать и обнаруживаются мясные сосочки, то остающаяся рана можетъ быть пользуема по общимъ правиламъ (§ 56. 57).

3. При сильномъ распространеніи антоновоогненнаго разрушенія, даже на вѣнція части, дѣлаются въ продолженіи дня и ночи примочки изъ ароматныхъ травъ, сваренныхъ въ винѣ, назначаются ежедневно ароматныя ванны, страждущія мѣста смачиваются терпентиннымъ масломъ, или древеснымъ уксусомъ (*acetum pyrolignosum*) и присыпаются овлажненнымъ сими же веществами порошкомъ ромашки, угля, камфоры и смирны. Послѣ, когда помертвѣлая части отвалится, то язва перевязывается камфорнымъ виномъ, *unguento basilico cum tinctura myrrhae, ungv. de styrace (N 107) et cæt.* Дѣта въ семь періодъ должна быть питательная, состоящая изъ яицъ, мясныхъ бульоновъ и хорошаго вина. Совершенно здоровый воздухъ и удаленіе больного изъ госпитальной атмосферы, если возможно, необходимо нужны. Внутрь съ большою пользою дается хина, исландскій мохъ въ отварахъ съ какими нибудь пряными настойками.