

Воспаление ноготного состава пальцовъ.

(*Dactilitis*)

Син. Ногтофда, panaritium, paronychia, digitum.

§ 107.

Такъ называется воспаление ноготного состава пальцовъ, случающееся чаще на рукахъ, нежели на ногахъ, соединенное всегда съ мучительными болями и наклонностью переходить въ нагноение.

Хотя оно всегда сопряжено съ страданиемъ кожной системы, но первоначальнымъ местопребыванiemъ его бываютъ обрѣтающіяся подъ оною сухія жилы и надкостная плева и потому его раздѣляютъ на слѣдующіе четыре рода:

1. *Поверхностное кожное воспаление*, (panaritium cutaneum) составляетъ самую легчайшую степень болѣзни, имѣеть местопребываніе свое въ кожѣ и распространяется не далѣе лежащей подъ оною клѣтчатой плевы. Оно сходствуетъ съ рожевымъ страданиемъ и находится либо у корня ногтя, тамъ где онъ соединяется съ кожею, либо на сторонѣ ногтя. Въ сихъ местахъ сначала оказывается краснота кожи, къ коей присоединяются незначительныя бьющіяся боли и легкая опухоль, простирающаяся недалѣе первого состава. Воспаленіе скоро переходитъ въ выпотѣніе гноеборазной матеріи, которая находится непосредственно подъ кожею и придаетъ ей иногда синеватый видъ. Сильныя

боли рождаются тогда только, когда гной скопляется подъ ногтемъ.

2. *Воспаление сухожильное* (*panaritium tendinosum*) обрѣтается преимущественно въ сухожильныхъ влагалищахъ, или въ самыхъ сухихъ жилахъ мышицъ, сгибающихъ палецъ и потому оказывается всегда только на ладонной поверхности. Оно начинается сперва тупою, растягивающею болью въ какомъ либо пальцѣ, которая въ скоромъ времени усиливается до нетерпѣнія малѣйшаго прикосновенія и дѣлается бьющеюся, кожа краснѣетъ напрягается и лоснится; въ страждущемъ мѣстѣ ощущается сильный жаръ и твердость съ невозможностью сгибать палецъ. Опухоль въ самомъ пальцѣ, по причинѣ не уступчивости частей, бываетъ незначительна, но зато распространяется по всей руки до состава ея съ переднимъ плечомъ, а при усиленномъ страданіи восходить далѣе на предплечіе и простирается даже по течению большихъ сосудовъ къ подмышкамъ, поражая ихъ желѣзы. Въ семъ случаѣ обнаруживается нестерпимая боль, нарушающая сонъ и причиняющая чрезмѣрное огневичное возбужденіе не рѣдко съ бредомъ и корчами. При таковыхъ обстоятельствахъ въ скоромъ времени оказывается нагноеніе, но къ удивленію иногда не въ самомъ страждущемъ пальцѣ, а въ отдаленіи отъ него на ладонной поверхности руки, либо на предплечіи, гдѣ въ то время можно ощущать и зыбленіе.

3. *Воспаление надкостной плеевы* (*panaritium periostii*). Сей родъ воспаленія, въ началѣ, довольно сходствуетъ съ предыдущимъ, оказываясь также сильно бьющеюся болью въ страждущемъ пальцѣ, значительнымъ

огневичнымъ возбужденіемъ и небольшою распухлостію, но въ послѣдствіи отличается тѣмъ, что боль и опухоль при немъ не простираются далѣе состава руки. Если болѣзнь оставляется безъ вспомоществованія искусства, то рука, до вскрытия нарыва, распухаеть и на поверхности ея развивается рожевое воспаленіе. Страждущій палецъ дѣлается отекшимъ, черножелтымъ и при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ поражается даже антоно-вымъ огнемъ. Когда нарывъ вскроется, то зондъ, введенный въ отверстіе проникаеть до самой кости, которая въ такомъ разѣ обнажается отъ падкостной плевы, даже подвергается костоѣдѣ и омертвѣнію. Въ такомъ состояніи легко образуются углубленные парывы и свищевые ходы, проницающіе въ составъ пальца и рѣдко излечиваемые безъ потери одного состава, или всего пальца.

4. *Воспаленіе подноготное* (*panaritium sub ungve s. ad ungvem*), если произраѣдается отъ механическихъ на-силій, либо острыхъ жидкостей, то оказывается такъ, какъ первый родъ ноготнаго воспаленія. Чаще однакожъ оно образуется при вростаніи ногтя внутрь, особенно на ножныхъ пальцахъ, въ какомъ случаѣ раздраженіе краевъ ногтя производить боль и воспаленіе, соединенное сперва съ отдѣленіемъ серозной жидкости, засыхающей въ твердую массу, а потомъ съ нагноеніемъ и произроженіемъ мясныхъ паразеній, выступающихъ съ исподи ногтя въ видѣ дикаго мяса.

§ 108.

Причины. Болѣзнь сія господствуетъ не рѣдко эпи-демически, напаче весною и осенью, раждается также

спорадически при ломкотномъ и составоломномъ расположениі, при лишаяхъ и золотухѣ, венерической болѣзни и прекратившемся не во время мѣсячномъ очищенія. Чаще всего однакожъ действуютъ на произрожденіе оной мѣстныя причины, къ коимъ относятся: отрываніе отдѣляющейся кожи близъ ногтей (*reduvia*), ушибы, проколы иглою, раны, трещины на пальцахъ, особенно если въ оныхъ скапливается какая либо нечистота, занозы, попадающія подъ ноготь, зараженіе, мгновенное смыченіе жара и холода, работы, производимыя въ водѣ, вростаніе ногтя, слишкомъ короткое обрѣзываніе его, давленіе тѣсныхъ башмаковъ, или сапоговъ и проч.

§ 109.

Предсказаниe здѣсь бываетъ различно, смотря по роду и степени болѣзни. Воспаленіе поверхностное, накожное проходитъ въ короткое время, не сопровождающееся столь сильными болями, а сухожильное и надкостноплевистое столь мучительны и зловредны, что угрожаютъ иногда опасностю жизни, сперва чрезъ воспаленіе, а потомъ чрезъ нагноеніе и изнуреніе. При нихъ образуются нерѣдко, наппаче отъ несовмѣстнаго лѣченія, гнойные скопленія и полыя язвы, простирающіяся до самаго локтя и даже до подмышекъ съ уродливыми перерожденіями мягкихъ частей, kostоѣдою и помертвѣніемъ костей. Воспаленіе подноготное бываетъ болѣе мучительно и упорно, нежели опасно.

§ 110.

Леченіе въ самомъ началѣ болѣзни состоить въ предотвращеніи дальнѣйшаго развитія воспаленія. Въ семъ

отношениі особеннаго вниманія заслуживають причины, производящія болѣзнь. При уколахъ пальца нужно смотрѣть, неосталось ли въ ранѣ какое либо постороннее тѣло, которое надлежитъ тотчасъ извлечь, для чего потребенъ иногда небольшой разрѣзъ. Если же они причиняются иглою, булавкою, перочиннымъ ножемъ или другимъ подобнымъ инструментомъ, то никогда недолжно тотчасъ пріостанавливать крови, по напротивъ спосѣществовать вытеченію онай умѣреннымъ надавливаніемъ.

Самое опаснѣйшее воспаленіе сего рода случается при вскрытияхъ мертвыхъ тѣлъ,—и въ такомъ разѣ, для предупрежденія дурныхъ послѣдствій, надлежитъ, сколько возможно болѣе выжимать крови изъ здѣлланной раны, а потомъ вымывать оную растворомъ мыла, или ёдкаго поташа, хлоровой извести, разжиженною сѣрою кислотою и т. д. Тамъ, где подозрѣвается напоеніе раны животнымъ ядомъ, развивающимся въ тлѣющихъ трупахъ, гораздо лучше содержать рану въ продолженіи нѣкотораго времени въ нагноеніи.

По удаленіи всѣхъ причинъ, если боль начинаетъ возрастать, и можно опасаться образованія ноготнаго воспаленія, употребляются съ большою пользою тепловатыя и даже наркотическія ванны для руки, или припарки изъ мякиша бѣлаго хлѣба и шафрана.

§ 111.

При развиившейся уже болѣзни лѣченіе должно располагать по различнымъ степенямъ и мѣстопрѣбыванію воспаленія.

а) *Поверхностное кожное воспаление* въ большей части случаетъ очень скоро переходить въ нагноеніе и потому разрѣшеніе посредствомъ припущенія пьявокъ, втиранія сѣрой ртутной мази до предплечія и купанія руки въ тепловатой ваниѣ рѣдко удается, чаще же нужно споспѣшствовать образованію гноя теплыми припарками изъ льняныхъ сѣмянъ (N 48), макиша бѣлаго хлѣба и молока и, коль скоро обнаружится гноиное скопленіе въ какомъ либо мѣстѣ, то оное надлежитъ вскрыть, гнои испразнить и дѣлать перевязку простою восковою мазью, или продолжать прежнія смягчающія припарки. Если гной скопляется подъ ногтемъ, то сперва надлежитъ его соскоблить до возможной тонкости и потомъ уже проколоть остроконечiemъ bistурея.

б) *При сухожильномъ воспаленіи* необходимо нужно предпринимать разрѣшеніе, дабы предупредить дурный послѣдствія нагноенія. По сему въ самомъ начальѣ уже припускаются нѣсколько разъ пьявки къ пальцу, втирается сѣрая ртутная мазь, не только на страждущемъ пальцѣ, но и на предплечіи и выше онаго и для всей руки дѣлается почаше тепловатая ванна, а если существуютъ признаки огневичнаго возбужденія, то непремѣнно назначается кровопусканіе изъ руки и строгая постная диета, употребленіе противувоспалительныхъ лекарствъ, слабительныхъ изъ среднихъ солей (N 13. 14. 15) и проч. Когда же, не смотря на это, припадки продолжаются въ усиленной степени долѣе трехъ дней, то лучше, недожидалось зыбленія, здѣлать глубокій разрѣзъ, проникающій до мыштопреѣбыванія болѣзни, ибо откладываніе онаго до явственныхъ признаковъ зыбленія мо-

жеть привести болѣзнь въ упорное состояніе, подвергнувъ совершенному разрушенію сухую жилу и окружающія ея части. Сверхъ того, хотя бы при семъ и не находилось гноя, но разрѣзъ доставляетъ величайшее облегченіе тѣмъ, что посредствомъ онаго испражняется кровь и уничтожается болѣзненное напряженіе. Впрочемъ, гдѣ оказывается зыбленіе, тамъ должно предпринимать разрѣзъ безъ всякаго отлагательства, а послѣ онаго прикладывать теплые смягчающія пріпарки и дѣлать прилежно тепловатыя ванны для руки. Втираніе сѣрой ртутной мази и въ семъ періодѣ болѣзни доставляетъ весьма хорошую услугу. Обыкновеніе покрывать обнаженную сухую жилу корпіею, обмоченною въ терпентинное масло, или намазанную Арцеевымъ бальзамомъ, почитается нынѣ болѣе вреднымъ, нежели полезнымъ. Если она значительно разстроена нагноеніемъ, то можно извлекать нѣкоторыя волокны ея порознь, или вырѣзывать онья по слоямъ. Когда, при означенномъ лѣченіи, распухлость частей и нагноеніе уменьшается, но напреплечіи, или въ запястьи руки остаются еще гнойные ходы, то ихъ можно уничтожить посредствомъ компрессивной повязки, а въ неблагопріятныхъ случаяхъ надлежитъ прибѣгать къ разширенію таковыхъ ходовъ. Руки никогда не должно держать въ отвѣстномъ положеніи, но поддерживать онью шарфомъ (*mitella*).

с) *Лѣченіе надкостноплевистаго воспаленія* имѣть съ предыдущимъ нѣкоторое сходство. Въ первомъ періодѣ, гдѣ существуетъ воспалительное состояніе, сопровождаемое нарочитою горячкою, кромѣ пьявокъ къ страждущему мѣсту, втиранія ртутной мази и ручныхъ

ваниъ, нужны общія кровопусканія и употребленіе противувоспалительныхъ средствъ (N 61). Если же несмотря на это, жестокія боли и чрезмѣрное напряженіе продолжаются, то прежде появленія признаковъ нагноенія, для предупрежденія большихъ разстройствъ, нужно тотчасъ сдѣлать разрѣзъ, проникающій до самой кости, избирая для того такое мѣсто, где наиболѣе ощущается боль и употребляя послѣ теплыхъ ручныхъ ванны, а при дурномъ нагноеніи обмыванія изъ настоя ромашки, изъ щелока и пр. смягчающія припарки и втирания съ ртутной мази. Когда же разрѣзъ пренебрегается, или откладывается до произвольного вскрытия, то болѣзнь воспринимаетъ весьма дурной исходъ. Въ такомъ случаѣ большую частію рождается уже костоѣда и помертвѣніе кости, которая чрезвычайно затрудняютъ лѣченіе и не рѣдко требуютъ отъятія цѣлаго состава, или пальца.

d) *Подноготное воспаленіе*, если въ началѣ не будетъ правильнымъ образомъ истреблено, то можетъ продолжаться несолько лѣтъ и быть источникомъ многихъ страданій. Въ тѣхъ случаяхъ, где оно происходитъ отъ ущемленія ногтя, или попавшей подъ ноготь какой либо остроты, должно поступать такъ, какъ предложено при лѣченіи накожнаго воспаленія. Когда же причиной его вростаніе ногтя внутрь, то надлежитъ либо выправить ноготь, либо вросшую часть со всѣмъ вырвать. Для первой цѣли въ легкой степени болѣзни подкладывается съ большою пользою подъ край вросшаго ногтя свинцовая пластинка, укрѣпляемая сверху линкимъ пластиремъ (*Richerand*), а для второй цѣли врос-

шая часть ногтя отрѣзывается острыми ножницами и извлекается щипцами (*Dupuytren*).

Кровавый вередъ.

(*Furunculus.*)

Син. Чирей; *abscessus nucleatus*; *dothien*; *pseudophlegmone Rustii*.

§ 112.

Вередъ или чирей есть темнокрасная, весьма болящая, возвышенная, твердая воспалительная опухоль, оказывающаяся на разныхъ мѣстахъ общихъ покрововъ тѣла, величиною отъ чечевичнаго зерна до куриного яйца и переходящая всегда въ нагноеніе.

§ 113.

Явленія. Послѣ растягивающихъ, или колющиxъ болей въ какомъ либо мѣстѣ, часто и безъ оныхъ, появляется вдругъ узелокъ въ кожѣ, который въ скоромъ времени преобразуется въ опухоль, окруженную твердыми краями. Опухоль сія причиняетъ жгучую, бьющуюся, чрезвычайно обезспокоивающую боль, отъ коей страждущій теряетъ сонъ и подвергается иногда воспалительной горячкѣ и даже судорогамъ, особенно при многихъ вередахъ, оказывающихся разомъ. По проше-

ствій п'есколькихъ дній опухоль сія начинаеть смягчаться и оказывать зыбленіе, болѣе и болѣе завоcтряется, представляя въ серединѣ бѣловатый или желтоватый пузырекъ и наконецъ вскрывается, при чёмъ истекаетъ сперва кровянистая, потомъ водянисто-желтая жидкость, а наконецъ выходить т. наз. стержень (*nucleus rugulatus*) и съ тѣмъ мгновенно прекращаются всѣ боли. Если же воспаленіе исчезаетъ прежде, нежели вытѣснится стержень, то рождается отвердѣніе (*fur. induratus*), которое часто противостоитъ самымъ дѣйствительнымъ средствамъ, пока снова не воспалится и не разрушится на гноепіемъ.

§ 114.

У худосочныхъ особъ, страдавшихъ сильно оспою, венерическою болѣзнию и золотухою, либо употреблявшихъ много ртути, кровавый вередъ воспринимаетъ болѣе хроническій видъ (*furunculus chronicus*), и въ то время появляется чаще всего на ногахъ, имѣетъ гораздо слабѣйшіе воспалительные припадки и переходитъ въ нагноеніе по прошествіи трехъ, или четырехъ недѣль. Нерѣдко таковые вереды оказываются разомъ очень многою (*cachexia furunculosa*) и соединены бывають съ лишайною сыпью, рождающеюся въ окружности опухоли.

§ 115.

Причины. Образованіе вередовъ зависитъ почти всегда отъ какой нибудь внутренней причины, которая можетъ состоять въ полносочіи, свойственномъ юноше-

скому возрасту, въ особенномъ полнокровіи кожи, при существующей неопрятности и нарушенномъ испареніи, въ составоломномъ, липшайномъ, золотушномъ расположениі, въ беспорядочномъ отправлениі брюшныхъ внутренностей и мѣсячнаго очищенія. Вередъ чаше случается весною, иногда бываетъ передомомъ другихъ болѣзней и, повидимому, можетъ распространяться на другихъ особъ чрезъ зараженіе. Нарушенное отправление кожи, чрезъ простуду весьма часто подаетъ поводъ къ произрожденію вереда (*Ritter*) и потому при скорой перемѣнѣ температуры въ атмосферѣ опь бываетъ иногда господствующею болѣзнию.

Сущность кроваваго вереда состоитъ въ накожномъ воспаленіи, поражающемъ преимущественно сальныя пузырчатыя желѣзки кожи (*Langenbeck*).

§ 116.

Предсказаніе зависитъ здѣсь отъ мѣстопребыванія, величины, свойства и сопряженій вереда. Оно можетъ быть благопріятно тамъ, где вередъ одинъ, находится въ безопаснѣи мѣсть и случается у здоровыхъ людей. Весьма большия вереды, рождающіеся на очень чувствительныхъ мѣстахъ, особенно въ большомъ числѣ вдругъ, у раздражительныхъ, слабыхъ людей, или у дѣтей, могутъ иногда возбуждать некоторое сомнѣніе въ разсужденіи предсказанія. Худо также, если вередъ, при существующемъ худосочіи, переходитъ въ злокачественную язву, дѣлается антоновоогненнымъ, или безпре-

станию обнаруживается вновь, какъ рефлексъ какого либо внутренняго важнаго страданія.

§ 117.

Лѣченіе сей болѣзни въ простыхъ случаяхъ бываетъ только мѣстное; общее же назначается при запачтливомъ болѣзпенномъ расположениіи къ тому, при частыхъ возвратахъ, или при сочувственномъ содержаніи болѣзни.

Когда, по особыннымъ какимъ либо причинамъ, нужно предпринимать *разрѣшеніе*, то для сего назначаются рвотныя и слабительныя, тошнотворное лѣченіе, кровоотвлеченія, прикладываніе кровососной банки въ самомъ началѣ на выдающійся передной узелокъ (*Ritter*), холодныя примочки и проч. Въ атоническомъ состояніи болѣзни предписываются для сего мази, содержащія въ себѣ камфору, примочки изъ разрѣшающихъ травъ съ алкоголемъ и нашатыремъ, либо разрѣшающіе пластыри, какъ *empl. conii maculati*, *empl. hydrargyri*, *empl. saponatum etc.*

Для споспѣшествованія же *нагноенію*, въ которое впередъ, по особенной наклонности, всегда переходить, употребляется влажная теплота въ формѣ теплыхъ смягчающихъ припарокъ (№ 48), кои для укрошенія болѣй смѣшиваются иногда съ наркотическими травами, каковы болиголовъ, бѣлена, маковая головки и пр. При совершенномъ созрѣніи, для ускоренія прорыва, если дозволяетъ раздражительность, можно прикладывать припарку изъ печенаго лука, а на почь лепешку изъ меду

и ржаной муки. Когда произвольное вскрытие вереда слишкомъ замедляется, то можно здѣлать проколъ ланцетомъ, однакожъ не прежде, какъ вся твердость, или покрайней мѣрѣ большая часть оной, размягчится; въ противномъ случаѣ произойдетъ жестокая боль и припадки могутъ усиливаться. По воспослѣдовавшемъ вскрытии вереда надобно заботиться объ удаленіи стержня, способствуя выхожденію его умѣреннымъ давленіемъ и смягченіемъ существующей еще твердости вереда. Посему теплые припарки и по вскрытии нарява должно продолжать до выхожденія стержня и до совершилаго смягченія остающейся твердости, замѣняя ихъ въ ночное время какимъ либо смягчающимъ, или раздражающимъ пластыремъ, какъ напр. *empl. meliloti*, *empl. mucilaginosum* *Ph. Fen.* *empl. resinosum* и проч.

§ 118.

Поелику общее страданіе зависитъ здѣсь непосредственно отъ мѣстнаго раздраженія, обрѣтающагося въ вередѣ, то общее или внутреннее леченіе оказываетъ въ такомъ случаѣ только ограниченное, паллативное дѣйствіе. Посему, если, при значительномъ вередѣ, на пятый или шестой день оказывается сильная горячка съ жестокими болями, то вместо безупрѣчного употребленія селитры, виннокаменной или синильной кислоты, лавровишневой воды, вытяжки бѣлены и проч., лучше слѣдовать совету *Дюлюиутрена* и разрѣзывать вередь крестообразно, дабы воспаленные части освободить отъ ущемленія и тѣмъ уничтожить зависящее отъ того

общее раздражение. Послѣ сего должно прикладывать смягчающія припарки и стараться о выхожденіи стержня.

§ 119.

Хронический вередъ требуетъ при лѣченіи тѣхъ же правилъ, какъ и предыдущій, только гораздо сильнѣйшихъ раздражающихъ средствъ, способствующихъ нагноенію, каковы суть лепешки изъ кислого ржанаго тѣста, луку и перцу, припарки изъ чернаго мыла, горчицы и печенаго луку, (N 106) *empl. diachylon comp. cum empl. canthar. ordinario*, горячіе водяные пары, (*Pearson*), а въ особенныхъ случаяхъ даже вскрытие посредствомъ ножа и приложеніе на крестообразный разрѣзъ ѳдкаго поташа. Если таковые вереды зависятъ отъ худосочнаго какого либо расположенія и наступаютъ повторительно, то внутрь съ большимъ успѣхомъ даются *pulvis Plumeri*, (N 133.) *aethiops antimonialis* (*Rust*), *guajacum*, *sulphur*, *solan. dulcamara*, *species guajaci* и вмѣстѣ съ тѣмъ назначаются ванны, ограниченная диета, частое употребленіе слабительныхъ, кровососныхъ банки, приставляемыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, искусственные язвы и проч.

Антоновоогненный вередъ.

(*Anthrax.*)

Syn. Carbunculus, furunculus gangraenosus; abscessus gangraenosus; anthracosis, ignis persicus; огневикъ, карбункуль.

§ 120.

Такъ называется подобная кровавому вереду воспалительная опухоль общихъ покрововъ, отличающаяся отъ

онаго тѣмъ, что всегда скорѣе или медленнѣе переходитъ въ антоновъ огонь.

§ 121.

Явленія. Кожа сперва дѣлается красною, лоснящеюся и мало по малу воспринимаетъ темнокрасный, пурпурный или фиолетовый цвѣтъ; въ покраснѣвшемъ мѣстѣ ощущается твердость, простирающаяся довольно углублено внутрь, оказываются сильныя жгучія боли, вообщѣ образуется ограниченная твердая, дурноцвѣтная, жгучая опухоль, на верхушкѣ коей появляется одинъ или иѣсколько антоновоогненныхъ пузырей, наполненныхъ сукровицею; омертвѣвающая подъ оною кожа дѣлается черною или синеватою, прорывается и чрезъ произшедшія въ оной отверстія изливается кровянистый, жидкій, дурнокачественный гной. Въ слѣдствіе сего на поверхности образуются часто многія, постепенно увеличивающіяся проѣдины, чрезъ кои, при кровянистомъ, худокачественномъ нагноеніи, выходитъ обыкновенно по-мертвѣвшая кѣлѣтчая плева въ клочковатыхъ массахъ. Омертвѣніе здѣсь оказывается не столько въ кожѣ, какъ въ лежащей подъ нею кѣлѣтчай плевѣ и нещадить даже мышицы, сухихъ жилья, и сухожильныхъ растяженій. Въ сихъ частяхъ обнаруживается нерѣдко сильное антоновоогненное разрушеніе прежде, нежели окажутся признаки онаго на поверхности.

Величина антоновоогненнаго верeda различна; иногда онъ бываетъ въ ладонь, а иногда гораздо болѣе. Обык-

повенное мѣсто произражденія его составляютъ затылокъ и ягодицы. Общее страданіе оказывается при семъ болѣе или менѣе сильною астеническою, либо тифозною горячкою, смотря по распространенію антонова огня и упадку силъ, происходящему отъ того.

§ 122.

Причины. Наибольшее расположение къ сей болѣзни имѣютъ полносочинные, большую частію пожилые люди, подвергающіеся часто лишайнымъ и чесоточнымъ сыпямъ, также нечистотамъ въ первыхъ путяхъ, употребляющіе нездоровую пищу и несодержащіе кожу въ надлежащей чистотѣ.

При таковыхъ обстоятельствахъ часто мѣстное какое либо раздраженіе, напр. отъ горчичника, укушенія ядовитыхъ насекомыхъ и пр. можетъ служить поводомъ къ обнаруживанію сего вереда. Во многихъ случаяхъ болѣзнь сія бываетъ слѣдствиемъ переноса какого либо опустошительного вещества, или горячки, найпаче желудочно-желчной и гнилой.

§ 123.

Предсказаніе. Опасность карбункула зависитъ отъ его величины, мѣстопребыванія, присутствія въ одно время многихъ таковыхъ вередовъ, отъ сложенія стражущаго и общаго страданія, соединенного съ карбункуломъ. Впрочемъ предсказаніе здѣсь почти всегда бы-

ваетъ дуриое, ибо карбункулъ очень часто оканчивается смертью. Въ рѣдкихъ случаяхъ помертвѣлое отдѣляется и обнаруживается доброкачественное нагноеніе, которымъ вознаграждается потеря существа.

§ 124.

Лихеніе. Хотя болѣзнь сія, при первомъ ея произошденіи, бываетъ воспалительного рода, однакожъ животная экономія при опой находится въ такомъ содер-жаніи, что воспаленіе скоро переходитъ въ антоновъ огонь и потому строгое противувоспалительное лѣченіе здесь неумѣстно, но большею частію потребно бываетъ потогонительное, испражненію кишечнаго канала спо-собствующее и противугнилостное, сообразно свойству карбункула. Если существуютъ гастрические припадки, то лѣченіе весьма полезно начинать рвотнымъ, не опасаясь чрезъ то нисколько умноженія всеобщей слабости, потомъ предписывать употребленіе разжиженныхъ ми-неральныхъ кислотъ (N 57), особенно acidi muriatici oxy-geenati (N 64.). Когда же силы больнаго упадаютъ, что обыкновенно случается при увеличиваніи антоновоогнен-наго страданія, то надлежитъ употреблять крѣпитель-ныя и возбуждающія средства к. т. хину (N 9), вино, камфору (N 21.) маунъ, змѣевикъ (N 22, 25) и проч.

Мѣстное лѣченіе состоить въ благовременномъ, до-вольно глубокомъ, крестообразномъ разрѣзѣ для успѣш-нѣйшаго дѣйствія на антоновоогненное разрушеніе раз-дражающихъ и противугнилостныхъ средствъ. На сей

конецъ рапа, по удаленіи помертвѣлой клѣтчатой пле-
вы, перевязывается раздражающими, сваривающими ма-
зями к. т. ung. elemi, ung. styracis и пр. прижигается
бутиро antimonii, kali caustico и покрывается сверху смяг-
чающею припаркою. Для возбужденія надлежащаго вос-
паленія и произведенія лучшаго нагноенія можно по-
лость раны выполнить корпіею, влиять въ оную aethe-
reoleum terebinthinae, acidum pyro-lignosum, liquor natri
chlorinici, acetum camphoratum, decoctum cinchoniae cum
tinctura myrrhae. Прочее лѣченіе производится по прави-
ламъ, изложеннымъ при антоновомъ огнѣ (§ 76—81).—

Злокачественный волдырь.

(*Pustula maligna.*)

Cin. *Pustula gangraenescens*, *carbunculus contagiosus*;
bouton malin, czarna krosta, сибирская язва.

§ 125.

Такъ называется особенное рожевидное воспаленіе ко-
жи и клѣтчатой плевы, переходящее въ антоновъ огонь
и раждающееся у людей отъ зараженія животнымъ ядомъ,
развивающимся во время падежа лошадей, или отрыгаю-
щихъ жвачку животныхъ.

§ 126.

Явленія. Сперва образуется въ какомъ нибудь мѣстѣ, большою частію на лицѣ, шеѣ, затылкѣ, на рукахъ и проч. незначительный, величиною въ просяное зерно пузирекъ или волдырекъ, который дѣлается известнымъ больному по чувству зуда, призывающаго къ чесанію. Въ сіе время и до того общее здоровье, въ рѣдкихъ случаяхъ разстраивается, по крайней мѣрѣ никогда не оказывается такихъ przypadковъ, изъ коихъ можно бы было предполагать наступленіе трудной болѣзни. Если пузирекъ таковый, появляющійся почти всегда одинъ, раздирается или разчесывается, то изъ онаго вытекаетъ прозрачная лимонножелтая, либо красноватая пасока и въ то время окружность его дѣлается твердою и распухаетъ. Послѣ сего появляется воспалительная рожевидная краснота, умножаясь постепенно отъ чесанія больнаго, который все еще остается въ томъ предубѣжденіи, что его укусило ядовитое насекомое. Когда же пузирекъ сей не разчесывается и развитіе его не нарушается, то онъ, постепенно увеличиваясь, измѣняетъ свой цветъ и дѣлается темнокраснымъ, изъ сѣра-синимъ и черноватымъ. По мѣрѣ того, какъ твердость въ смежной окружности умножается, верхняя кожица около первоначальнаго волдырька поднимается въ пузыри, кои сливаются вмѣстѣ и испражняютъ въ большомъ количествѣ вышеозначенную пасоку. По удаленіи верхней кожицы дно сихъ пузирей представляется чернымъ,antonовоогненнымъ. Въ сіе время образуется сухая, почти мумій

подобная, пѣсколько впалая антоновоогненная корка, пристающая плотно къ лежащимъ подъ нею частямъ, а вокругъ оной рождается опухоль, распространяющаяся часто на значительное пространство и переходящая въ скоромъ времени, при появлениі на ней пузырей, въ сферу антонова огня, который въ благопріятныхъ случаяхъ оканчивается образованіемъ пограничнаго воспаленія, а въ неблагопріятныхъ, распространяясь безпрестанно вглубь, наносить смерть.

Вотъ обыкновенное обнаруживаніе и теченіе *мѣстныхъ явленій* сей болѣзни, которыя впрочемъ безконечно могутъ измѣняться отъ силы заразы, мѣста и рода зараженія, отъ особеннаго состоянія зараженнаго субъекта. Замѣчательныя разности оной суть: 1) появленіе сперва, вмѣсто волдырка, смуглокраснаго, синяго, невозвышенаго надъ кожею пятна, величиною съ чечевичное зерно (*pustule maligne deprimée*); 2) окончаніе болѣзни однимъ антоновоогненнымъ пораженіемъ страждущихъ мѣсть кожи безъ послѣдственныхъ общихъ пораженій (*czarna krosta*); 3) распуханіе и покраснѣніе близлежащихъ лимфатическихъ сосудовъ и желѣзъ.

§ 127.

Что касается до *общаго страданія*, то при самомъ началѣ болѣзни, оно не обнаруживается. Вообще время появленія его и умноженія у разныхъ субъектовъ оказывается различно и зависитъ также отъ мѣстопребыванія наружнаго страданія, отъ сложенія больнаго и весьма многихъ случайныхъ содержаній. Иногда, хотя рѣдко

больной при начальномъ произрожденіи пузырька, въ первую ночь уже дѣлается беспокойнымъ и угрюмымъ, жалуется на усталость въ членахъ, вообще поражается припадками, возвѣщающими наступленіе горячки. На второй, третій и четвертый день, особенно къ вечеру, страданія сія явственno умножаются и къ онимъ присоединяется совершиная безсонница, головокруженіе и томпнота, наклонность къ рвотѣ при обложеніи языкѣ, тупая головная боль, тоска и обмороки, жаръ и сухость кожи, измѣненное жилобіеніе, скучное отдѣленіе мочи и испражненій низа, сильная жажда, особенно къ кислымъ напиткамъ и пр. Съ распространениемъ мѣстнаго антонова огня и, вѣроятно, съ умноженнымъ всасываніемъ лимфатическою системою прилипчиваго начала, означенные явленія болѣе и болѣе усиливаются, обмороки наступаютъ чаще и къ онимъ, раньше или позже, присоединяется икота, бредъ, сонливость и всѣ припадки первной, или гнилой горячки, въ послѣднемъ періодѣ коей больной умираетъ. Таковой несчастный исходъ случается обыкновенно около 7-го дня, однакожъ болѣзнь не всегда достигаетъ такой степени силы и не всегда проходитъ и оканчивается такимъ образомъ. Часто въ продолженіи оной не замѣчается никакихъ опасныхъ припадковъ, а иногда больной умираетъ, сверхъ всякаго чаинія, въ первыхъ дняхъ.

§ 128.

Причины. Болѣзнь сія, по всему вѣроятію, должна зависѣть отъ прилипчивости мѣстно дѣйствующей, какъ

доказываютъ: 1. несомнѣнное мѣстное зараженіе во всякомъ случаѣ, гдѣ пристаетъ къ тѣлу и всасывается въ оное заразительный ядъ животныхъ, страждающихъ карбункулознымъ тифомъ (*sphacelus lichenis*), или недавно павшихъ отъ онаго. 2. Частѣйшее существованіе сей болѣзни во время свирѣпствованія такового тифа между домашними животными. 3. Обнаруживаніе оной только на непокрываемыхъ частяхъ тѣла к. т. на лицѣ, плеѳѣ, груди, на рукахъ, либо на частяхъ, легко доступныхъ и болѣе подверженныхъ виѣшнимъ вліяніямъ. 4. Мгновенное пораженіе болѣзнию совершенно здоровыхъ людей и таковыхъ же мѣстъ кожи.

Хотя въ наибольшей части случаевъ зараженіе проходитъ чрезъ животныя вещества к. т. чрезъ мясо, кровь, гной, мочу, шерсть, молоко, слону, шкуры и рога карбункулозныхъ животныхъ, по крайней мѣрѣ люди, поражаемые злокачественнымъ волдыремъ, большою частью суть такие, кои наиболѣе приходятъ въ соприкосновеніе съ домашними животными или съ означенными веществами, какъ поселяне, коповалы, ветеринарные врачи, живодёры, мясники, пастухи, скорняки, кожевники и пр.; однако же нельзя недопустить, что таковая мѣстная болѣзнь можетъ произраjdаться и отъ одной заразы, распространенной въ атмосфѣрѣ, при господствующемъ эпизоотически карбункулозномъ тифѣ, какъ подтверждаютъ новѣйшія наблюденія *Бейля, Ларрея, Гофманна и Шредера*. Что некоторые насекомыя могутъ жаломъ, или сосательнымъ рѣльцомъ своимъ переносить ядъ сего рода на другихъ животныхъ и на людей, то это не представляетъ, повидимому, ни-

какой возможности. На этомъ-то должно основываться и предположеніе *furiae infernalis*.

§ 129.

Предсказание зависитъ здѣсь наиболѣе отъ мѣсто-пребыванія и силы болѣзни, которая, какъ выше упомянуто, оказывается различно, смотря по болѣшей или меньшей остротѣ яда и по существующей восприимчивости къ оному. Если злокачественный волдырь произра�дается на головѣ и туловищѣ, то опасность всегда бываетъ большая, а еще болѣе, если онъ появляется на лицѣ, или на шеѣ. Весьма опасно также, когда ядъ при сдираніи шкуръ, или при убиваніи больныхъ животныхъ попадаетъ въ свѣжую рану человѣка. Въ такомъ случаѣ онъ въ скоромъ времени и въ большомъ количествѣ всасывается внутрь и производить очень сильное общее страданіе.

§ 130.

Леченіе сей болѣзни основывается на *предотвращеніи и уничтоженіи* оной. Для первого напрѣнія необходимо запретить всякое сообщеніе съ животными, пораженными карбуциулознымъ тифомъ и со всеми веществами, получаемыми отъ оныхъ, отдѣлять тщательно заболѣвающихъ животныхъ отъ здоровыхъ, не запирая ихъ одинакожъ въ тѣсные сараи. Средства, служащія для разбиванія или неутриализированія заразы, могутъ быть назначаемы только для здоровыхъ жи-

вотныхъ; впрочемъ они мало приносятъ пользы, потому что действуютъ на весьма ограниченный кругъ атмосферы. Сюда принадлежатъ уксусные селитрокислые и солянокислые пары по способу *Гютонъ Морво*. Гораздо удобнѣе и вѣрнѣе для сего можно употреблять окропленіе животныхъ растворомъ хлоровой извести, который можетъ также служить съ пользою и тамъ, гдѣ обѣзываются подозрительныя животныя вещества к. т. шерсть, кожа и проч.

§ 131.

Что касается до уничтоженія злокачественнаго волдыря, то для этого имѣются слѣдующія два показанія.

1. Совершенное истребленіе зараженнаго мѣста механическимъ, или химическимъ средствомъ, если это возможно еще, и предвидится надежда, что симъ путемъ совершенно будетъ уничтожена зараза и продуктъ оной прежде, нежели она воспримется внутрь.

2. Когда же показаніе сіе не возможно выполнить, то надлежитъ поступать такъ, чтобы въ страждущемъ мѣстѣ произвести противудѣйственное воспаленіе и тѣмъ положить границы распространяющемся антонову огню.

Разрѣзываніе волдыря острымъ орудіемъ можетъ быть предпринимаемо въ самомъ началѣ болѣзни, прежде нежели окажется антоповоогненное разрушеніе. Вообще оно должно быть производимо такъ, чтобы остающаяся послѣ того рана была совершенно чистая и не заключала бы въ себѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ болѣзни, причиняемой заразою. По сему-то операциѣ сія не всегда бываетъ успѣшна, даже можетъ вредить, производя но-

вое углубленнѣйшее раненіе и доставляя чрезъ то заразительному веществу возможность непосредственно привѣшиваться къ крови. Такъ должно судить и о насечкахъ (*scarificationes*), кои могутъ дѣлать пользу только въ такихъ случаяхъ, гдѣ фармацевтическія средства должны быть приведены въ ближайшее соприкосновеніе со страждущими, но не пораженными еще антоновыемъ огнемъ частями. Итакъ гораздо большаго успѣха можно ожидать отъ химическихъ средствъ, кои вообще благотворно дѣйствуютъ здѣсь тѣмъ, что возбуждаютъ периферическое воспаленіе. Къ таковымъ средствамъ принадлежатъ ёдкія и противугнилостныя, какъ *potassa fusa*, *ammonia liquida*, *nitras argenti fusus*, *liquor stibii muratici*, *acidum sulphuricum concentratum*, *acidum руго lignosum*, *chlorinicum* и проч. *Рустъ* въ началѣ болѣзни отдаетъ преимущество щелочнымъ средствамъ, какъ *potassa fusa*, *ammonia liquida*, потому что они имѣютъ наибольшую способность разлагать животные яды; въ дальнѣйшемъ же теченіи болѣзни, гдѣ нужно дѣйствовать болѣе противугнилостно, онъ предпочитается употребленіе древеснаго уксуса (*acid. pyrolign.*) и хлора. Вообще при уничтоженіи сей болѣзни химическимъ путемъ лучше и вѣрнѣе поступать слѣдующимъ образомъ. Въ самомъ началѣ болѣзни, при первомъ появлѣніи пузырька, надлежитъ тотчасъ вскрыть его и, уничтоживъ содержащуюся въ немъ влагу досуха, вложить туда соразмѣрной величины свертокъ кориціи, овлажненный какимънибудь означеннымъ ёдкимъ средствомъ, а еще лучше кусочекъ ёдкаго поташа. Въ скоромъ времени образуется на семъ мѣстѣ струпъ, который долженъ быть перевя-

зываємо сваривающею или смягчающею мазью до отпаденія онаго. Если симъ антоновоогненное разрушеніе совершенно не уничтожится, то по спаденіи струпа надобно сильно прижечь язву адскимъ камнемъ или сюрьмянымъ масломъ, дабы произвести пограничное воспаленіе и разрушить остатки волдыря. При распространившейся и усилившейся болѣзни приличнѣе употреблять холодныя примочки изъ крѣпкаго отвара хины, или дубовой корки съ четвертою частию хлорина, также acidum rufo lignosum, acid. muriaticum, аqца oxymuriatica и, поддерживая общія силы натуры возбуждающими средствами, ожидать критического разрѣшенія болѣзни и произвольнаго отдѣленія помертвѣлыхъ частей. *Д-ръ Шредеръ* советуетъ втиратъ въ такомъ случаѣ въ опухоль Ганнеманову ртуть въ достаточномъ количествѣ, обмывать все тѣло разжиженною соляною и селитряною кислотою, а при пораженіи мозга дѣлать холодныя примочки на головѣ и даже холодныя обливанія.

§ 132.

Общее лѣченіе должно быть сообразно свойству горячки. Если она еще невосприняла опредѣлительного характера, то достаточна простая противогнездная диета и употребленіе разжиженныхъ кислотъ, особенно соляной (N 64). Въ другихъ случаяхъ, имѣнно у полносочныхъ, холерическихъ субъектовъ, пайначе если мѣстопребываніе болѣзни находится очень близко къ центральнымъ органамъ кровообращенія и горячка пред-

ставляетъ болѣе воспалительное свойство, не всегда должны быть пренебрегаемы общія и мѣстныя кровопусканія и употребленіе внутрь селитры (N 18, 62.), ибо таковымъ способомъ можно вѣрнѣе предотвратить опасность апоплексического удара и воспаленія внутреннихъ органовъ. Тамъ, гдѣ оказывается желудочное или желчное свойство горячки, очень полезны рвотныя средства, и разрѣшающіе экстракты въ соединеніи съ уксусокислымъ амміакомъ, или виннымъ камнемъ (N 14, 54); При пораженіи мозга *Шредеръ* совѣтуетъ давать внутрь усладченную ртуть и одурникъ (*belladonna*) въ приличныхъ приемахъ.

Въ дальнѣйшихъ періодахъ болѣзни, при значительномъ упадкѣ силъ и явственномъ астеническомъ состояніи горячки, предписывается употребленіе летучихъ, возбуждающихъ и крѣпительныхъ средствъ к. т. мауна, змѣевика (N 22, 25.), баранки съ хлориновою кислотою, также хины въ соединеніи съ сѣрою кислотою (N 9.) и пр.

Пролежни.

(*Decubitus*).

Syn. Excoriatio a decubitu, gangraena ex decubitu.

§ 133.

Сей родъ накожного воспаленія оказывается въ то время, когда больной безпрестанно находится въ посте-

лѣ и, по слабости тѣла или по другой причинѣ, не въ состояніи перемѣнить своего положенія, или принуждены лежать на такихъ частяхъ, коихъ кости отъ природы, либо въ слѣдствіе истощенія тѣла, покрыты одною кожею.

Посему оно замѣчается чаще на лопаткахъ, локтевомъ отросткѣ, крестцѣ, на подвздошной кости, большомъ вертлугѣ, на колѣнахъ, пяткахъ и пр. Дурное положеніе больного, нечистота и неопрятность постели много также способствуютъ развитію сей болѣзни. Иногда она раждается отъ того, что части тѣла долгое время находятся въ соприкосновеніи между собою. Сперва въ томъ мѣстѣ, на которое дѣйствовало безпрестанное давленіе, оказываются припадки воспаленія к. т. краснота и тупая боль, потомъ происходитъ слупливаніе кожи (excoriatio), или нагноеніе, которое превращается въ язву и наконецъ переходитъ въ помертвѣніе. Такъ обыкновенно проходитъ болѣзнь сія; иногда однакожъ красное болящее мѣсто, безъ предшествовавшаго изъязвленія, прямо переходитъ въ помертвѣніе.

Пролежни составляютъ вообще очень непріятное, мучительное и опасное явленіе, оказывающееся весьма часто въ послѣднихъ периодахъ хроническихъ болѣзней и трудныхъ горячекъ, гдѣ оно, поражая сильно репродукцію, умножаетъ до чрезмѣрности общее страданіе.

§ 134.

Что касается до лѣченія, то надлежитъ стараться отвращать пролежни, а по наступленіи ихъ употреб-

лять средства, уничтожающія дальнѣйшее развитіе и переходженіе ихъ въ антоновъ огонь. Въ первомъ отношеніи должно соблюдать величайшую чистоту и опрятность, перемѣнять по чаще постельное бѣлье, которое должно быть изъ тонкаго холста и безъ грубыхъ швовъ, перестилать постелю не сколько разъ въ день, употреблять для оной тюФякъ изъ лошадиныхъ волосъ, покрывая его ровно, безъ всякихъ складокъ, простынею, или подкладывать юФту, либо kleenку, овла�аемую масломъ, а еще лучше козью шкурку, волосистою стороною кверху. Кромѣ сего часто перемѣнять положеніе больнаго, перемѣщать его иногда на другую постелю, или сажать на стулъ, давать ему въ постелѣ чрезъ подкладываніе подушекъ сидачее положеніе, либо прикрѣплять къ потолку веревку, посредствомъ коей онъ могъ бы приподниматься. Мѣста, въ которыхъ можно предполагать пролежни, надлежитъ обмывать по чаще холодною водою, или растворомъ свинцового окисла, овлаждать лимоннымъ сокомъ, прикладывать мазь изъ яичнаго бѣлка, сбитаго съ водою, либо свинцовую мазь съ камФорою, найпаче у тощихъ людей (*Рустъ*).

Если какое либо мѣсто начипаетъ дѣлаться краснымъ, то надлежитъ тотчасъ прикладывать на оное empl. *poticium*, vel *saponatum*. Хорошее дѣйствіе оказываетъ также осадокъ, происходящій въ отварѣ дубовой корки чрезъ прибавленіе уксусокислого свинца, или *ung. quercinum Authenriethii Ph. Univers.* Когда же рождаются слу-
пливанія кожицы и поверхности изъязвленія, которыя причиняютъ обыкновенно сильную боль, то, кромѣ показанныхъ средствъ, одобряются свинцовые и цинковые

мази съ прибавлениемъ нѣсколько опія, а особливо *ung. cerussæ camphoratum Ph. Univ.* Буде же мѣсто таковое дѣлаетсяantonовоогненнымъ, находились ли бы на ономъ язвы или нѣть, то предписываютя мази, заключающія въ себѣ терпентинъ, камфору и проч. напр. мазь изъ личнаго бѣлка, камфорнаго спирта, перуанскаго бальзама, уксусокислаго свинца и проч., также *ung. digestivum, bals. Arcaeicum oleo terebinthinae, camphoræ etc.* *ung. de styrace* и пр. Сверхъ сего похваляется обмываніе хлоровою водою, растворомъ уксусокислой мѣди, цинковаго и мѣднаго купороса (*Нейманнъ*), также прикладываніе припарки изъ пивныхъ дрожжей, тертой моркови и соляной кислоты (*Thomson*). Помертвѣвшія и отставшія части, удерживающіяся только на нѣкоторыхъ безжизненныхъ волокнахъ, надлежитъ удалять.

Касательно *внутренняго лѣченія* должно поступать такъ, какъ сказано при лѣченіи антонова огня вообще (§ 76—81).

O n a l e n i e.

(*Ambustio*).

Syn. Adustio, exustio, enkavsis, ambustura; ожога, обожженіе и пр.

§ 135.

Симъ именемъ называется собственнаго рода воспаленіе покрововъ тѣла, болѣе или менѣе сильное, при-

чиляемое огнемъ, разгоряченнымъ, или ъдкимъ веществомъ. Вообще огонь и всѣ тѣла, превышающія степенью теплоты своей температуру тѣла здороваго человѣка, также химически действующія острыя, ъдкія вещества к. т. минеральная кислоты, щелочи, фосфоръ, металлическія соли и проч. оказываютъ сильное раздраженіе на животный организмъ, въ слѣдствіе коего рождается обыкновенно болѣе или менѣе умноженное противодействіе въ непосредственно поражаемыхъ частяхъ (воспаленіе) и нерѣдко во всемъ организмѣ (горячка). —

§ 136.

Ожоги не всегда имѣютъ одинаковый видъ, но различаются между собою по свойству опаляющаго тѣла, по степени его разгоряченія, по продолженію его дѣйствія и по устройству опалаемой части. Въ семъ отношеніи самыя *левенія* ихъ бываютъ очень различны. Посему, для удобнѣйшаго обозрѣнія онъихъ и вящей практической пользы, необходимо нужно различать между ними слѣдующія четыре степени.

Первая степень оказывается въ то время, когда огонь, разгоряченное, или ъдкое тѣло раздраженіемъ своимъ производятъ только умноженное притеченіе соковъ, жаръ, красноту, опухоль, вообще всѣ признаки легкаго накожнаго воспаленія (*erythema* § 96) безъ отдѣленія однakoжъ верхней кожицы отъ кожи. Въ сей степени противодействіе всего организма часто бываетъ столь слабое, что рѣдко замѣчаются явственные огневичные движения.

Во второй степени обнаруживается значительное воспаление, от чего делается выпотение серозной жидкости, поднимающей верхнюю кожу в пузыри. Таковые пузыри, наполненные прозрачною жидкостью влагою либо изсыхают и слушиваются, если оная влага всасывается, либо вскрываясь случайно, покрываются коркою, подъ коею произрастается новая кожа. Вскрывшиеся пузыри только тогда превращаются въ гнойную поверхность, когда воспаление бываетъ сильное, приближающееся уже къ третьей степени. Кроме образования пузырей, какъ действия возвышенного воспалительного процесса, здѣсь оказываются и другіе припадки к. т. боль, краснота и опухоль сильнѣе, нежели въ первой степени и делается иногда припадочная горячка, имѣющая воспалительное свойство, особенно, если опаленіе обширное, или онимъ поражаются части, изобилующія сосудами и нервами, к. глаза, ротъ желудокъ и проч.

Третья степень ожоги отличается темъ, что воспаление распространяется здѣсь на лежащую подъ кожею клѣтчатую плеву и даже на органы, обрѣтающіеся гораздо глубже, такъ что, при самомъ дѣятельномъ вспомоществованіи искусства, всегда оказывается нагноеніе, отъ которого зависитъ образование рубцовъ при заживленіи. Боль здѣсь бываетъ очень сильная, жгучая, бьющаяся, даже по наступлению нагноенія весьма мало уменьшающаяся, краснота темная, ограниченная, жаръ и опухоль значительныя. Горячка при малой объятности ожоги, всегда оказывается въ сей степени и бываетъ чаще воспалительная, а при большомъ пространствѣ опале-

нія соединенная съ первыми явлениями и эретизмомъ въ высшей степени. Нагноение въ семъ случаѣ отличается тѣмъ, что произраѣдастъ почти всегда очень разрастаящіеся мясные сосочки. Часто, особенно при несообразномъ лѣченіи, степень сія развивается изъ второй и можетъ переходить иногда въ четвертую.

Въ четвертой степени, отъ чрезмѣрно сильного дѣйствія огня или Ѣдкихъ веществъ, организація и жизненность пораженной части вовсе уничтожаются, въ слѣдствіе чего рождается совершенное помертвѣніе, влажное либо сухое, смотря по свойству опалюющаго или Ѣдкаго вещества. Сія степень опаленія дѣлается иногда въ то самое мгновеніе, когда означенные вещества приходятъ съ частію въ соприкосновеніе, а иногда она оказывается послѣ, отъ несообразнаго лѣченія прежней степени, или стъ того, что воспаленіе распространяется на большое пространство и пораженные имъ части имѣютъ весьма слабую степень жизненности. Около помертвѣвшихъ мѣсть замѣчается третья степень ожоги, соединенная съ нагноеніемъ и отдѣляющая помертвѣлое отъ здоровыхъ частей пограничною линіею. Отпаденіе помертвѣлыхъ частей сопряжено всегда съ потерей существа, которая вознаграждается посредствомъ нагноенія и потому въ послѣдствіи оказываются значительные рубцы.

При нѣкоторомъ, даже не очень значительномъ распространеніи сей степени ожоги, почти всегда оказывается сильное противодѣйствіе организма, обнаруживающееся въ формѣ воспалительной горячки съ эретизмомъ въ высокой степени. Отягощеніе головы, ознобъ,

смѣняющійся жаромъ, жажда, частое, скорое, твердое жилобіеніе, бредъ, судороги и другіе признаки пораженной нервной системы суть обыкновеннѣйшія явленія. Горячка сія нерѣдко воспринимаетъ неблагополучный исходъ. Часто съ оною соединено бываетъ страданіе легкихъ, сильное стѣсненіе груди при дыханіи и т. п., что происходитъ, вѣроятно, отъ сочувственнаго взаимаго содержанія между кожею и легкими.

§ 137.

Исходы разнствуютъ по степени ожоги и по большему или меньшему распространению оныхъ. Необширныя ожоги въ первой степени оканчиваются *слупливаніемъ кожицы*, во второй *изсыханіемъ пузырей и образованіемъ новой кожицы*, иногда *срашеніемъ съ смежными частями*, въ третей *произрожденіемъ упорныхъ язвъ и по заживленіи оныхъ образованіемъ накожныхъ рубцовъ*, а въ четвертой *отпаденіемъ помертвѣлыхъ частей, язвеннымъ нагноеніемъ и весьма медленнымъ возстановленіемъ*.

Опаленія всей поверхности тѣла обыкновенно бываютъ смертельны и *смерть* слѣдуетъ здѣсь отъ воспаленнаго накожного испаренія, которое отлагаясь на другіе органы, особенно на легкія и мозговыя оболочки, причиняетъ въ оныхъ выпотѣніе, отъ коего рождается апоплексической ударъ. Иногда она наступаетъ мгновенно отъ параличнаго пораженія нервной системы, въ слѣдствіе чрезмѣрнаго раздраженія, а иногда приключается также отъ воспалительной горячки и общаго гнилостиа-

го состоянія, произра�дающагося чрезъ всасываніе апопно-
воогнепной матеріи.

§ 138.

Предсказаніе зависитъ преимущественно отъ силы и продолженія дѣйствовавшихъ причинъ, органическаго устройства страждущей части, раздражительности больнаго, отъ свойства тѣла, причиняющаго опаленіе, а особенно отъ обширности опаленія. Если ожога произведена такою степенью жара, которая мало превышаетъ температуру человѣка, либо небольшимъ количествомъ ѳдкихъ веществъ и несопровождается значительною потерю существа, то предсказаніе бываетъ благопріятнѣе, нежели въ противуположномъ случаѣ, тѣмъ болѣе если таковыя вещества дѣйствовали короткое время и тотчасъ удалены были. Опаленія виѣшней поверхности тѣла менѣе опасны, нежели внутреннихъ частей и благородныхъ органовъ. При возвышенной раздражительности нервной системы и самая маловажная степень ожоги можетъ имѣть дурной исходъ, ибо въ такомъ случаѣ легко рождается сильная горячка, корчи и др. первные припадки, либо мгновенное исчезаніе жизненной силы и паралич нервной системы. Впрочемъ наибольшая важность предсказанія зависитъ отъ обширности ожоги. Если опаляется большая часть, или вся поверхность тѣла, то нечастный исходъ можетъ произойти отъ нарушенія отправленій кожи. Небольшія ожоги четвертой степени, если онѣ прощаются даже глубоко внутрь, никогда несопряжены съ такою опасностю, какъ обширныя опаленія первой, или второй степени.

§ 139.

При *лукенії* сей болѣзни главныя показанія состоять въ удаленіи причинъ, въ приличномъ содѣйствіи на мѣстное страданіе и въ укрощеніи общаго огневичнаго возбужденія.

§ 140.

Первое показаніе относится до *удаленія причинъ*. Если ожога причиняется какими либо острыми, химическими веществами, то сперва надлежитъ притупить ихъ силу, либо нейтрализовать противоядными средствами. Такимъ образомъ дѣйствіе крѣпкихъ кислотъ уничтожается разжиженными щелочами, либо притупляется оболакивающимъ слизистымъ средствомъ, а ъдкая сила щелочей растительными маслами и проч. При опаленіяхъ потѣшнымъ огнемъ или порохомъ должно проникающіе иногда въ кожу пороховыя зернушки удалить пинцетомъ, либо острѣемъ булавки, для избѣжанія безобразныхъ пятенъ. Подобнымъ образомъ надобно поступать со всѣми прочими причинами, смотря по свойству ихъ.

§ 141.

Второе показаніе—содѣйствіе на мѣстную болѣзнь—требуетъ употребленія приличныхъ наружныхъ средствъ сообразно степени ожоги. Въ первой сте-

пени прохладительный способъ есть вообще самый приличный; посему тотчасъ опаленную часть надлежить погрузить въ холодную воду. *Дзонди* опредѣляетъ въ семъ случаѣ, какъ лучшую температуру воды +12 R. Другіе предпочитаютъ ледъ или снѣгъ. Отъ сего почти мгновенно слѣдуетъ облегченіе, прохлажденіе жгучей боли и уничтоженіе въ короткое время всей болѣзни, если вода прилѣжно перемѣняется. Нѣкоторые прибавляютъ еще къ холодной водѣ свинцовый уксусъ, составляя чрезъ то т. н. Гулардову воду. Другіе употребляютъ уксусъ одинъ по себѣ, либо пополамъ съ водою (*Cleghorn*), а иные примѣшиваютъ къ холодной водѣ напаштырь (N 25), либо Теденову воду отъ ранъ (N 56). Подобнымъ образомъ дѣйствуютъ многія народныя средства к. т. тертая сырая картофель, морковь, сырая земля, глина, также прикладываніе свѣжихъ листьевъ капусты, либо подорожника, свѣжихъ сливокъ и т. п.

Во второй степени холодная вода остается также преимущественнымъ средствомъ. Кромѣ того здѣсь надлежить обращать вниманіе на пузыри, раждающіеся въ опаленныхъ мѣстахъ, не вскрывая ихъ никогда прежде совершенного притупленія болей. Когда подъ оными образуется отдѣлительная поверхность, то можно вскрыть ихъ тонкими проколами для испущенія содержащейся влаги и послѣ прикладывать мази изъ льняного масла и известковой воды (*linimentum calcareum*), либо изъ льняного масла и яичныхъ желтковъ, что оказываетъ въ такомъ случаѣ отличную пользу. Кромѣ сего здѣсь похваляются свинцовыхъ мази, свинцовая вода, различныя приготовленія цинка и другія стягивающія

вещества, кои, укрощая боль, способствуютъ и скорѣйшему произрожденію кожицы. Въ сей степени не должно забывать большой наклонности опалляемыхъ мѣстъ къ сращенію и потому, если обожжены бывають губы, вѣка, смежные пальцы на рукахъ или на ногахъ, то между ими всегда нужно класть корпейная связочки, овлажнаемыя льнянымъ масломъ, или свинцовою мазью.

Въ третьей степени ожоги холодная вода не всегда прилична, наипаче если верхняя кожица сошла и первые сосочки кожи обнаружились. Посему холодная промокши могутъ быть терпимы здѣсь только въ началѣ, до выпущенія серозной влаги изъ пузырей. Послѣ, коль скоро отставшая кожица уже отдѣлилась, благотворно действуютъ жирныя вещества, нѣжныя мази, *ung. simplex rosatum Ph. Bor. ung. cetaceum Ph. Bat.*, свѣжія растительныхъ масла, особливо миндалевое, прованское и льняное, одни или еще лучше въ смѣщеніи съ известковою водою, полагая сначала болѣе масла и менѣе известковой воды, а въ послѣдствіи равную часть обѣихъ. У чувствительныхъ особъ лучше таковыя вещества намазывать кисточкою, ибо вѣтошка, овлажнаемая ими и прикладываемая на опаленіе, часто причиняетъ сильныя боли. Свинцовые мази и свинцовые средства всякаго рода, хотя и оказываютъ цѣлитѣльную силу, но въ сей степени ожоги, сопряженной съ значительнымъ изѣязвленіемъ и нагноеніемъ, имѣютъ ту певыгоду, что по заживленіи производятъ безобразные рубцы. Посему при опаленіяхъ лица лучше предписывать известную отъ ожоги мазь *Штадлъ*, составляемую изъ самаго свѣжаго, очищаемаго перетапливаніемъ и выпариваніемъ

коровьяго масла и половиной части желтаго воску. Рекомендуемыя разными авторами раздражающія вещества не должны быть употребляемы слишкомъ рано, да и въ большей части случаевъ нѣжныя масла дѣйствуютъ гораздо вѣрнѣе. При весьма значительномъ разрастаніи мясныхъ сосочековъ, оказывающемся въ позднѣйшемъ теченіи болѣзни, иногда необходимо нужно прибѣгнуть къ ъдкому средству: к. с. *nitras argentii fusi*, *sulphas cupri* etc.

Четвертая степень ожогъ соединена всегда съ антиновымъ огнемъ и пораженныя имъ части натура скорѣе, или медленнѣе отдаляетъ сама собою. Поелику впрочемъ окружность совершенно сожженной части заключаетъ также вторую, либо третью степень опаленія, то на сіи низшія степени надлежитъ обращать большее вниманіе, нежели на тѣ мѣста, кои совершенно уже лишены всякой жизненности. Посему обожженный членъ нужно тотчасъ погрузить въ холодную, простую, либо свинцовую воду и поступать вообще по вышеизложеннымъ правиламъ. Для споспѣществованія отдѣленію помертвѣвшей массы служатъ размягчающія припарки. Отдѣлившіеся куски удаляются ножницами или ножемъ и, по отпаденіи всего помертвѣлаго, язва пользуется образомъ ея свойству. Дикое мясо (*caro luxurians*), къ произрожденію коего язвы сіи имѣютъ особенную наклонность, истребляется присыпкою порошка *hydrargyri praecipitatii galbri*, или примачивашемъ *solutione argenti fusi opati Ph. Castr. Ruth.* etc.

§ 142.

При опаленіяхъ внутреннихъ частей лѣченіе должно быть сообразно свойству оныхъ. Такимъ образомъ при опаленіи пищепріемнаго кишала даются оболакивающіе, слизистые напитки, миндалевое молоко съ известковою водою и пр., а при опаленіи маточнаго рукава, или проходной кишкы дѣлаются слизистыя болеутолительныя вспрыскивания, или промывательныя. Впрочемъ одно мѣстное лѣченіе здѣсь недостаточно, по надлежитъ дѣйствовать на весь организмъ, смотря по свойству обнаруживающихся припадковъ.

§ 143.

Третье показаніе заключаетъ общее лѣченіе. Въ большей части случаевъ при опаленіяхъ существуетъ общее воспалительное состояніе; посему первѣко требуется кровопусканіе и повтореніе онаго, а внутрь противовоспалительные средства, средня соли (N 14.20.62) и умѣренная диета. При чрезмѣрныхъ боляхъ, усиливающихъ горячку и лишающихъ больного всякаго спокойствія, дается уксусокислый морфей, кодеинъ, белена (N 2.77.) и др. невозбуждающія наркотическія лѣкарства, которыя, при значительномъ артезімѣ, одни только въ состояніи предотвратить дурной исходъ. Противъ вредныхъ вліяній антонова огня рѣдко требуется дѣйствовать на весь организмъ. Если же это нужно, то по устраненіи воспалительного общаго возбужденія, пред-

нисываются хина, минеральная кислоты и другія противугнилостныя вещества и крѣпительная питательная діета. Сильно возбуждающія лѣкарства к. т. винный спиртъ, эфиры, камфора, нѣсогда могутъ быть причины, а только при первозномъ, гнилостномъ состояніи и чрезмѣромъ ослабленіи болыаго отъ сильнаго нагноенія.

§ 144.

Къ эмпирическимъ средствамъ принадлежать: приближеніе опаленой части въ скоромъ времени къ огню (*Kentisch*), либо погруженіе въ горячую воду (*B. Bell*), окутываніе хлопчатою бумагою или ватою, покрытие янтарнымъ лакомъ, либо присыпаніе мукою съ прибавленіемъ иногда къ оной $\frac{1}{4}$ галмая (*lapis calaminaris*) (*M. Ward*), присыпаніе опаленія мылько истолченнымъ мыломъ послѣ стягивающихъ припарокъ, или примочекъ изъ уксуса (*Cleghorn*), примачиваніе растворомъ хлоровой извести 5° Гей Люсакова хлорометра, горячимъ спиртомъ, эфирами, водкою, терпентиннымъ масломъ и пр. прикладываніе шафранной мази, составляемой съ чистымъ деревяннымъ масломъ и потомъ *ung de styrace* (*Larrey*).
