

Объ алгебраическомъ интегрированіи алгебраическихъ дифференціаловъ.

И. Л. Пташицкаго.

1. Настоящая статья посвящается слѣдующему вопросу:

„Пусть функция y связана съ переменною x алгебраическимъ уравнениемъ; требуется выразить интегралъ $\int y dx$ черезъ алгебраическую функцию отъ x или доказать, что значение предложенного интеграла не можетъ быть представлено алгебраической функциею“.

Этотъ вопросъ въ первый разъ вполнѣ рѣшилъ Ліувиль (Journal de l'Ecole polytechnique, XXII cahier; Journal de mathématiques, t. III). Онъ основывался въ своемъ рѣшеніи на слѣдующей теоремѣ Абеля: если интегралъ $\int y dx$ выражается алгебраически, то величина его можетъ быть представлена функциею, составленною рационально изъ x и y .

Вопросомъ объ алгебраическомъ интегрированіи занимались еще и другие математики. Я укажу на Briot et Bouquet (Théorie des fonctions elliptiques), гг. Zeuthen (Comptes rendus, 1880), Raffy (Annales de l'Ecole Normale, 1883, 1885), Humbert (Acta mathematica, 1887).

Не входя въ подробное разсмотрѣніе предложенныхъ до настоящаго времени рѣшеній занимающаго насъ вопроса, я замѣчу только, что всѣ они сводятъ вопросъ на отысканіе несколькиихъ полиномовъ по способу неопределенныхъ коэффициентовъ.

Въ настоящей статьѣ я желаю указать на одну теорему, которая позволяетъ рѣшить вопросъ инымъ путемъ. Эта же теорема даетъ возможность рѣшить вопросъ и съ помощью способа неопределенныхъ коэффициентовъ, на основаніи новыхъ соображеній.

2. Теорема. Пусть P есть цѣлая функция отъ x ; z — функция, опредѣляемая неприводимымъ уравненіемъ съ цѣлыми коэффициентами

$$z^n + \varphi_1(x) z^{n-1} + \varphi_2(x) z^{n-2} + \dots = 0;$$

z_1, z_2, \dots, z_n вспъ значенія, принимаеыя функцію z для каждого значенія x . Пусть Δ есть дискриминантъ уравненія съ z и

$$\Delta = D^2 \cdot E,$$

идъ D, E суть цѣлые полиномы относительно x , причемъ полиномъ E не содержитъ линейныхъ кратныхъ множителей.

Если интеграль

$$\int \frac{z}{P} dx$$

выражается алгебраически, то можно положить

$$\int \frac{z}{P} dx = \frac{X_0 + X_1 z + X_2 z^2 + \dots + X_{n-1} z^{n-1}}{Y},$$

идъ $Y, X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ суть цѣлые функціи отъ x , опредѣленныя слѣдующимъ образомъ:

1º Полиномъ Y равенъ произведенію изъ полинома D на общий наибольшій дѣлитель полиномовъ

$$P, \quad \frac{dP}{dx}.$$

2º Полиномы X_0, X_1, \dots, X_{n-1} удовлетворяютъ равенствамъ:

$$X_i = \frac{Y}{V\Delta} \left| \begin{array}{c} 1, z_1, z_1^2, \dots, z_1^{i-1}, \int \frac{z_1}{P} dx, z_1^{i+1}, \dots, z_1^{n-1} \\ 1, z_2, z_2^2, \dots, z_2^{i-1}, \int \frac{z_2}{P} dx, z_2^{i+1}, \dots, z_2^{n-1} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ 1, z_n, z_n^2, \dots, z_n^{i-1}, \int \frac{z_n}{P} dx, z_n^{i+1}, \dots, z_n^{n-1} \end{array} \right|,$$

идъ $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

3. Доказательство первой части нашей теоремы основывается главнымъ образомъ на одномъ предложеніи, къ выводу котораго мы предварительно и обратимся.

Возьмемъ n выражений

$$X_0 + X_1 z_1 + X_2 z_1^2 + \dots + X_{n-1} z_1^{n-1},$$

$$X_0 + X_1 z_2 + X_2 z_2^2 + \dots + X_{n-1} z_2^{n-1},$$

.

$$X_0 + X_1 z_n + X_2 z_n^2 + \dots + X_{n-1} z_n^{n-1},$$

въ которыхъ X_0, X_1, \dots, X_{n-1} означаютъ цѣлые функции отъ $x; z_1, z_2, \dots, z_n$ — значенія функции z , опредѣленной въ предыдущемъ n^0 .

Пусть $x - a$ представляетъ двучленъ, не дѣлящій всѣхъ полиномовъ X_0, X_1, \dots, X_{n-1} , и содержащійся во всѣхъ n нашихъ выраженіяхъ съ показателями больше нуля¹⁾. Пусть α есть наименьшій изъ этихъ показателей.

Займемся разсмотрѣніемъ двучлена $x - a$ и показателя α .

Мы сказали, что не всѣ полиномы X_0, X_1, \dots, X_{n-1} дѣлятся на $x - a$; положимъ X_k есть полиномъ взаимно простой съ $x - a$. Называя разматриваемыя нами выраженія соотвѣтственно черезъ

$$\tilde{\delta}_1, \tilde{\delta}_2, \dots, \tilde{\delta}_n,$$

мы имѣемъ равенство

$$X_k = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \begin{vmatrix} 1, z_1, z_1^2, \dots, z_1^{k-1}, \tilde{\delta}_1, z_1^{k+1}, \dots, z_1^{n-1} \\ 1, z_2, z_2^2, \dots, z_2^{k-1}, \tilde{\delta}_2, z_2^{k+1}, \dots, z_2^{n-1} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ 1, z_n, z_n^2, \dots, z_n^{k-1}, \tilde{\delta}_n, z_n^{k+1}, \dots, z_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

въ которомъ Δ есть цѣлая функция отъ x , равная дискриминанту уравненія съ z . Легко видѣть, что опредѣлитель, входящій въ полученнное равенство, содержитъ $x - a$ съ показателемъ не меныше α .

Отсюда, въ силу вышепредположенного относительно X_k , сейчасъ получаемъ предложеніе, которое имѣли въ виду вывести: двучленъ

¹⁾ Мы будемъ говорить, что функция содержитъ множитель $(x - a)$ съ показателемъ μ , если въ разложеніи функции, по восходящимъ степенямъ двучлена $x - a$, первый членъ содержитъ $(x - a)^\mu$. Число μ можетъ быть цѣлымъ или дробнымъ, положительнымъ или отрицательнымъ.

$x - a$ дѣлить дискриминантъ Δ и притомъ показатель α не превосходитъ показателя, съ которымъ $x - a$ содержится въ радикалѣ $\sqrt{\Delta}$.

4. Основываясь на выведенномъ нами предложении, не трудно теперь убѣдиться въ справедливости первой части нашей теоремы (n^02).

Пусть

$$\int \frac{z}{P} dx$$

есть интегральь, выражающійся алгебраически.

На основаніи теоремы Абеля, цитированной въ n^01 , будемъ имѣть равенство

$$\int \frac{z}{P} dx = \frac{X_0 + X_1 z + X_2 z^2 + \dots + X_{n-1} z^{n-1}}{Y},$$

въ которомъ $Y, X_0, X_1, \dots X_{n-1}$ означаютъ цѣлые функции отъ x , которые, очевидно, можемъ предполагать взаимно простыми. Замѣтимъ, что это равенство, какъ показалъ Абель, остается справедливымъ, если на мѣсто z подставить какое угодно изъ n значеній: $z_1, z_2, \dots z_n$.

Предложимъ себѣ теперь изслѣдовать, какіе простые множители могутъ входить въ полиномъ Y , и въ какихъ степеняхъ.

Назовемъ черезъ $x - a$ одинъ изъ простыхъ множителей полинома Y и черезъ

$$\delta, \alpha, p$$

показатели, съ которыми двучленъ $x - a$ содержится соотвѣтственно въ функцияхъ

$$Y, X_0 + X_1 z + X_2 z^2 + \dots + X_{n-1} z^{n-1}, P.$$

Междуду этими показателями, какъ легко убѣдиться, существуетъ весьма простая зависимость.

Въ самомъ дѣлѣ, разматривая вышенаписанное равенство, мы видимъ, что производная первой части содержитъ $x - a$ съ показателемъ не менѣе $-p$, производная второй части содержитъ этотъ множитель, если только δ не равно α , съ показателемъ равнымъ $\alpha - \delta - 1$; такъ что, если δ не равно α , то навѣрное

$$-p \leq \alpha - \delta - 1.$$

Слѣдовательно, δ — показатель множителя $(x-a)$ у полинома Y опредѣляется одною изъ формулъ

$$\delta = \alpha, \quad \delta \leq \alpha + p - 1.$$

Предположимъ теперь, и это по вышезамѣченному всегда возможно, что въ нашемъ равенствѣ z означаетъ то изъ n значеній z_1, z_2, \dots, z_n , при которомъ показатель α имѣеть наименьшую величину. Если, при этомъ предположеніи, число α не равно нулю, то (n^03) навѣрно $x-a$ будетъ дѣлителемъ дискриминанта Δ и само α не будетъ превосходить показателя, съ которымъ этотъ двучленъ содержится въ радикалѣ $\sqrt{\Delta}$.

Въ силу этого изъ полученныхъ нами формулъ для δ сейчасъ можемъ заключить, что всѣ простые множители полинома Y найдутся между простыми множителями полиномовъ

$$P, \Delta.$$

Затѣмъ, изъ тѣхъ же формулъ для δ легко опредѣлить показатели, съ которыми простые множители полиномовъ P, Δ войдутъ въ полиномъ Y .

Разсмотримъ сначала двучленъ $x-a$, недѣляющій полинома P . Изъ нашихъ формулъ, полагая $p=0$, заключаемъ, что показатель δ , съ которымъ $x-a$ входитъ въ полиномъ Y , не превзойдетъ числа α , а потому не превзойдетъ и показателя, съ которымъ этотъ двучленъ содержится въ радикалѣ $\sqrt{\Delta}$. Но у насъ $\sqrt{\Delta}=D\sqrt{E}$, гдѣ радикаль \sqrt{E} не имѣеть рациональныхъ множителей; число же δ , очевидно, должно быть цѣлымъ. Слѣдовательно, въ разбираемомъ случаѣ $(x-a)^\delta$ будетъ дѣлить полиномъ D .

Возьмемъ, во вторыхъ, двучленъ $x-a$, дѣляющій полиномъ P . Изъ формулъ для δ заключаемъ, что показатель δ у множителя $(x-a)$ въ полиномѣ Y не больше числа $\alpha+p-1$. Здѣсь p означаетъ кратность множителя $(x-a)$ въ полиномѣ P , а потому $p-1$ есть кратность того же множителя у общаго наибольшаго дѣлителя полинома P и производной $\frac{dP}{dx}$; число α не больше показателя, съ которымъ $x-a$ входитъ въ радикалѣ $\sqrt{\Delta}=D\sqrt{E}$. Слѣдовательно, въ разбираемомъ случаѣ $(x-a)^\delta$ будетъ дѣлить произведеніе изъ полинома D на общій наибольшій дѣлитель полиномовъ $P, \frac{dP}{dx}$.

И такъ, первая часть теоремы доказана.

5. Изъ равенства предыдущаго n^0 получаемъ n уравненій:

$$\int \frac{z_1}{P} dx = \frac{X_0 + X_1 z_1 + X_2 z_1^2 + \dots + X_{n-1} z_1^{n-1}}{Y},$$

$$\int \frac{z_2}{P} dx = \frac{X_0 + X_1 z_2 + X_2 z_2^2 + \dots + X_{n-1} z_2^{n-1}}{Y},$$

$$\int \frac{z_n}{P} dx = \frac{X_0 + X_1 z_n + X_2 z_n^2 + \dots + X_{n-1} z_n^{n-1}}{Y}.$$

Рѣшая эти уравненія относительно X_0, X_1, \dots, X_{n-1} , получаемъ формулы, составляющія вторую часть доказываемой теоремы.

6. Изъ теоремы №2 непосредственно вытекаетъ слѣдующій способъ для рѣшенія вопроса объ алгебраическомъ интегрированіи даннаго алгебраического дифференціала ydx .

Приводимъ функцию y къ виду

$$\frac{z}{P}$$

и дискриминантъ уравненія съ z къ виду

$$\Delta = D^2 \cdot E.$$

Составляемъ произведеніе изъ полинома D на общій наибольшій дѣлитель полиномовъ $P, \frac{dP}{dx}$; это произведеніе даетъ намъ полиномъ Y .

Затѣмъ, разлагаемъ въ ряды, по нисходящимъ степенямъ x, n выражений

$$\frac{Y}{V\Delta} \left| \begin{array}{c} 1, z_1, z_1^2, \dots z_1^{i-1}, \int \frac{z_1}{P} dx, z_1^{i+1}, \dots z_1^{n-1} \\ 1, z_2, z_2^2, \dots z_2^{i-1}, \int \frac{z_2}{P} dx, z_2^{i+1}, \dots z_2^{n-1} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ 1, z_n, z_n^2, \dots z_n^{i-1}, \int \frac{z_n}{P} dx, z_n^{i+1}, \dots z_n^{n-1} \end{array} \right|,$$

$$(i = 0, 1, 2, \dots, n-1),$$

въ которыхъ z_1, z_2, \dots, z_n означаютъ всѣ корни уравненія съ z и

$$\sqrt{\Delta} = \begin{vmatrix} 1, z_1, z_1^2, \dots z_1^{n-1} \\ 1, z_2, z_2^2, \dots z_2^{n-1} \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ 1, z_n, z_n^2, \dots z_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Цѣлые части разложеній дадутъ соотвѣтственно полиномы

$$X_0, X_1, \dots X_{n-1}.$$

Коэффиціенты этихъ полиномовъ будуть содержать, вообще, линейнымъ образомъ n неизвѣстныхъ постоянныхъ $c_1, c_2, \dots c_n$; c_i есть постоянная произвольная интеграла $\int \frac{z_i}{P} dx$.

Одну изъ постоянныхъ можно назначить произвольно; остальная опредѣляемъ изъ условія, что равенство

$$\frac{d}{dx} \left[\int \frac{z}{P} dx - \frac{X_0 + X_1 z + X_2 z^2 + \dots + X_{n-1} z^{n-1}}{Y} \right] = 0$$

должно обращаться въ тождество.

Когда постоянныя $c_1, c_2, \dots c_n$ будутъ опредѣлены, тогда функція

$$\frac{X_0 + X_1 z + X_2 z^2 + \dots + X_{n-1} z^{n-1}}{Y}$$

представитъ величину предложеннаго интеграла

$$\int \frac{z}{P} dx.$$

Если же постоянныя $c_1, \dots c_n$, не могутъ быть опредѣлены согласно нашему условію, тогда заключимъ, что предложенный интеграль не выражается алгебраически.

Замѣчаніе. Иногда невозможность алгебраического интегрированія можемъ обнаружить, не доводя до конца нашихъ дѣйствій. Мы заключимъ, что интеграль $\int \frac{z}{P} dx$ не выражается алгебраически: 1° если разложение одной изъ функцій $\frac{z_i}{P}$ будетъ содержать членъ съ x^{-1} (такъ

какъ тогда разложеніе интеграла $\int \frac{z_i}{P} dx$ будетъ содержать членъ съ $\log x$ и, слѣдовательно, этотъ интегралъ не равняется алгебраической функцией); 2^0 если въ разложеніи выраженія, которое должно дать одинъ изъ полиномовъ X_i , члены съ дробными положительными степенями x не могутъ быть уничтожены ни при какомъ выборѣ постоянныхъ $c_1, c_2, \dots c_n$ ¹⁾.

7. Вторая часть теоремы $n^0 2$ позволяетъ опредѣлить полиномы $X^0, X_1, \dots X_{n-1}$ еще слѣдующимъ образомъ.

Пользуясь формулами второй части теоремы, вычисляемъ высшіе предѣлы степеней полиномовъ $X_0, X_1, \dots X_{n-1}$; затѣмъ опредѣляемъ коэффициенты этихъ полиномовъ по способу неопределенныхъ коэффициентовъ изъ условія, чтобы равенство предыдущаго n^0 обратилось въ тождество.

Замѣчаніе. Легко убѣдиться, что, слѣдуя этому второму пути при отысканіи полиномовъ X_i , для рѣшенія вопроса объ алгебраическомъ интегрированіи дифференціала ydx придется выполнять только ариѳметическія дѣйствія.

8. Примѣнимъ наши правила къ тремъ примѣрамъ; два первыхъ заимствованы у Брю и Буке.

Примѣръ I. Рассмотримъ интеграль

$$\int z dx,$$

гдѣ z удовлетворяетъ неприводимому уравненію

$$z^3 - 3z + 2x = 0.$$

Дискриминантъ этого уравненія есть

$$\Delta = 108 - 108x^2,$$

такъ что

$$D = 1.$$

Находимъ

$$Y = 1.$$

¹⁾ Способъ, данный въ этомъ n^0 , былъ уже мною предложенъ для одного частнаго случая въ Прибавленіи къ разсужденію „Объ интегрированіи въ конечномъ видѣ ирраціональныхъ дифференціаловъ“ (Спб., 1881).

Переходимъ къ опредѣленію полиномовъ X_0 , X_1 , X_2 . Для этого отыщемъ цѣлыхъ части въ разложеніяхъ, по нисходящимъ степенямъ x , трехъ выражений

$$\frac{1}{V\Delta} \begin{vmatrix} \int z_1 dx, z_1, z_1^2 \\ \int z_2 dx, z_2, z_2^2 \\ \int z_3 dx, z_3, z_3^2 \end{vmatrix}, \quad \frac{1}{V\Delta} \begin{vmatrix} 1, \int z_1 dx, z_1^2 \\ 1, \int z_2 dx, z_2^2 \\ 1, \int z_3 dx, z_3^2 \end{vmatrix}, \quad \frac{1}{V\Delta} \begin{vmatrix} 1, z_1, \int z_1 dx \\ 1, z_2, \int z_2 dx \\ 1, z_3, \int z_3 dx \end{vmatrix}.$$

Съ помощью уравненія съ z находимъ

$$z_1 = \alpha_1 x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{\alpha_1} x^{-\frac{1}{3}} + \beta_1 x^{-\frac{5}{3}} + \dots,$$

$$z_2 = \alpha_2 x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{\alpha_2} x^{-\frac{1}{3}} + \beta_2 x^{-\frac{5}{3}} + \dots,$$

$$z_3 = \alpha_3 x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{\alpha_3} x^{-\frac{1}{3}} + \beta_3 x^{-\frac{5}{3}} + \dots;$$

гдѣ α_1 , α_2 , α_3 суть значенія корня $\sqrt[3]{-2}$; величина коэффиціентовъ β_1 , β_2 , β_3 намъ не нужна; отсюда сейчасъ получимъ

$$z_1^2 = \alpha_1^2 x^{\frac{2}{3}} + 2 + \frac{1}{\alpha_1^2} x^{-\frac{2}{3}} + 2\alpha_1\beta_1 x^{-\frac{4}{3}} + \dots,$$

$$z_2^2 = \alpha_2^2 x^{\frac{2}{3}} + 2 + \frac{1}{\alpha_2^2} x^{-\frac{2}{3}} + 2\alpha_2\beta_2 x^{-\frac{4}{3}} + \dots,$$

$$z_3^2 = \alpha_3^2 x^{\frac{2}{3}} + 2 + \frac{1}{\alpha_3^2} x^{-\frac{2}{3}} + 2\alpha_3\beta_3 x^{-\frac{4}{3}} + \dots;$$

и

$$\int z_1 dx = \frac{3\alpha_1}{4} x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{2\alpha_1} x^{\frac{2}{3}} + c_1 - \frac{3\beta_1}{2} x^{-\frac{2}{3}} + \dots,$$

$$\int z_2 dx = \frac{3\alpha_2}{4} x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{2\alpha_2} x^{\frac{2}{3}} + c_2 - \frac{3\beta_2}{2} x^{-\frac{2}{3}} + \dots,$$

$$\int z_3 dx = \frac{3\alpha_3}{4} x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{2\alpha_3} x^{\frac{2}{3}} + c_3 - \frac{3\beta_3}{2} x^{-\frac{2}{3}} + \dots,$$

гдѣ c_1, c_2, c_3 постоянныя интегрированія. Еще находимъ

$$\frac{1}{\sqrt{\Delta}} = \frac{1}{\sqrt{-108}} \left(x^{-1} + \frac{1}{2} x^{-3} + \dots \right).$$

Пользуясь выписанными разложеніями, получимъ

$$X_0 = \text{пост.}, \quad X_1 = \frac{3}{4} x, \quad X_2 = -\frac{3}{8}.$$

И такъ, если предложенный интеграль выражается алгебраически, то можно положить

$$\int z dx = \frac{3}{4} xz - \frac{3}{8} z^2.$$

Взявъ производную обѣихъ частей этого равенства, убѣждаемся, что оно дѣйствительно представляетъ величину предложеннаго интеграла.

Примѣръ II. Рассмотримъ интеграль

$$\int z dx,$$

гдѣ z удовлетворяетъ неприводимому уравненію

$$z^3 - 3xz + x^3 = 0.$$

Дискриминантъ этого уравненія есть

$$\Delta = -27x^6 + 108x^3,$$

такъ что

$$D = x.$$

Находимъ

$$Y = x.$$

Переходимъ теперь къ отысканію полиномовъ X_0, X_1, X_2 , пользуясь правиломъ №7. Для этого ищемъ сначала высшіе предѣлы степеней этихъ полиномовъ, или, что одно и тоже, выраженій

$$\frac{x}{\sqrt{\Delta}} \begin{vmatrix} \int z_1 dx, z_1, z_1^2 \\ \int z_2 dx, z_2, z_2^2 \\ \int z_3 dx, z_3, z_3^2 \end{vmatrix}, \frac{x}{\sqrt{\Delta}} \begin{vmatrix} 1, \int z_1 dx, z_1^2 \\ 1, \int z_2 dx, z_2^2 \\ 1, \int z_3 dx, z_3^2 \end{vmatrix}, \frac{x}{\sqrt{\Delta}} \begin{vmatrix} 1, z_1, \int z_1 dx \\ 1, z_2, \int z_2 dx \\ 1, z_3, \int z_3 dx \end{vmatrix}.$$

Изъ уравненія съ z видимъ, что z_1, z_2, z_3 суть первой степени; отсюда заключаемъ, что z_1^2, z_2^2, z_3^2 и $\int z_1 dx, \int z_2 dx, \int z_3 dx$ суть степени второй; замѣтимъ еще что $\frac{x}{\sqrt{\Delta}}$ есть (-2) -ой степени.

Слѣдовательно, высшіе предѣлы степеней выписанныхъ выражений представляются соотвѣтственно числами

3, 2, 1.

Приступаемъ къ опредѣленію коэффиціентовъ полиномовъ X_0, X_1, X_2 . Равенство

$$\frac{d}{dx} \left[\int z dx - \frac{X_0 + X_1 z + X_2 z^2}{x} \right] = 0,$$

послѣ подстановки въ немъ на мѣсто производной $\frac{dz}{dx}$ ея значенія, выраженного чрезъ x и z , послѣ уничтоженія дробей и исключенія степеней z выше второй, представить соотношеніе между x и z , второй степени относительно z . Изъ него сейчасъ заключаемъ уравненія

$$x \frac{dX_0}{dx} - X_0 + x^3 \frac{dX_1}{dx} - x^4 = 0,$$

$$2x \frac{dX_1}{dx} - X_1 - x^3 \frac{dX_2}{dx} - x^2 X_2 - 2x^2 = 0,$$

$$x \frac{dX_0}{dx} - X_0 + 2x^2 \frac{dX_2}{dx} = 0,$$

которымъ должны удовлетворять искомые полиномы. Зная высшіе предѣлы степеней этихъ полиномовъ можемъ, по способу неопределенныхъ коэффиціентовъ, опредѣлить и коэффиціенты этихъ полиномовъ. Не безполезно еще замѣтить, что, если полиномъ X_1 не выше второй степени, то, какъ непосредственно видно изъ полученныхъ дифференціаль-

ныхъ уравненій, полиномъ X_2 будетъ не выше нулевой степени, полиномъ X_0 не выше первой степени.

Такимъ образомъ, отысканіе полиномовъ X_0 , X_1 , X_2 не представить никакой трудности; мы находимъ

$$X_0 = bx, \quad X_1 = \frac{1}{2}x^2, \quad X_2 = -\frac{1}{2},$$

гдѣ b произвольная постоянная.

И такъ, значеніе предложенаго интеграла опредѣляется формuloю

$$\int z dx = \frac{\frac{1}{2}x^2 z - \frac{1}{2}z^2}{x}.$$

Примѣръ III. Рассмотримъ интегралъ

$$\int \frac{z}{x} dx,$$

гдѣ z удовлетворяетъ неприводимому уравненію

$$z^2 - 2x^3z + x^6 - x^4 - 1 = 0.$$

Дискриминантъ этого уравненія есть

$$\Delta = 4x^4 + 4,$$

такъ что

$$D = 1.$$

Такъ какъ въ разматриваемомъ примѣрѣ

$$P = x,$$

то находимъ

$$Y = 1.$$

Переходимъ къ отысканію полиномовъ X_0 , X_1 . Ищемъ цѣлыхъ части въ разложеніяхъ выражений

$$\frac{1}{V\Delta} \begin{vmatrix} \int \frac{z_1}{x} dx, z_1 \\ \int \frac{z_2}{x} dx, z_2 \end{vmatrix}, \quad \frac{1}{V\Delta} \begin{vmatrix} 1, \int \frac{z_1}{x} dx \\ 1, \int \frac{z_2}{x} dx \end{vmatrix}.$$

Изъ уравненія съ z получимъ

$$z_1 = x^3 + x^2 + \frac{1}{2}x^{-2} - \frac{1}{8}x^{-6} + \dots,$$

$$z_2 = x^3 - x^2 - \frac{1}{2}x^{-2} + \frac{1}{8}x^{-6} + \dots;$$

отсюда находимъ

$$\int \frac{z_1}{x} dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + c_1 - \frac{1}{4}x^{-2} + \frac{1}{48}x^{-6} + \dots,$$

$$\int \frac{z_2}{x} dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + c_2 + \frac{1}{4}x^{-2} - \frac{1}{48}x^{-6} + \dots,$$

гдѣ c_1 , c_2 , постоянныя интегрированія; еще замѣтимъ, что

$$\frac{1}{V\Delta} = \frac{-1}{2} \left(x^{-2} - \frac{1}{2}x^{-6} + \dots \right).$$

Пользуясь выписанными разложеніями, получимъ

$$X_0 = \frac{-1}{6}x^3 - \frac{c_1 - c_2}{2}x + \frac{c_1 + c_2}{2}, \quad X_1 = \frac{1}{2}.$$

И такъ, если предложенный интегралъ выражается алгебраически, то можно положить

$$\int \frac{z}{x} dx - \left(\frac{-1}{6}x^3 - \frac{c_1 - c_2}{2}x + \frac{c_1 + c_2}{2} + \frac{1}{2}z \right) = 0$$

Но постоянныя c_1 , c_2 , не могутъ быть опредѣлены изъ условія, чтобы производная первой части послѣдняго равенства тождественно обращалась въ нуль. Слѣдовательно, нашъ интегралъ не выражается алгебраически.